OEM
566



Numero 40.

E. 566.

Vaya V. 1537

~~V~~ 637 ~~407~~ GE. 566.

~~[illegible]~~ Sibi Vbertus Vendrat

Antonius Bejor compendiarius doctor medicus ptus Irene Lubricus ~~[illegible]~~ Lubdecal Anno vbp.



Opusculū repertorii pronosticon in mutationes aeris tam via astrologica q̄z metheorologica vti sapiētes experientia comperientes voluerunt p̄q̄z vtilissime ordinatū incipit sidere feliciter primo prohemiū.

Ex Libris Stae Genouefae
40. Parisiensis.

Cum i multis volumi-
nibus sapientes anti
qui de mutationibus aeris multa scripta fecerunt ⁊ diuersimode de hac materia tractauerūt: Quidā eni cū alijs appositio extraneis cōmiscendo: Alij vo tractatus speciales plixos tñ ⁊ obscuros super hoc *faciēdo: Alij autē tantūmodo* recitando nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe runt allegando. Quia etiaz qui voluerit aliquid iudicare: durū ē tot libros inspicere: totienscz verba obscura ſm suum intellectum exponere. Auctores etiā si videant discordes concordare: aut illa que faciūt ad sūm̄ positū ab alijs separare: ppter que dicta auctorū specialiter in istis ptibus remanent in expta. Ideo cōsideraui ꝓ bono sniās: aut dicta auctorū que faciunt ad ꝓpositū nostrū: eoscz si discordes videant ſm ꝓposse cōcordare atcz libros ⁊ capitula quorū verba aut sententiā recitabo fideliter allegare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ꝓpositionib⁹ in hoc repertorio positis addere uel minuere voluerit ad libros de quibus me iuuare intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit ut videlicet absq̄ pluriū librorū inspectiōe suias pluriū doctorū facili⁹ ⁊ citius possum⁹ ad inuicē compare: ⁊ collatione facta ad inuicē ad minus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt̄ ꝑib⁹ ⁊ climatib⁹ nostris ꝓ expientiā certā cōprobent̄ ⁊ approbent̄ si approbanda fuerint: uel ſm exigentiā expientie exponantur. Aut si isto ꝑe aut climate inutilia vi-

deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant: libri enim plures de quibus nos iuuare intendim⁹ in alijs temporibus ⁊ climatibus facti sunt. Ideo certū est q̄ nō easdem dispositiones debemus habere tam ꝓpter mutationem octaue sphere ⁊ aliarū que vix uel nunq̄ poterint similia redire: q̄ etiā ꝓpter diuersitatē climatū in quib⁹ eadem constellatio contrarios effectus nitit operari. ¶ Hui⁹ autē operis septē sunt partes principales ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: ⁊ est de naturis partiū celi ⁊ stellarū: quattuor etiā tēporū anni ⁊ climatū atq̄ puintia q̄ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris ꝑ cōiunctiones magnas ⁊ eclypses: ⁊ ꝑ introitū solis in punctis equinoctialibus ⁊ solstitialib⁹ ⁊ locis alijs determinatis in zodiaco signoruꝫ. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris ꝑ cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt ꝑ cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū sꝫ etiā ꝑ alias figuras particulares. ¶ Quinta ps est de iudicijs mutationū aeris ꝑ cōiunctiones ⁊ aspectus lune cū alijs stellis: ⁊ aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de presentia lune ⁊ aliorum a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuie ⁊ vbi ⁊ quādo fortior ⁊ debilior fuerit: ⁊ que sint loca apta ad hoc ⁊ de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris ꝑ signalia supiora que per methauroꝝ scientiā habent cognosci. ⁊ quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi ⁊ stellarū quattuor temporū anni climatū atq̄ prouinciarū terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis ⁊ ꝓprietatibus vniuersalibus signorū ⁊ stellarum.

Vodecim sunt signa quorū qualitates vniuersaliores ⁊ nature vniuersales ſm q̄ sol operat in quolibet eorum ⁊ intensio seu remissio eiusdez nature ꝓueniens ex opatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentiū tempore Ptolemei in partib⁹ predictorum signorū ſm longitudinem ⁊ latitudinem patent ꝑ hanc tabulam.

Signa	Qualitates	Nature vniuersales	Prime partes	
Aries ♈	Igneus	facit fulgura ⁊ tonitrua.	pluuiose ventose	10 Martij
Taurus ♉	Terreus	duas cõplexiões hz parũ calidi fic hu. eq̃liter vicit mñ ca^{m}	motus terre venti nubes mercuriales.	Ad inferendũ hoc solu[m] cursus sic Apollo.
Gemini ♊	Aerei	facit tẽperantiam de nã ionis.	humide coz rñdentes saturni.	12 Aprilis
Lancer ♋	Aquatic⁹	serenũ calidum	calide terre motus ♂ ⁊ parũ ♄	12 Junij
Leo ♌	Igneus	calidũ hu. cozrñdet solar.	calidũ cozrñdet moz. ☉ ⁊ ♂.	13 Julij
Uirgo ♍	Terrea	humectat ⁊ tonat ☿ cum ♀.	maiozis calozis dãnose martis.	14 Augusti
Libra ♎	Aerea	mutans ⁊ cambiens	tẽperate io uis ⁊ veneꝛ	12 Septembz
Scozpius ♏	Aquaticus	igneus ⁊ tonitruosus martis	grandinos⁹ pncipiũ tñ ẽ siccũ sañi	13 Octobzis
Sagictari⁹ ♐	Igneus	vẽtos⁹ mercurij cũ ioue	humectãtes veneris	12 Nouembz
Lapzicozn⁹ ♑	Terreus	multũ humidum	cõburentes dãnose martis	11 Decembz
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquosum	multũ humide lune	13 Januarij
Pisces ♓	Aquatici	frigidũ ventosũ	temperate veneris.	10 Februarij

	2ᵉ ptes	3ᵉ ptes	septētrionales	meridionales	
♈	Tpate iouis ⁊ veneris	faciet mozalitatē martis putrefcōe	calefcunt martis	infrigidant ſaturnine	
♉	frigide ⁊ humide veneris	igneꝰ corruptionē ♂	Tēperate iouis	motus fortes mercurij cū ſaī	no
♊	Tpate iouis	ɔmixte mercurij directi	ventꝰ terremotus mercurij	ignee cōburētes martis	
♋	Tpate iouis	vētoſe mercurij cū ♄	ignee cōburētes martis	ignee cōburētes martis	
♌	Tpate iouis	multū humide corrūpētes ſaturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.	
♍	Tpate iouis	aquoſe ſaturni	ventoſe mercurij	Temperate iouis	
♎	Tpate iouis	aquoſe lune ⁊ ſaturni	vētoſe mercurij cū ioue	humectantes ſaturni	
♏	Tpate ionis	terremotꝰ mercurij	cōburentes martis	humectantes ſaturni	
♐	Tpate iouis	ignite martis	ventoſꝰ cū ♀ ⁊ ♄	multū hūide ſaturni i loco humido	
♑	Tpate iouis	mouentes pluuias lūe ⁊ mercurij	multū hūide dānoſe in loco aquoſo	multū hūide dānoſe ſaīni i loco aquoſo	
♒	Tpate veneris	facit vētos mercurij	cōburentes martis	facit grandinem ſaturni	
♓	multū humide lūe	cōburētes martis	ventoſe iouis	aquoſe lune i loco aquoſo	

Duodecim signa sunt ꝛc. Hec pticula nō est nisi suptitul⁹ tabule precedentis. Qualitates autē signorū vniuersalio res que versus sinistrā ponunt ꝙsi ab oib⁹ auctoꝛib⁹ de iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a Ptolemeo ꝛ Haly eius cōmentatoꝛe in secūdo capitulo secūde ptis quadripartiti sui ita ꝙ natura illius signi uel ptis eius ponit supius fm Ptolemeū. ꝛ nature stellarū fixarū que erant tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm haly. Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo etiā vnde ꝙlibet istorū fecit vnū capitulū de signorū naturis ſꝫ totū sum pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm haly vbi supra ꝙ debemus scire ꝓprietates locorū in quibus coniunctiones uel oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: ꝛ alia ptinentia ad gubernationē ꝓmiscendo cum virtute planete dñantis ꝛ cum sole ꝛ luna ꝛ alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam⁹ virtutem vincentē: ꝛ ad hoc est hec tabula vtilis valde. Unde sciendū ꝙ cū ꝓprietatib⁹ vniuersalib⁹ signorū potes addere naturas stellaꝝ que sūt tēpore moderno i illis signis si natura eorū fuerit cōsimilis: uel minuere si dissimilis. ¶ Item sciendū ꝙ stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q fecit libꝝ almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit Haly fore in predictis partib⁹ signorū tpe Ptolemei qui fecit quadriptitū. ꝛ hoc est argumentū ꝙ fuerint duo quorū ꝙlibet vocabat Ptolemeus fm opinionē Albumazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc ꝛ solue illud dubiū. ¶ Itē nota fm haly vbi supra ꝙ signa sunt que nō habent opera, opera eni sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. ꝛ noiat qōlibet eorū fm ꝙ sol opat in eo. Potest etiā dici ꝙ signū accipit nomen a stellis fixis i eo existentib⁹ qꝛ valde diu manēt ibi. ¶ Itē illa que ꝑ p̄dictā tabulā habent dicūtur fm ꝙ fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare qꝛ stelle fixe iā mutauerūt loca. patet igit fm haly ꝙ qōlibet signū ꝛ sue partes recipiunt a sole ꝛ a stellis fixis virtutem cū qua operant virtutes solis ꝛ stellarū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem ꝙ pleiades erant tpe Ptolemei in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē notandū fm haly vbi supra ꝙ totū signū habere talē uel talē ꝓprietatē. hoc intelligit duplicit. vno mō ꝙ recipiat a sole vtutē q̄ ꝯcordat cū suo ope cū sol illud signū ingredit. Alio mō ꝙ recipiat ab oib⁹ stell' fixis i eo existētib⁹ vim vnā q̄ ꝯcordat cum ꝯplexiōe que fit ꝑ cōmixtionē omniū stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec haly. Et ego dico ꝙ intentio ptolemei fuit ꝙ proprietates signorum in proposito accipiūtur fm ꝙ sol operatur in eis. Primo qꝛ hoc magis

quomodo sit intelligendum qm̄ sc. signum habz aliqm qualitatem

facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in ꝓposito. Secūdo qꝛ ipse dicit qꝫ ꝓprietas arietis est facere tonitrua qꝛ equinoctiū fit in eo. Equinoctiū autē fit per solem ⁊ nō ꝑ stellas fixas. Tertio ipse dicit qꝫ nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt ꝑ stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igit̄ qꝫ signa none sphere cuius ꝑ se sint mansiones nō habentes opa:tiñ attribuimus eis opera ſm qꝫ sol opaī in eis diuersimode ꝓpter diuersitates situs ⁊ ſm qꝫ sol inuenit materiā preiacentē aliter dispositā a temporibus p̄cedentibus. vnde aliaꝫ ꝓprietatē attribuim⁹ virgini cuius arieti cuius situ cōsimilē habeat: qꝛ alio modo sol iuenit elementa dispositā ab estate cuius ab hyeme. Et ex his satis patet qualit̄ in ꝓposito fiāt iudicia scz vtrū ſm nonā sphērā uel octauam. Patet etiā qꝫ sol in eodē signo nō operaī similiter in oībus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui⁹ signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easdez experientias haberem⁹ de virtute solis ꝑ signa sicut Ptolemeus ꝓpter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc ⁊ tūc. ¶ Intelligendū est tñ qꝫ virtus que attribuit̄ alicui signo habet magnā latitudinem ita qꝫ ſm naturas stellarū fixarū intendit̄ uel remittit̄ non tñ oino corrūpit̄. ⁊ sic remanet sñia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē ꝑ quem poteris te iuuare *de tabula prehabita inferius te docebo*. Itez iuuamentū quod possum⁹ habere *ex stellis versus septētrionē uel versus austrū fit* ſm qꝫ dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclypsis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscebit̄ eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intelligendū ſm haly qꝫ qñ dicit̄ talis est tēperata intelligit̄ hoc ſm qꝫ caliditas ⁊ frigiditas cōuenit tpi ſm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.

Mansiones lune sūt. 28. ⁊ noia eorū atqꝫ gradus none sphere i quibus incipiunt. patent ꝑ tabulam sequentem.

¶ Mansiones lune ⁊c̄. Hec tabula trahitur ex dictis Alkindi in libello suo de pluuijs capitulo sexto ⁊ ponit ibi nomina nō latina. Item idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Cū substantia veneris ⁊c̄. Item hyspalensis in illo capitulo Indi distribuūt circulum ⁊c̄. Item Japhar in libello suo de pluuijs versus principiū. Item abrahам de seculo in illo capituso Sapiens quidem indorū ⁊c̄. Item plures alij. ¶ Notandū qꝫ auctores ut in pluribus concordāt in numero ⁊ in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus

	manſionũ lune.			Initia	Initia	Initia
Numerus	Noia ſtellarũ latina	ąlitates	Initia ſm ali ąs ą ad ğd⁹.9ᵉ ſphęre	₰z hyₓ. ad ğd⁹ ręr̄du ctis.	₰z abza bã de ſe culo a d ğd⁹ 9ᵉ ſphęrę reduct⁹
1	Cornua arietis	c.b.	1 ♈	24 ♈	16 ♈
2	venter arietis	.ſ.	13 ♈	6 ♉	28 ♈
3	Caput tauri	c.b.	26 ♈	19 ♉	14 ♉
4	Oculus tauri	b.c.	9 ♉	2 ♊	21 ♉
5	Caput canis	l.c.	22 ♉	15 ♊	7 ♊
6	fid⁹ puũ luc⁹ magne	c.b.	5 ♊	28 ♊	20 ♊
7	Brachiũ leonis	b.	18 ♊	11 ♋	2 ♋
8	Nebuloſa	c.	1 ♋	24 ♋	16 ♋
9	Oculus leonis	ſ.	13 ♋	6 ♌	28 ♋
10	Frons leonis	b.	26 ♋	19 ♌	11 ♌
11	Capillus	c.	9 ♌	2 ♍	24 ♌
12	Cauda leonis	b.	22 ♌	15 ♍	7 ♍
13	Canis	c.	5 ♍	28 ♍	20 ♍
14	Spica	c.	18 ♍	11 ♎	3 ♎
15	Cooperta	b.	1 ♎	24 ♎	16 ♎
16	Cornua ſcorpiõis	b.c.	13 ♎	6 ♏	28 ♎
17	Corona ſup caput	b.c.	26 ♎	18 ♏	11 ♏
18	Cor ſcorpionis	f.	9 ♏	2 ♐	24 ♏
19	Cauda ſcorpionis	b	22 ♏	15 ♐	7 ♐
20	Trabs	c.b.	5 ♐	28 ♐	20 ♐
21	Deſertum	c.b.	18 ♐	11 ♑	3 ♑
22	Paſtor	c.b.	1 ♑	24 ♑	16 ♑
23	Glutiens	c.	13 ♑	6 ♒	28 ♑
24	Fortune ſidus	c.l.	26 ♑	19 ♒	11 ♒
25	Papilio	f.	9 ♒	2 ♓	24 ♒
26	Dauriens prim⁹	l.b.	22 ♒	15 ♓	7 ♓
27	Dauriens ſecũdus	b.	5 ♓	28 ♈	20 ♓
28	Piſces	c.b.	18 ♓	11 ♈	3 ♈

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: ⁊ ideo accepi illā qualitatē i quā plures vidi cōcordare: ita q̄ tpata humida discordāt tñ i noibus: q̄ quidā nominant eas in greco. Alij in arabico. Alij vo in latino: sz nō est magna vis ad pñs. Ubi autē debem⁹ inchoare videt etiā discordia fm q̄ pz p tabulā. Dico tñ q̄ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: q̄ si vnus inceperit a principio arietis none sphęrę. Alter a principio arietis octaue nō essent ita cōcordes in qualitatib⁹ sicut sūt. ⁊ oēs hoc acceperunt ab indis. ¶ Uidet tñ q̄ hyspalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ magnis q̄ cornua arietis dicunt: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none sphęrę fm q̄ intellexit ex dictis indorū ⁊ vnaquęq̄ est. 13. gradus ⁊. 3ᵉ vni⁹ gradus ut dicit. Et q̄ oēs alij etiā tantā qualitatē cuilibet mansioni attribuunt. Sz ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equales: ⁊ ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. q̄ quelibet mansio cōtinet. 12. gradus ⁊. 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ ⁊. 51. minuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut patet in tabula: q̄ imago arietis ē pua. hoc dicit expresse q̄uis dicat postea quō inueniat in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene vident sua dicta ibi cōcordare cū p̄dictis: ⁊ ideo nō indiget ibi expositiōe ¶ Uidet quibusdā modernis q̄ debeam⁹ incipere a principio gradus primi arietis. i. a primo gradu arietis none sphęrę. sz nō videt cū noient fm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt q̄ incipiūt a principio octaue sphęrę vnde planete ⁊ luna solēt calculari ad octauā sphęrā. Et dicunt q̄ iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm eā q̄z fm nonaz. Et ego dico q̄ nō sufficit eo q̄ motus octaue sphęrę quē ipsi dicūt nō ē nisi correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p instrumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p suas tabulas. ideo dicebant q̄ hoc est ppter motū octaue ꝛc̄. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū ¶ Dico igit q̄ debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus añ cornua arietis. si enī inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēnt in prima mansione imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta sz vltra mediū quinte. nec cornua scorpionis in. 16ª sz vltra mediū. 19ᶜ. Itē si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertie ⁊ nō in q̄rta ⁊ cor scorpionis in fine. 18ᶜ ⁊ nō in. 18ª. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante cornua arietis erūt versus mediū prime ⁊ aldebaran versus mediū q̄rte ⁊ cor scorpionis versus mediū. 18ᶜ sicut debēt inueniri. Alia incōuenientia sūt fm q̄ id a quo mansio accipit denoiationē fit extra mansionē quā denoiant. ¶ Notandū q̄ Japhar versus principiū vbi facit mētionē de mansionib⁹ q̄ qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem sitmatarū ⁊ ex stellarū dignitatib⁹ ⁊ ex radiorū fm fortes aspect⁹ in eis-

dem locis ꝓiectionib⁹. ¶ Jtē notandū ſm albumazar in capitulo 2°. ſecūde differentie ꝓrimi tractat⁹ ſui magni introductorij q̄ multe gentiū ſciūt qcqd euenit in dieb⁹ ex caloꝛe uel frigoꝛe ventis ꝛ pluuijs ex pñtia lune in vnaquaq̄. 28. manſionū. ꝛ cuꝫ viderint vnāquāq̄ manſionū in occidente mane. dicūt q̄ aer mutabit̄ ꝑ ventū pluuiā uel caloꝛē uł frig⁹ ¶ Sciendū q̄ Japhar recitat q̄liter antiq nō ponebāt niſi. 27. manſiones qꝛ cōputabāt. 13. grad⁹ ꝛ tertiā vni⁹ ꝑ vna manſione ꝛ alij. 29. ꝛc̄. ſꝫ nō eſt hoc multū vtile nec eſt opinio ſua ut dicit. dicit tñ poſtea q̄ vnaquaq̄ manſionū eſt ex. 13. gradib⁹ ꝛ. 3ª vni⁹. ꝛ debet incipi cōputatio a ꝓrimo puncto arietis: ſꝫ nō dicit cui⁹ arietis none videlicet uel octaue. Jdeo ſi volueris ſcire q̄ opinio ſit melioꝛ ꝛ verioꝛ: oporꝛtet q̄ ꝑ longam expientiā hoc exptus ſis. Qualiter aūt hoc ſit experiendū videbit̄ in ꝓꝛacticis poſtea. ¶ Jtē querit̄ q̄re hec ꝓtitio poti⁹ fit ꝑ. 28. q̄ꝫ ꝑ aliū numerū ꝛ dico q̄ hec potuit eſſe cā: qꝛ iſte numer⁹ eſt ꝓpinquius dieb⁹ pagrationis lune ꝑ zodiacū. ſicut diuidim⁹ zodiacū in. 360. qꝛ eſt numer⁹ abundans ꝓpinquius numero dierū pagratiōis ſolis ꝑ zodiacum.

Capitulū tertiū de ſignis pluuioſis.

¶ Lē ſigna pluuioſa ſūt cancer leo ſcoꝛpio ſagictari⁹ aquarius piſces. ꝓtes autē ſignoꝛū q̄ potiſſime dicunt̄ humide ſūt finis arietis. ꝓncipiū tauri. finis capꝛicoꝛni. ꝓncipiū aquarij. ꝓncipiū leonis. Signa aūt paucaꝫ imbꝛiū ſūt taurus ꝓter ei⁹ ꝓncip iū: gemini virgo libꝛa. Jtē capꝛicoꝛn⁹ plus habet frigoꝛis ꝛ ſiccitatis q̄ꝫ pluuie. ¶ Jtē ſigna pluuioſa ꝛc̄. Dec ꝓticula extrahit̄ a quodā libꝛo de pluuijs q̄ incipit Lū multa in duob⁹ locis ꝛc̄. Jtē haomar in vltimo ca°. Jtē alkindus in vltimo ca°. Jtē hyſpalenſis in ca°. volēs ſcire. Jtē Leopaldus i duob⁹ locis. Jtē q̄ vn⁹ accepit ab alio q̄ſcq̄ id quidē dicit. Jtē abꝛahā de ſeculo in ca°. Dicit iacob. ¶ Notādū q̄ ille auctoꝛ cui⁹ liber incipit Lū multa. enumerat capꝛicoꝛnū inter ſigna pluuioſa: ꝛ poſtea dicit q̄ plus habet frigoꝛis ꝛ ſiccitatis q̄ꝫ pluuie. hoc exponit: qꝛ cum luna in locis alijs pluuioſis applicans veneri ſignificet pluuias q̄ꝫuis nō ita foꝛtit̄ ſi ven⁹ nō ſit in locis pluuioſis. tñ luna nō facit in capꝛicoꝛno pluuias niſi ſtellas in loco a quarū inſpiciat. ꝛ cū luna ꝛ mars in capꝛicoꝛno aſpiciunt venerē ꝛ mercuriū. tūc eni nō obſtāte marte pluuias ſigꝛet. Jn alijs aūt ſignis pluuioſis nō ita apparet effectus reſecatiōis luminis ſicut intelligo, iſtū auctoꝛem. ¶ Jtem ſciendū ſm iſtum auctoꝛē ꝛ alios qui etiaꝫ hoc recitant q̄ piſcis eſt ſignum pluuioſum ꝓpter riuos quos habet ꝛ flumina: ꝛ ſagictarius etiam ꝓpter maria que in eius extremo exiſtūt

Pluuioſa .69. ♓ ♍ ♑ ♐ ♎ ♓
Ꝑncꝑs hūiꝰ ꝓncipiū. finis
♉ ♈
♒ ♑
Ꝑncꝑ ibuꝫ ♌ ♉ ♊ ♍ ♒ ♎

ꝛ ſcorpio ꝓpter ſua loca ꝛ littora. hoc poteſt exponi. ſ. ꝙ iſta ſigna habent iſta in ſuis cõſtellationib⁹ figurata. uel ſic ꝙ iſta ſigna habẽt mai⁹ dominiũ in locis terre aquoſis ſicut maria ꝛc̃. ¶ Sciendũ baomar dicit ꝙ p̃cipue aquarius ꝛ leo ſunt aquatica. ꝛ byſpalenſis dicit ſigna pluuie ꝛ ſignatiua aque ſũt aquarius. finis capꝛicorni aries taurus leo. bis fortiora piſcis aquarius ſcorpio. Alkindus dicit ꝙ loca pluuioſa ſunt aquarius finis capꝛicorni arietis ꝛ tauri ꝓncipium leonis: ꝛ amplius illis ſcorpi⁹ piſcis ꝛ aquarius ita ꝙ byſaplẽſis ab alkindo hoc accepit. ¶ Item abꝛahaz de ſeculo dicit ꝙ ſignũ aquarij ſignificat aquas ꝓpter ſtellas que effuſor appellant̃. Similiter etiã ſignum leonis ꝓpter figuram nauis que in eo exiſtit. ¶ Dubitat̃ vtrũ iſte nature ſignorũ debeantur ſignis octaue uel none ſpẽre: ꝛ videt̃ ꝙ in nona quia dom⁹ capiuntur in nona. ꝛ ille auctor Cũ multa ꝛc̃. dicit vtraq; domus ſaturni ẽ pluuioſa ꝛc̃. oppoſitum patet: quia cauſa quare ſũt pluuioſa eſt ꝓpter ſtellas fixas que ſunt in eis ut dictum eſt. Stelle autem fixe ſunt in octaua quere de hoc.

Capitulũ quartũ de mutatione ſignorũ nature.



Item nature ſignorum mutant̃ ꝓpter motus eorũ in circũferentia quia eorũ calidum efficitur frigidum ꝛ humidum ſiccũ. Taurus in oriente eſt tepidus: in occidẽte frigidus. Gemini eſt in oriente calidus ꝛ ſiccus: in occidente frigidus ꝛ humidus. Cancer in oriente calid⁹ ꝛ ſiccus in occidente frigidus ꝛ humidus. Leo eſt in oriente calidus ꝛ ſiccus. in occidente frigidus ꝛ humidus. Virgo in oriente calida ꝛ tepida. in occidente frigida ꝛ humida. Sagictarius in oriente frigidus ꝛ humidus. in occidente calidus ꝛ ſiccus. Capꝛicornus in oriente frigidus ꝛ ſiccus. in occidente frigidus ꝛ humidus. Aquarius in oriente ꝛ piſcis ambo ſunt in oriente frigidi ꝛ ſicci: ꝛ in occidẽte frigidi ꝛ humidi ꝛc̃. ¶ Item nature ſignorum ꝛc̃. hec habent̃ in libro baly abenragel capitulo pꝛimo pꝛime partis. hoc etiam exponitur ſic verbi gratia: Sole exiſtente in aliquo ſignorũ que ſunt calida in oriente ꝛ occidente frigida. ſi fuerit ſignificatio ſup̃ caliditatem plus apparebit illa die calor in mane q̃ veſpere ceteris paribus ꝛ ſic de alijs. uel ſic. Quando ſignificatores temporũ fuerint in aliquo ſigno qđ fuerit calidũ in oriẽte ꝛ frididũ in occidente ſi ſignificauerũt caliditatẽ pꝛius apparebit effectus in partibus terre verſus orientem q̃ verſus occidentem. ſm vero econuerſo frigiditatem fiet econuerſo. Uel ſic. Si aliquod ſignum eſſet in oriente hora coniunctionis uel oppoſitionis uel alijs temporibus

significationū:magis apparebit effectus caliditatis si fue rit calidus in oriente ⁊ frigiditatis in occidente q̄s si esset i alia domo.s.in parte occi dentali ⁊ sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi videnť ad ppositum. ¶ Item sciendū q̄ nō facit mentionē de ariete ⁊c̄. q̄ forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel q̄ non habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.

DIgnitates essentiales planetarū ⁊ quis eorū sit almutez in vnaquaq; partiū celi atq; vent⁹ triplicitatis cuiuslibet s.signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentiales ⁊c̄. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: ⁊ extrabiť ex introductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18°. 19°. 20°. 21°. 22°. capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi p totum: ⁊ fm plures alios. Tabulam autē almutez cōposui p computationē pluriū dignitatū fm q̄ domin⁹ domus habet quinq; fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventorū fm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei ⁊ Haly. 19°. capitulo prime ptis quadripartiti: tabulā aūt fm Albumazar ex. 27°. differentia sexti tractat⁹ sui magni introductorij. Tabulā autē fm Japhar accepi ex libro Japhar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū q̄ Ptolemeus posuit totū arietē p exaltatione solis ⁊ sic de alijs. Alij autē plures ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib⁹ illorū signorū. ¶ Item dñi triplicitatū que supius ponunť ad modum glose interlinearis fm opinionē Ptolemei sicut ⁊ illud qō directe scribiť fm alios. Item termini egyptiorū a plurib⁹ approbanť ⁊ ꝓpter hoc tm̄ ponunť. ¶ Item magna est discordia in situationib⁹ ventorū. quere de hoc inferius vbi facit mentionē de planetarū ventis ⁊ de qualitatibus habitationū. ¶ Sciendū fm quendā de imaginib⁹ q̄ quando aliqua triplicitas ⁊ eius dñi sunt fortes ⁊ incipit ventus illi⁹ triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autē inceperit illis existentib⁹ debilib⁹ nō durabit. Item qualitates ventorū sunt fm qualitates locorū a quibus veniunt fm q̄ patebit inferius. ¶ Item sciendū fm Japhar q̄ solis conuersio p signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mundi partib⁹ obtineat sūmope, notandū nō quoq; lunaris a sole receptio ⁊ quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāq; in ariete discursus orientalē ventū vsq; in fin ē geminorū generat. Que hic tabulantur q̄nq; in ꝓcessu facient ad ꝓpositū. Et oēs etiā cōcedūt q̄ aries sit masculinus taur⁹ vo femininus ⁊ sic de alijs ꝯsequēter. Segť tabula dignitatū.

Tabula digni.

	5	4	3		
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis		
			primus	2°	3°
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn°
Taurus	Uenus	Lune	Uenus	Luna	Mars
gemini	Mercuri°		saturn°	Mercuri°	Jupiter
Cancer	Luna	Jouis	Uenus	Mars	Luna
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturn°
Uirgo	Mercuri°	mercurij	Uenus	Luna	Mars
Libra	Uenus	Saturni	Saturn°	Mercuri°	Jupiter
Scorpio	Mars		Uenus	Mars	Luna
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn°
Capricorn°	Saturn°	Martis	Uenus	Luna	Mars
Aquarius	Saturn°		Saturn°	Mercuri°	Jupiter
Pisces	Jupiter	Ueneris	Uenus	Mars	Luna
			in die	in nocte	pticeps.

Tabula graduū puteorū.

Aries	6	11	16	23	29			
Taurus	5	12	24	30				
Hemini	2	12	17	26	30			
Cancer	12	17	23	24	30			
Leo	6	13	15	22	23	28		
Uirgo	8	13	16	21	25			
Libra	1	11	20	30				
Scorpius	9	10	22	23	27			
Sagictarius	1	12	15	24	27	30		
Capricorn°	2	7	11	22	24	28		
Aquarius	1	12	17	24	29			
Pisces	4	7	24	27	28			

tatum planetarū

	2 Domini terminorū								1 Domini facierū		
									prime	2e	tertie
♈	♄	1.6	♀	7.14	☿	15.21	♂	22.26	♄ 27.30	♂	☉	♀
♉	♀	1.8	☿	9.15	♃	16.22	♄	23.24	♂ 25.30	☿	☽	♄
♊	☿	1.7	♃	8.13	♀	14.20	♂	21.26	♄ 27.30	♃	♂	☉
♋	♂	1.6.	♃	7.13	☿	14.20	♀	21.27	♄ 28.30	♀	☿	☽
♌	♄	1.6	☿	7.13	♂	14.18	♀	19.24	♃ 25.30	♄	♃	♂
♍	☿	1.7	♀	8.13	♃	14.18	♄	19.24	♂ 25.30	☉	♀	☿
♎	♄	1.6	♀	7.12	☿	13.17	♃	14.23	♂ 24.30	☽	♄	♃
♏	♂	1.6	♀	7.13	♃	14.21	☿	22.27	♄ 28.30	♂	☉	♀
♐	♃	1.8	♀	9.14	☿	15.19	♄	20.25	♂ 26.30	☿	☽	♄
♑	♀	1.6	☿	7.12	♃	13.19	♄	20.25	♂ 26.30	♃	♂	☉
♒	♄	1.6	☿	7.12	♀	13.21	♂	22.26	♃ 27.30	♀	☿	☽
♓	♀	1.8	♂	9.14	☿	15.20	♃	21.25	♄ 26.30	♄	♃	♂

Tabula graduū lucidorū ⁊ tenebrosorū vacuorū ⁊ fumosorum.

♈	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9.17	lu. 18.20	va.21.24	lu. 25.29	va. 30
♉	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8.12	lu. 13.15	va. 16.20	lu. 21.28	te. 29.30
♊	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8.12	va. 13.16	lu. 17.22	te. 23.27	va. 28.30
♋	lu. 1.12	te.13.14	va. 15.17	fu. 18.19	lu. 20. 28	va.29.30	
♌	te. 1.10	fu.11.20	va.21.30		(fu.23	lu.24.26	va.27 te.28.30
♍	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9.13	lu. 14.17	fu. 18	va. 19	lu.20.22
♎	lu. 1. 5	te. 6.10	lu. 11.18	te. 19.21	lu. 22.27	va. 28.30	
♏	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9.14	lu. 15.20	fu. 21.22	va. 23.27	te.28.30
♐	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8.13	fu. 14. 17	lu. 18.24	te. 25.30	
♑	te. 1. 7	lu. 8.11	fu.12.15	lu. 16. 19	te. 20.22	va. 23.26	te.27.30
♒	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te. 10.13	lu. 14. 21	va. 22.25	lu. 26.30	
♓	te. 1. 6	lu. 7.12	te.13.18	lu. 19. 22	va. 23.25	lu. 26.28	te. 29.30

Capitulū sextū de aspectibus planetarū.

Stelle dicunt esse in gradibus in quib⁹ fiunt accordamenta qñ sunt cōiuncti uel oppositi uel cū de tertio uel quarto aut sextili dextro uel sinistro se aspiciūt aut in gradib⁹ equaliter elongati ab altero equinoctiorū uel ab altero tropicorū ꝛc. ¶ Stelle dicunt esse ꝛc. Pars hui⁹ habet a Ptolemeo ꝛ Haly in. 14°. capitulo prime partis quadripartiti. Et alia pars er. 15°. capitulo eiusdē prime partis. Itē etiā Albumazar in tertia differentia sexti tractat⁹ ꝛ breuiter omes concedūt istos aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalib⁹ magis q̄ de quibuscūq; alijs. ¶ Notandū ſm Ptolemeū in quarto capitulo prime partis q̄ p rectificationē figurarū quā faciunt planete in respectu solis ꝛ lune cognosces virtutes omniū planetarū qꝛ tunc mutant aerē augendo uel minuēdo a virtute luminariū. ¶ Item sciendū Ptolemeū ꝛ haly in. 14°. capitulo prime partis quadripartiti. q̄ si semicirculus diuidat in tales partes ſm quas caderent accordamenta muficalia in partibus cōsimilib⁹ diametri inuenient qualitates circuli in quib⁹ aspect⁹ supradicti. Cā autē quare hec cōputatio fit tantūmodo in semicirculo est qꝛ dsimiles aspectus uel dsimiles distantie post oppositionē sicut p⁹ ꝯiunctionē nisi q̄ sint in vna parte dextri ꝛ in alia parte sinistri etiā tota diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igit capiatur medietas diametri hic cadit accordamentuz ipsi⁹ dyapason que fit ſm ꝓportionē duplam. Similiter si capiat medietas semicirculi fit distantia. 90. graduū ſm quā fit aspectus quartus. Si vo capiant due partes diametri hic cadet accordamentū ipsius dyapenthe que est proportio sesq altera seu tria ad duo. Similit si capiant due tertie semicirculi fiet distantia. 120. graduū ſm quā fit aspectus trinus. Item si capiat tertia diametri hic cadit accordamentū dyapenthe cum dyapason. ſ. ꝓportio uni⁹ ad. 3. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60. graduū ſm quā fit sextilis aspectus. Cōiunctio autē ꝛ oppositio sūt ad similitudinē vnius soni. vnde qñ sūt cōiuncti duo planete uel oppositi ꝓjciunt radios suos p eandē lineā. ſ. p eandē dyametruz mūdi. Et sicut inter cōsonātias seu ꝓportiones muficales. De sunt principaliores: ita in istis distantijs aspectuū principali⁹ reseruat celestis armonia. ¶ Ulterius sciendū ſm Ptolemeū ꝛ haly in eodē capitulo. 14°. prime partis. q̄ trinus ꝛ sextilis aspectus sūt amicabiles ꝓpter conuenientiā signorū Quartus autē ꝛ oppositus inimicabiles ꝓpter discōuenientiā. De gradibus etiam dicunt Ptolemeus ꝛ haly in capitulo. 15°. prime partis q̄

Proporcio musicalis
quam astrologia

vna pars illoꝝ graduuꝫ eſt alta ꝛ alia baſſa ꝛ qñ equediſtant troipicis
tūc ſunt arcus diurni equales. ꝛ hec de ſe nota ſunt. ¶ Sciendū ſm Al-
bumazar vbi ſupra ꝙ oppoſitio eſt fortioꝛ aſpectuū: deinde q̄rtus: de-
inde trinus: vltimo ſextilis. ¶ Dubitaꝫ vtrū ſm gradus equales uel ſm
gradus aſcenſionū in circulo recto uel obliquo debeāt ſumi iſti aſpectꝰ
Itē poteſt queri ſm quā diſtantiā incipit applicatio ad aſpectum ꝛ ſm
quā durat fortitudo aſpectus. Uide in tertia differentia ſeptimi tracta-
tus Albumazaris ꝛc̄.

Capitulū ſeptimū de centro aſpectuū planetarū uel zenith uel athazir.

ITem ſtelle dicunt̄ eſſe i centro reſpectu alteriꝰ cū vna fue-
rit in cōiunctione uel oppoſitiōe eiuſdē aut in altero pre-
dictoꝝ aſpectuū aut p. 12. gradꝰ ante coniunctionē uel p
12. gradus poſt cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppo
ſitionē aut p. 12. gradꝰ poſt. Aut ſm diſtantiā. 45. graduū
uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itē ſtelle dicunt̄ eſſe ꝛc̄. Al-
kindus in. 4°. capitulo. Haomar in ca°. Quotiens itaq; Haly abenragel in
29°. ca°. octaue partis. ꝛ plures alij faciūt mentionē de huiuſmodi cētris
¶ Sciendū ꝙ Leopaldus Haomar ꝛ Haly abenragel nō ponunt aſpe
ctū trinū eſſe de centris. Sciendū etiā ꝙ Alkindus quē credo ſic habere
correctū ponit ꝙ iſte partes debent ſumi ſm aſcenſiōes climatū. Scien
dum etiā ꝙ potius dicunt̄ centra lune q̄ꝫ alteriꝰ planete qꝛ cum luna tm̄
diſtat a ſole fiūt ut in pluribꝰ iudicia ſm iſta centra. Itē a quibuſdā vo-
cant̄ athazir: ab alijs zenith. ſz nō eſt vis de nominibꝰ.

Capitulū octauū. Quid agant planete.

SOl calefacit ꝛ aliquantulum deſiccat. Luna humectat ꝛ
parū calefacit. Saturnus infrigidat ꝛ modicuꝫ deſiccat.
Jupiter temperate calefacit ꝛ humectat ꝛ facit ventos ge
neratiuos. Mars ꝑꝛie deſiccat ꝛ cōburit. Uenus calefa
cit parū ꝛ humectat multū. Mercuriꝰ qñq; deſiccat qñq;
humectat ſm planetā cū quo īuoluit̄. ¶ Sol calefacit ꝛc̄
Hoc principaliter a Ptolemeo. 4°. ca°. Et facit ventos. ꝑme pris quadripar
titi. ꝛ quaſi oēs hoc concedūt q̄uis aliū modū cognoſcēdi virtutes pla-
netarū uel aliā cauſaꝫ quare ſaturnus eſt frigidus. ꝛ ſic de alijs ponant
plures q̄ꝫ Ptolemeus. ¶ Sciendū ſm Ptolemeū ibidē ꝙ luna modicū
calefacit ꝑpter lumen receptū a ſole ꝛ ꝑpter hoc facit putreſcere. ¶ Du-
bitatur vtrum ſaturnus poſſit infrigidare ꝛ vtrū per radiū uel per motū
uel quomodo. Item vtrū ſit calidioꝛ ſole.

Capitulū nonū Qualitates planetarū quō mutant

Item saturnus est frigidus semp: tñ fm magis ꝛ minus. ꝫ siccitas eius qñq; mutat in humiditatē. Mars ē semp calidus fm magis ꝛ minus. siccitas tamen eius nō semp manet in eo. verbi gratia Cū fuerit planeta descendens in circulo augis ꝛ in signo humido ꝛ in termino humidi planete: ꝛ in quarta humida a sole. tunc est humidus fm qp plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia ꝛ ecōtra. ¶ In quantitatib⁹ vo actiuis confortat cum fuerit ascendēs in circulo augis uel cū simílib⁹ ꝛ ecōuerso si descendens. uel cū dissimilib⁹. ¶ Jupiter ꝛ venus tēperate calefaciūt ꝛ humectant. Ascendentes tñ confortat tēperamentū caloris eorū. Descendentes vo fortificat temperamentū humiditatis. i. incendit humiditas. Similiter est de sole suo modo. Consídera etiā signa ꝛ terminos planetarū etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendū qui ꝛ si sit parū siccus ꝛ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parū calidus ꝛ grauitate siccitate siccus Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q̄ꝫ alij mutat fm complexionē loci in quo est ꝛ planete cui cōiungit. ¶ Item saturnus est ꝛc̄. A. 7°. capitulo uel septima differentia quarti tractat⁹ magni introductorij. Albumazar. Notandū qp non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ꝛ mercurius qz nō multū elongant ab eo. ¶ Sciendū fm Ptolemeū. 12°. capitulo prime partis qp virtutes quib⁹ operant stelle mutant p statum temporis ꝛ angulorū. vnde cū suo simili confortant ꝛ cum suo dissimili debilitant. diuersis.

Capitulū decimū Qualitates planetarū quō mutant i suis habitudib⁹

Item planete superiores ab ortu uel a cōiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionez solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam sicci. Deinde vsq; ad combustionē uel cōiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigant sunt calidi. Deinde ad cōiunctionē solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Et abinde a retrogradatione vsq; ad coniunctionē solis frigidi. Uel sic. Inferiores vo ab ortu quousq; retrogradant sunt humidi. Deinde ad coniunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Deinde vsq; ad retrogradationē frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus ꝛ mercurius posteq; sepant a sole ꝛ sunt directi donec sūt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis desiccāt. Deinde vsq; ad cō-

bustionem infrigidant. Postꝫ etiã sepantur a sole retrogradi existentes ⁊ apparent in mane donec eorũ retrogradatio compleat̃ ⁊ fiant directi.habẽt similiter quattuor status similes istis ⁊c̃. ¶ Luna vo in prima quarta mensis est humida principaliter.in secunda calida.in tertia ficca.in quarta frigida.ita ꝙ suo modo q̃ttuor quarte lunationis quattuor quartis anni correspondent. ¶ Item planete superiores ⁊c̃. Ab albumazare quarta differẽtia septimi tractatus sui magni introductorij. Itẽ venus ⁊ mercuri⁹ ⁊c̃. Habeẽ ab haly in glosa penultie ꝓpositiõis. 8ⁱ ca.prime ptis. Luna vo i p̃ª q̃rta ⁊c̃.hoc a Ptolemeo.8°ca°prime parti.

Quarta Luna
p̂ 2̂ 3̂ q̂
hu. cal. se. si.

Capitulũ vndecimũ Qñ planete magis augent̃ in suis operationib⁹

Item fortior est calor planetarũ quando sunt retrogradi. Item quãdo fuerit planeta a capite cancri ad caput libre est in sũmo caliditatis sue ⁊ fortior caliditas si cum hoc fuerit in longitudine propiori epicycli. ¶ Itẽ caliditas illic est duob⁹ modis: aut a statione prima ad oppositionẽ cuz caliditate: aut ab oppositione ad stationẽ secundam cum caliditate vincente que est fine siccitatis. Sz a statione secũda vsqꝫ ad absconsionẽ sub radijs debilitatur calor eius:⁊ cum fuerit sub radijs nõ apparet in eo effectus caliditatis:quando exit de radijs vsqꝫ ad stationẽ primam incipit calor eius crescere ita ꝙ dixerunt multi grecorũ ꝙ tunc est significatio humiditatis. ¶ Itez ex parte eccentrici iudica calorẽ ꝑm appropinquationẽ a terra. Qñ igit̃ planeta fuerit in sũmo epicycli ⁊ in sũmo eccentrici ⁊ fuerit in prima q̃rta circuli illud est sũmũ debilitatis caloris initiũ:ꝙ nõ apparet effect⁹ caliditatis sue in terra sz frigiditatis. Sz qñ fuerit in secũda q̃rta circuli ⁊ i infimo epicycli ⁊ eccẽtrici erit sũma vis sue caliditatis quousqꝫ accidat magna siccitas in terra. ¶ Itẽ nota ꝙ effect⁹ calidorũ sunt fortiores versus zenith capitũ. ⁊ versus meridiẽ debiliores ꝑm distantiã a zenith capitum Similiter ⁊ de frigidis sz effectus eorũ aliquantulũ fortiores in pte meridiei. ¶ Itẽ fortior est calor ⁊c̃. Alkindus in primo ca°. ¶ Itẽ nota ꝙ effectus fortiores ⁊c̃. Alkindus in quinto ca°

Capitulũ. 12ᵐ

De diuersis opatiõib⁹ in aere plaꝛ in diuersis locꝭ i circulo discurrẽtiũ.

Item oẽs planete ponderosi a statione sua ad oppositionẽ humectant ⁊ ab oppositiõe vsqꝫ ad stationẽ desiccãt. Itẽ a statiõe 2ª ad cõbustionẽ infrigidãt ⁊ a cõbustiõe vsqꝫ ad stationẽ calescunt. ¶ Itẽ fortior caliditas ẽ in retrogradatiõe. Itẽ fortior siccitas ⁊ hũiditas ẽ in declinatiõe septẽtrionali.minor vo in meridionali ⁊ in facto hyemis ꝑ similitudine temporis. ¶ Uenus ⁊ mercurius orientales ⁊ retrogradi humectãt.orientales directi desiccant. occidentales retrogradi infrigidant.occidentales directi desiccant.

Luna

¶ Luna in prima quarta a sole calida ⁊ humida ⁊ si cū hoc fuerit ascē-
dens in circulo breui erit humida multū ⁊ fortius in prima ⁊ secūda 4ª
circuli q̄ꝫ in tertia ⁊ q̄rta 4ª. In secunda q̄rta mensis est calida ⁊ sicca si
ascendens est sicca ſm istā naturā. si descendens calida equalis In ter
tia q̄rta mensis est frigida ⁊ sicca. si ascendēs minuet frigiditas si descē-
dens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida ⁊ hūida. In ascen-
su frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponde-
rosi ⁊c̄. hoc Alkindus.

Capitulū. 13m. Quando planete sint maxme significationis pluuiarū.

ITem scito q̄ planete retrogradi significant sup pluuiam
⁊ eo magis inferiores qui sūt sub sole ⁊ eo magis siue in
feriores siue supiores in signis femineis. Et est testimo-
niū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue ter-
reis siue aqueis. ¶ Itē scito q̄ planete retrogradi ⁊c̄. hoc
Abrahам de seculo.

Capitulū. 14. qñ planeta est iterū maioris significationis p pluuijs.

ITem planeta cum est retrogradus a statione prima ad oppositi
onē notat plus pluuiā q̄ꝫ ab oppositione ad stationē secundā
Item planeta cū est retrogradus ⁊c̄. hec byspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

ITem saturnus in ariete sub radijs facit pluuias ⁊ radiositates
⁊ nebulas pluuias. Uesptinus ventos frigidissimos. Matuti-
nus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari⁹ ⁊ fulgu
ra. Jupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Uesptinus nebu-
las uel rores spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius toni
trua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Uesptinus contrariū.
Matutinus turbationē temporū. Stationari⁹ fulgura ⁊ tonitrua. Ue-
nus in ariete sub radijs nihil erit venti. Uesptina ventū facit. Matuti-
na tonitrua ⁊ pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē.
Uesptinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē signifi-
cat. ¶ Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Uesptin⁹
siccitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus tē-
pestuosus ⁊ tonitruos⁹ ē. Jupiter i tauro sub radijs mediocritatē aeris
significat. Uesptinus vmbras. Matutin⁹ abundantiā fructuū ⁊ pascue
Stationarius defectū fructuuꝫ. Mars in tauro sub radijs tempus fine
vento facit. Uesptinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius defic
cat aerē. Uenus in tauro sub radijs tonitrua significat. Uesptina sere-
num. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuos⁹ ē ꝛ vmbrosus. Uesptinus bone cōplexionis. Matutinus
rozidus ꝛ madidus ꝛc. ¶ Saturn⁹ in geminis sub radijs siccus. Uesper
tinus aridus. Matutinus rozidus bone cōplexionis. Sationarius in-
firmitates crescūt. Jupiter in geminis sub radijs bonā complexionem
Uesptinus sanitatem. Matutinus sanitatē. Stationarius sanitatem.
¶ Mars in geminis sub radijs infirmitatē significat. Uesptinus cali-
dissimus. Matutinus contrarietatez in boibus. Stationarius calidus
ꝛ siccus. Uenus in geminis sub radijs ad min⁹ deficcat. Uesptina ven-
tosa. Matutina bonā complexionē. Mercurius in geminis sub radijs
ventos excitat in mari ꝛ in terra. Uesptinus deficcat. Matutin⁹ bonaz
complexionem. ¶ Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies ꝛ vali
dos ventos ꝛ pcellas in mari. Uesptinus mare reddit apertū ad naui-
gandū. Matutinus bone complexiōis. Sationari⁹ diuturnas infirmi-
tates. Jupiter in cancro sub radijs tranquillū mare significat ꝛ abun-
dantiā piscium. Uesptinus bonam complexionē ꝛ sanitatem. si matu-
nus cū bona complexione. Stationarius facilitatē in rebus. Mars in
cancro sub radijs combustionez. Uesptinus infirmitates. Matutinus
lites inter homines. Uenus in cancro sub radijs tempus absq; vento.
Uesptina bonam complexionē. Matutina serenū. Mercurius in can-
cro sub radijs mare eleuat. Uesptinus tranquillitatē. Matutinus bo-
nam complexionē ꝛ sanitatē. ¶ *Saturnus in leone sub radijs in cozpo*
re reumatismos ꝛ ex humiditate turbationē: ꝛ in aere siccitatem facit.
Uesptinus ariditatem. Matutinus bonā complexionē. Stationarius
ariditatem ꝛ siccitatē. Jupiter in leone sub radijs annuales ventos in-
ducit. Uesptinus bonaz complexionē. Matutinus robur in impatoze
ꝛ puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatū remissionem ꝛ minu
tionē Mars in leone sub radijs infirmitates impatozis. Uesptinus ar
dozem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmi-
tates. Uenus in leone sub radijs ardozem facit. Uesptina iumentozuz
infirmitates. Matutina bonam complexionē. Mercurius i leone sub
radijs ab occidente ventū educit. Uesptinus suffocationē. Matutinus
serenū. ¶ Saturnus in virgine sub radijs nocens est ꝛ infirmitates fa-
cit seu infert. Uesprinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatē. Sta-
tionarius infirmitatez. Jupiter in virgine sub radijs abundantiā signi-
ficat. Uesptinus bonam complexionē. Matutinus sanitatem. Statio-
narius bonum ꝛ gaudiū. Mars in virgine sub radijs nocumentū infir
mitatum. Uesptinus suffocationis est. Matutinus vo lites. Statione
rius siccitatem. Uenus in virgine sub radijs deficcat. Uesptina bonaz

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine ſub
radijs procellas in mari validas ſignificat. Veſpertinus ſiccitatē. Ma
tutinus ſuper humidos ⁊ bene complexionatos. ¶ Saturnus in libra
ſub radijs occultas infirmitates infert. Veſpertinus inequalitatē aeris
Matutinus frigidos ⁊ ſiccos ventos facit. Stationarius febrem quar
tanam inducit. Jupiter in libra ſub radijs bonā complexionē aeris.
Veſpertinus ſanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationa-
rius bonum tempus facit. Mars in libra ſub radijs ſiccum ⁊ aridus
aerē facit. Veſpertinus pluuioſus. Matutinus turbationes ⁊ tonitrua
Stationarius aridus ⁊ ſiccus eſt. Venus in libra ſub radijs eſt humi
da. Veſpertina bene complexionata. Matutina fantaſtica eſt ⁊ humi-
ditates facit. Mercurius in libra ſub radijs fortiſſimos ⁊ cōtrarios
ventos. Veſpertinus bene complexionatus. Matutinus ſemper humi
dus ⁊ vtilis eſt. ¶ Saturnus in ſcorpione ſub radijs frigidum aerem ſi
gnificat. Veſpertinus congelationem. Matutinus ſeptentrionaliuſ ⁊
frigidorum ventorum eſt ſignificator. Stationarius obſcuros dies.
Jupiter in ſcorpione ſub radijs frigidam pluuiaſ ſignificat. Veſper-
tinus bonam complexionem. Matutinus bonum ⁊ augmentationem
piſciū ſignificat. Stationarius tranquillitatem. Mars in ſcorpione
ſub radijs tranquillitatem: in mari. Veſpertinus
Matutinus ventos. Stationari⁹ tonitrua ⁊ fulgura. Venus in ſcor-
pione ſub radijs ſine pluuia eſt. Veſpertina pluuioſa. Matutina mul-
te pluuie. Mercurius in ſcorpione ſub radijs tempeſtuoſus. Veſperti
nus ſine pluuia. Matutinus pluuioſus. ¶ Saturnus in ſagictario ſub
radijs pluuiā ⁊ nebuloſitatem. Veſpertinus frigiditatem ⁊ ariditatem.
Matutinus frigiditatem ⁊ congelationeſ. Stationarius infirmitates
hominū. Jupiter in ſagictario ſub radijs bonam complexionē. Veſ-
pertinus pluuias multas. Matutinus ſerenū. Stationarius impfectio
nem ⁊ nocumentum. Mars in ſagictario ſub radijs ſine humiditate
eſt. Veſpertinus infirmitatem ⁊ peſtilentiā. Matutinus multorū mili-
tum cōmotionem. Stationarius impfectionem ⁊ nocumentum. Ve
nus in ſagictario ſub radijs pluuioſa. Veſptina ventoſa ⁊ frigida. Ma
tutina bone complexionis. ¶ Mercnrius in ſagictario ſub radiis mul
tam pluuiā ſignificat. Veſpertinus ſine humiditate. Matutinus bonā
complexionem ſignificat. ¶ Saturnus in capricorno ſub radijs ſignifi
cat ventos boreales cum aeris obſcuritate. Veſpertinus frigiditates.
Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obſcuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidū aerem significat. Uesper-
tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatē in mari ⁊ in fluminib⁹ signi
ficat. Stationarius aquarū est signator. Mars in capricorno sub ra-
dijs nutrit. Uespertinus bonam complexionez. Matutinus byemales
dies p loca facit. Stationarius tranquillitatez ⁊ pfectionem. Uenus
in capricorno sub radijs gelida est. Uespertina frigida. Matutina plu
niosa. Mercurius in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. Ues-
pertinus ¶ Saturnus in aquario sub radijs byemē fa-
cit duram. Uesptinus timorē in mari ⁊ in fluminibus. Matutinus plu
uiam ⁊ byemē. Stationarius frigus ⁊ glatiosus. Jupiter in aquario
sub radijs bonam complexionē. Uesptinus multā pluuiā. Matutinus
multā infirmitatem repellit. Stationarius pluuiā ⁊ nutrimentū affert.
Mars in aquario sub radijs ariditatem. Uesptinus absentiā vento
rum. Matutinus incisionem eorū. Stationarius nocumentū ⁊ motio-
nem significat in mari. Uenus in aquario sub radijs nebulosa. Ues-
pertina calida ⁊ ventosa. Matutina pluuiosa ⁊ caliginosa. Mercu-
rius in aquario sub radijs niuosus. Uesptinus calidus aut gelidus tur
bulent⁹. Matutin⁹ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscib⁹ sub radijs vino-
sus. Uesptinus pluuiosus. Matutinus bonā complexionem. Statio-
narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-
gmentū piscium. Uesptinus bonam complexionem. Matutinus tran
quillitatē in mari ⁊ fluminibus. Stationarius bonā ⁊ temperatā plu-
uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem piscīū. Uesptinus ari-
ditatem. Matutinus fulgura ⁊ tonitrua. Stationarius inequalitates i
corporibus significat. Uenus in piscibus sub radijs gelidū tempus.
Uesptina aquosa ⁊ ventosa. Matutina bonā complexionem ⁊ germi-
na ⁊ feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus ⁊
pluuiosus. Uesptinus bonam complexionē. Matutinus tranquillita
tem ⁊ bonam complexionē significat. ¶ Itē saturnus in ariete sub ra-
dijs ⁊c. hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit or
haly. ¶ Sciendū ſm haly abenragel in quarto capitulo prime partis
In naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū
nascunt nubes ⁊ veniunt pluuie. ¶ Luna ē vnus planetarū significan-
tiū pluuias. similiter venus ⁊ mercurius. Per ioue clarificatur aer cur-
runt venti ⁊ salutifere pluuie. s. temporibus debitis p equalitatē ⁊ tem-
perie. calor estatis ⁊ frigus byemis remittunt. Per martē ⁊ ei⁹ accessū ⁊
recessum in suo circulo crescit ⁊ decrescit calor estatis ⁊ byemis frigidi-
tas omni anno. Et est mutabilis qz vna vice humid⁹ ⁊ alia siccus. vnde

quãdo erigit in circulo suo ꝛ sepat se ac retrahit se a fumositatib⁹ terre ꝛ humoribus. fortificatur eius caliditas ꝛ siccitas. quando vo descẽdit humectat̃ ꝛ minuit̃ calor eius. Et qñ est significator pluuie facit scintillationes ꝛ tonitrua ꝛ radios ꝛ facit mirabilia i aere. debilitat̃ in signis aqueis ꝛ fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes ꝙ qñ retrogradat̃ a sole in capricorno aquario ul̃ in piscib⁹ existente: hyems illius anni erit humida ꝛ pluuiosa. Et si retrograditur quando sol est i ariete uel tauro erunt pluuie ꝛ humiditates in vere illius anni ꝓpter retrogradationẽ veneris ꝛ accessum eius erga solem ꝛ introitum sub corpore ꝛ radijs solis. ¶ Mercurius est vnus triũ planetarũ pluuias significantiũ. ꝑ eum ꝛ ꝑ mutationẽ suam de signo in signum ꝛ ꝑ statum eius ꝛ retrogradationem ꝛ directionẽ ipsius ꝛ ꝑ oppositiones ꝛ coniunctiones suas scient̃ motus ventorũ ꝛ eorum fortitudines in omnibus temporibus illius anni: quoniam quando exit de vno signo ꝛ intrat aliud: uel quando est stationari⁹ uel retrogradus significat ventos fortes humiditates ꝛ pluuias ꝛ in aere, accidentia de nubib⁹ ꝛ turbationes ꝛ his similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in aliquo signorum aqueorũ significat qđ predixi mus. ¶ Itẽ ꝑ hyspalensem in primo capitulo volens scire ꝛc̃. luna in pluuia habet posse. Et sol nũc pluuiã nunc serenitatẽ significat. Nam cum est in loco inferiori circuli pluuiã significat. In supiori vo serenitatẽ. sic est iudicium omniuz planetarũ. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre ꝓut natura eorũ existit ꝛ ut planete ꝓmutant̃ a dextro in sinistrũ uel econuerso. Uel a velocitate, in tarditatẽ ꝛ econuerso: uel egredit̃ aliquẽ angulorum sic aeris ꝓmutatio erit. nã si mobilis est mouetur econuerso motu ventorũ. Similiter facit cõiunctio planets uel aspectue. sic etiaz significat aspectus astrorũ fixorũ. ¶ Item ſm Albumazar in primo capitulo secũde differentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planetarũ cũ sole ꝛ luna, vna estas alia calidior. Et similiter suo modo de hyeme. ¶ Item ſm albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plura bona habent̃ de accessibus ꝛ recessibus maris ſm motũ lune. Sz de hoc quere ꝛc̃. ¶ Item de virtutib⁹ planetaꝝ multa bona dicit Albumazar in sexta differentia quarti tractatus. Sz modicũ aut nihil est ibi faciens ad ꝓpositum quin virtualiter hic contineat̃. ¶ Itẽ sciendũ Saturnus in ariete sub radijs ꝛc̃. non omnes cõbinationes que possunt poni ponunt̃ semp qz forte hoc erit nimis nõ possum plus.

Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.

Item virtutes planetarū augentē qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distant a domib⁹ luminariū. Tūc enī dicunt̄ pticipare facie ad faciem. Item fortificant̄ si sint in suo baiz. Itē illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes. qui vo in cadentibus sūt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltat̄ sup alterum qñ est dexter ab illo igit̄ ꝙ sit respectu alterius supra terraz. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita ꝙ habuerit cū signo uel planeta concordiā naturalē uel accidentalē tunc fortificat̄ ⁊ p eius oppositum debilitat̄. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi ⁊ debilitandi planetas ꝫ predicti sūt principales. nec forte alij modi sūt multū necessarij ad ꝓpositum ⁊c̄. ¶ Item virtutes planetarū ⁊c̄. hoc a Ptolemeo ⁊ haly in. 23°. ca°. prime partis. Eo modo ⁊c̄. fm haly sunt mercurius in 2° a sole ⁊ in. 12°. a luna. venus in 3° a sole ⁊. 11°. a luna ⁊ sic de alijs. ⁊ lucrātur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm haly ibidē ꝙ baiz est ꝙ planeta masculinus sit in die supra terrā in signo masculino ⁊ de nocte sub terra. uel ꝙ planeta masculinus sit in signo masculino ⁊ femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra ⁊ nocturn⁹ de nocte supra terrā. hoc est fm cōmunitatē astrologorū. Postea dicit ꝙ opinio Ptolemei est ꝙ baiz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti ⁊ cū quo habet cōcordantiā. Item fm haly ibi ꝙ modi ferendi vim sūt duo ⁊ habent vnā radicem ad quam reducunt̄. s. ꝙ leuis semp exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit ꝙ in virtute supat ponderosum. Primus modus est etiā ⁊ quia haly vbi supra ⁊ Albumazar i. 7°. tractatu sui magni introductorij. ⁊ hysalensis in principio ⁊ Alchabici⁹ ⁊ plures alij faciūt de hoc mentionē ⁊ fiet extractio specialis sup hoc. ¶ Item sciendū ꝙ nō oportet cōsiderare omnes modos fortitudinū planetarū in ꝓposito: qz aliqui sūt modi qui ꝗuis facerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ ⁊c̄. tñ modicū aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā auctores se iuuāt. iō hoc sit de bene esse. ¶ Itē dubitat̄ quos ventos moueāt planete.

Capl'm. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitatū.

Item stelle fixe sūt calide uel humide: frigide uł sicce fm ꝙ sūt de natura alicui⁹ planete. Ite stelle fixe prime magnitudinis sūt fortiores ꝗ̄ secūde: ⁊ sic cōsequent̄: ⁊ que circa zodiacū ꝗ̄ que extra: ⁊ septentrionales ꝗ̄ meridionales: ⁊ ꝓpinquiores zenith capituz ꝗ̄ remotiores: ⁊ que

cõiungit cũ aliquo planeta in longitudine ⁊ latitudine q̃ in longitudine tm̃. Et que in longitudine tm̃ q̃ que nõ cõiungit. ¶ Itẽ stelle fixe debilitant̃ ⁊ fortificant̃ ꝑm loca sua respectu ascendẽtis ⁊ ꝑm figuras suas r̃spectu solis lune ⁊ triũ sup̃iorũ. Uerũtm̃ iste stelle nõ eodẽ r̃spectu redeũt Cũ sepant̃ a sole ⁊ sunt oriẽtales donec sol se ponat in q̃rta eorũ humectant ⁊ in q̃rta finistra vsq; ad oppositionẽ calescũt. Postea vsq; ad aliã quartã deficcãt ⁊ postea vsq; ad cõiunctionẽ infrigidant. Per tabulã sequentẽ patent nature stellarũ fixarũ principaliũ in longitudine tpe moderno ⁊ latitudine cũ figuris ⁊ imaginib⁹ in quib⁹ sunt uel de qua magnitudine fuerint. ¶ Itẽ stelle fixe sunt calide ⁊c. tabulã satis ponit vnimũdus. Sz hoc extrahit̃ a Ptolemeo in nono ca⁹ prime ptis quadripti. ¶ Itẽ stelle fixe magnitudinis prime ⁊c. hoc dicit baly in glosa in fine eiusdẽ noni capituli. ¶ Dubitat̃ qualiter virtutes stellarũ fixarũ cognoscunt̃ vtrũ videlicet possint cognosci ꝑ colores uel ꝑ quid. quere de hoc ⁊c. ¶ Nota q̃ a tempore consideratio⁹ Ptolemei de locis augiũ ⁊ stellarũ fixarũ vsq; ad temp⁹ consideratio⁹ Alfonsij de eisdẽ mota ẽ octaua sp̃era ⁊ ꝑ consequens stelle fixe ⁊ auges. 17. gra. 8. minuta. Et a cõsideratione Alfonsij vsq; ad finẽ anni x̃pi. 1368ⁱ. mota est ꝑ. 1. gra. 22. minuta. 18. 2ª 43. 3ª. ⁊ sic a tempore cõsideratio⁹ ipsi⁹ Ptolemei vsq; ad finez anni x̃pi predicti motus est zodiacus mobilis ⁊ imagines ipsi⁹ ꝑ. 18. gra. 30. minuta. 18. 2ª. 43. 3ª. Et cum tempore cõsideratio⁹ Ptolemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̃ incipit imago arietis fuerit distans a principio zodiaci fixi ꝑ. 6. gra. 40. minuta. Sequitur q̃ ꝑfecto anno x̃pi. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2ª 43. 3ª. ¶ Et est intelligendũ q̃ dispositiões stellarũ fixarũ denotate in p̃cedentibus ad terminũ cõplementi radicis mediarũ cõiunctionũ ordinent̃ ꝑm dispositionẽ earũ stellarũ naturalẽ ⁊ q̃ longitudines earũ incipiant̃ ex initio signi arietis ⁊ fiant ꝑm successionẽ signorũ in suo motu. Sz latitudines earũ sunt distantie illarum a via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q̃ ista stella ⁊ zubayl nõ sũt visibiles prorsus licet sint prime magnitudinis: q⁹ latitudo cuiuslibet earũ ẽ tanta versus meridiẽ q̃ sup̃ horizontẽ prorsus nõ ascendunt.

¶ Tempus inter Alfonsiũ ⁊ radicẽ istarũ stellarũ. 86. anni solares completi. Motus stellarũ in tpe p̃dicto. 44. minuta grad⁹ ⁊ ꝑm hoc motus eq̃lis earũ in vno anno fuit. 34. 2ª 49. 3ª. 25. 4ª. i. illo tpe erãt rectificate stelle. 1319. 5. menſ. Item tempus Alfonsij incepit. 1251. anni x̃pi. ⁊. 5. menſ. Itẽ a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonsij vsq; ad annos x̃pi. 1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2ª.

Tabula stellarū fixarū que sunt ꝑpe viam solis verificate ad annū domini. 1312.

	Longitudo		Latitudo		pars mū	magnitudo	
	S	g̃	m̃	g̃	m̃		
1	0	24	32	7	70	♄	3	cornua arietis
	0	25	32	8	20	♄	3	parū infrigidant ꝛ multū deficcant.
	Saturni ꝛ martis							
2	0	28	25	7	20	♄	5	In ore arietis
	0	29	22	6	0	♄	5	modicū infrigidant ꝛ humectant
	Mercurius ꝛ parū saturni							
3	1	2	52	5	15	♏	4	In pede inferiori arietis deficcant
	1	5	52	1	50	♏	5	
	1	7	32	1	20	♏	5	
	Martis							
4	1	9	12	4	50	♄	5	In cauda arietis humectant
	1	11	42	1	40	♄	4	
	1	13	12	2	30	♄	4	
	1	14	52	1	50	♄	4	
	Veneris							
5	1	27	32	9	30	♏	5	In abscisione tauri figide ꝛ humide.
	1	21	32	8	0	♏	3	
	Veneris ꝛ parū saturni							
6	1	20	2	4	30	♄	5	Pleyades
	1	20	23	4	40	♄	5	tpate inter humiditatē ꝛ siccitatem ꝛ
	1	20	32	5	5	♄	5	tendunt versus calorem.
	1	21	32	5	20	♄	5	
	Lune ꝛ veneris							
7	2	0	32	5	10	♏	1	aldebaran ca. ꝛ sicca
	Martis							
8	1	28	52	5	45	♏	3	In capite tauri multū frigide ꝛ ten-
	1	28	42	5	50	♏	3	dunt ad siccitatem.
	1	19	42	3	0	♏	3	
	2	3	32	4	0	♄	4	

	Longitudo			Latitudo		pars mũdi	Magnitudo	
	S	ğ	m̃	ğ	m̃			
	Saturni ⁊ parũ mercurij							
9	2	7	52	3	30	m	5	In sũmitate cornuũ tauri
	2	8	32	5	0	♄	5	Calide ⁊ ficce
	2	13	12	5	0	m	5	
	2	15	2	2	30	m	3	
	Martis							
10	2	24	22	1	30	m	4	In pedibus geminorũ: plus humectãt
	2	26	2	1	15	m	4	q̃ desiccant.
	2	28	2	3	30	m	4	
	2	29	52	7	30	m	3	
	3	3	32	10	30	m	4	
	Mercurij ⁊ veneris							
11	3	9	32	5	30	m	3	In coxis geminorũ
	Saturni							
12	3	11	12	9	40	♄	2	Inflãmati herculis humecti
	Mercurij							
13	3	14	32	6	15	♄	2	
	Martis							
14	3	20	32	1	0	♄	5	In capitibus geminorũ
	2	25	2	7	30	m	4	humide magis q̃ ficce
	Mercurij ⁊ martis							
15	3	26	12	11	5	♄	4	In pede cancri
	3	4	22	5	30	♄	4	In brachijs cancri
	Mercurij ⁊ parũ martis							
16	3	28	12	0	40		4	In pectore cancri
	Martis ⁊ lune							
17	3	28	12	2	40	♄	4	duo asini Hee faciũt calorem ⁊
	3	29	12	0	10	♄	4	siccitatem magnã
	Martis ⁊ solis							
18	4	12	2	9	30	♄	3	In capite leonis magne siccitatis

	Longi°		Lati°		ps	ni	tudo
	S	ğ	♏	ğ	♏	m¹	mag
	Saturni ꝛ martis						m
19	4	19	2	11	0	♄	3	In collo leonis.
	4	18	32	4	30	♄	3	
	4	20	2	7	30	♄	3	
	Saturni ꝛ parū mercurij							
20	4	20	22			♄	1	Cor leonis
	Martis ꝛ Jouis.							
21	4	29	12	12	15	♄	4	In dorso ꝛ cauda leonis.
	5	2	2	13	40	♄	2	
	5	2	12	11	30	♄	5	
	5	4	12	9	40	♄	3	
	5	12	23	12	5	♄	1	
	Saturni ꝛ veneris							
22	5	8	12	5	50	♄	3	In coxis leonis
	5	8	22	3	0	m	5	
	5	9	32	0	50	♄	4	
	5	9	32	1	15	♄	4	
	Ueneris ꝛ mercurij.							
23	5	14	12	4	35	♄	5	In capite virginis.
	5	14	52	5	40	♄	5	In oculo.
	5	17	2	6	0	♄	3	In ala meridionali
	5	18	2	5	30	♄	5	
	Mercurij ꝛ parū martis.							
24	5	26	7	1	10	♄	3	In ala septentrionali virginis
	6	1	2	2	50	♄	3	In dorso virginis
	Mercurij ꝛ parū martis							
25	6	0	2	15	10	♄	3	
	Saturni ꝛ mercurij							
26	5	14	32	3	30	m	1	Spica
	Ueneris ꝛ parū mercurij							
27	6	24	32	7	30	♄	4	In sūmitate pedū virginis
	6	25	12	2	40	♄	4	
	6	27	52	0	30	♄	4	
	7	0	32	9	50	♄	4	

	Longi-tudo		Lati-tudo		pars mũ	Magn.	
	S	ğ	ħ	ğ	ħ		
	Mercurij ꝛ martis						
28	7	5	52	7	30	♄	2	In libra super lancem
	7	0	2	8	40	♄	2	
	Jouis ꝛ martis						
29	7	9	12	1	15	♄	4	In auribus scorpionis
	7	11	52	1	40	♄	4	
	7	15	22	3	54	♄	4	
	7	20	52	4	20	♄	4	
	Saturni ꝛ mercurij						
30	7	23	32	1	40	♏	3	In fronte scorpionis
	7	23	32	5	0	♄	3	
	7	24	12	1	20	♄	3	
	Saturni ꝛ parũ martis						
31	8	0	29	4	0	♏	2	Cor scorpionis
	Martis ꝛ parũ Jouis						
32	8	5	52	15	0	♏	4	In nodis caude scorpionis
	8	11	2	19	30	♏	3	
	8	14	2	18	50	♏	3	
	8	15	52	15	10	♏	3	
	8	18	22	16	40	♏	3	
	Ueneris ꝛ saturni						
33	8	14	52	13	30	♏	4	In aculeo scorpionis
	8	15	22	13	20	♏	3	
	Mercurij ꝛ martis						
34	8	19	2	13	15	♏	4	Nebulosa
	Martis ꝛ lune						
35	8	22	22	6	30	♏	3	In sagicta sagictarij
	8	0	52	3	50	♏	4	
	Martis ꝛ lune						
36	8	24	32	2	7	♄	3	In arcu sagictarij
	8	26	52	1	30	♄	3	

	Longi- tudo			Lati tudo	pars mū.		tudo agnū	
	S	☌	♏	☌	♏			
37	9	3	2	7	45	m	4	In nube In vultu sagictarij
	9	4	12	6	45	m	3	
	9	5	32	2	30	m	4	
	9	7	52	2	30	m	5	
	Martis ☌ solis							
38	9	4	52	0	18	m	2	
	9	5	32	0	23	m	2	
	9	14	32	0	13	m	3	
39	9	16	21	5	50	m	5	In cauda equi sagictarij
	9	16	32	4	50	m	5	
	9	16	42	4	50	m	5	
	9	17	52	6	30	m	5	
	Veneris ☌ saturni							
40	9	25	12	2	20	♑	3	In cornibus capricorni
	9	25	12	5	0	♑	3	
	9	26	42	1	30	♑	6	
	Veneris ☌ modicū martis							
41	9	29	33	8	40	m	4	In pedibus ☌ ventre capricorni
	10	4	32	7	40	m	4	
	10	8	2	6	50	m	4	
	10	8	12	6	0	m	5	
	Martis ☌ mercurij							
42	10	12	42	2	10	♑	3	In ore capricorni
	10	14	21	2	10	♑	3	16 15
	10	14	42	0	20	m	4	
	10	15	32	2	50	m	5	
	Martis ☌ veneris							
43	10	2	32	8	40	♑	3	In sinistra manu aquarij
	10	4	2	8	0	♑	4	
	10	14	22	8	15	♑	2	
	10	24	12	11	15	♑	4	

	Longi tudo			Lati tudo		pars mũdi	Ma gnitudo	
	S	ğ	m̃	ğ	m̃			
	Saturni ꝛ mercurij							
44	10	19	12	5	0	m	4	In coxis aquarij
	10	19	32	7	30	m	3	
	10	22	32	5	40	m	5	
	Mercurij ꝛ saturni							
45	11	5	32	1	0	m	4	In decursu aque exeuntis de am
	11	6	52	7	30	m	4	phora
	11	7	52	0	30	m	4	
	11	8	12	1	4	m	4	
	Saturni ꝛ parũ Jouis							
46	11	9	32	9	15	♓	4	In vertice piscis meridiani.
	11	12	2	7	30	♓	4	
	11	13	52	9	30	♓	4	
	Mercurij ꝛ saturni							
47	11	13	52	6	20	♓	4	In ore piscis meridiani
	11	17	32	5	4	♓	6	
	Jouis ꝛ mercurij							
48	11	23	52	6	20	♓	4	Sup eius caudã in filo meridionali.
	Saturni ꝛ mercurij							
49	0	17	12	15	20	♓	4	In spina dorsi piscis meridiani
	0	20	2	17	0	♓	4	
	Jouis ꝛ veneris							
50	0	13	32	14	20	♓	4	In filo septentrionali
	0	14	12	12	0	♓	4	
	0	1	32	12	0	♓	4	
	Saturni ꝛ Jouis							
51	0	20	22	8	30	m	3	Lucida in ligatura piscis
	Martis ꝛ mercurii							

BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE

Capitulū. 18. De qualitatib⁹ quartarū anni.

QUattuor sūt tpa ver estas autumn⁹ z hyems. Uer ab arie te calidus z humidus. Estas a cancro calida z sicca. Autumnus a libra frigida z sicca. Hyems a capricorno frigida z hūida. ¶ Quattuor sunt tpa zc. hoc a Ptolemeo. 10°. capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Alkindus in primo z omnes in hoc concordant.

Capitulū. 19. De qualitatib⁹ planetarū diuersis in singulis q̄rtis anni: Uando in vere retrogradañ planete in quarta vernali.

¶ Qñ in vere retrogradañ planete in quarta estiuali illud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionis z ita fortificaf̄ humiditas ꝓpter solutionē glacierū p solē z planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilitatur signū humiditat⁹. ¶ Qñ in vere retrogradañ in quarta autumnali est signū humiditatis tpis ¶ Qñ in vere retrogradañ in quarta hyemali

¶ Qñ in estate retrogradañ in quarta vernali est sūmus calor in parte septentrionali z pars meridionalis infrigidaf̄ z venti calidi comburēt z consumēt herbas in parte septētrionali: z erit adhuc calor fortior si cū hoc sint in frigido eccentricorū suor. Et si fuerint illic directi orientales erit illa estas decora q̄ tunc debilitaf̄ calor z infrigidaf̄ z mitigaf̄ aura sua cū fuerit sol in angulo terre. Sz si tunc essent occidentales esset illa significatio debilior: q̄ post occasum solis appropinquāt ad zenith capitum. ¶ Qñ in estate retrogradañ in quarta autūnali signū est caliditatis in illo tpe z siccitatis nisi ingrossabunt venti meridionales. ¶ Qñ in estate retrogradañ in quarta hyemali signū est caliditatis illi⁹ hore z siccitatis sue. ¶ Qñ in autumno retrogradañ in quarta estiuali tunc soluent q̄ sol congelauit in pte septētrionali z erit tempus varians cōplexionē z erunt venti septētrionales frigidi: z si fuerint directi tūc debilitaf̄ calor planetarū: z erit gelu ad sūmū. ¶ Qñ in autumnali tpe retrogradañ in quarta autūnali multiplicabit ventus septētrionalis vi caliditatis solis cū planetis z molieī aer in parte septētrionali z ibi multiplicabit humiditas z solnūt venti meridionales q̄ ibi congelatum est Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septētrionali z quiescent venti a meridie. ¶ Qñ in autumno retrogradañ in quarta hyemali

¶ Qñ in hyeme retrogradañ in quarta vernali

¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta estiuali tūc est signū humidita tis: qz tūc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septētrionalis. Et qñ erunt directi debilitabit significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta au tumnali erit sūma humiditas in illo tpe: z erunt multi venti meridiona les z cū hoc soluet sol gelu in septētrione. Si vo fuerint directi z occidē tales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in q̄rta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint tūc directi signū est siccitatis. ¶ Qñ in vere ꝛc. Alkindus in 2°ca°. ¶ Jtē nota p quartā talē uel talē intelligunt tria signa que sol pagrat in eadez q̄rta. Capl'm. 20. De associatiōe solis cū alijs planetis qd significāt.

Item si fuerit sol a capite capricorni vsq; ad caput arietis z vn° retrograd° cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si q̄ttuor tūc humiditas filis diluuio forti. Et fortior in q̄r ta vernali uel in capite cancri. Si vo nō fuerit quis retro gradus z nō erit in naturis suis de pte tēporū suorū signi ficans humiditatē: erit siccitas quousq; retrogradet aliqs eoz z fortius in siccitate qñ erit hec significatio in quarta autumnali existentib° istis signatorib° directis: Quia si inuenirem° in illa q̄rta oēs planetas retro grados aut tres aut duos aut vnū z postea dirigant in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue ficce erit siccitas fortis fm naturam eoz q retrogradant in q̄rta autūnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea z dirigant in quarta hyemali signū est siccitatis in oīb° mūdi climatib° ¶ Jtē si fuerit sol ꝛc. Alkindus in tertio capitulo.

Capl'm. 21. De cōbustis planetis quid significent.

Item dū cōburit aliquis leuiū in q̄rta antumnali z fuerit direct° signū est frigiditatis z gelu. Et cum cōburit in hye mali significat nubila z ventos meridionales. Qñ autē cōburit in vernali sig̃t nubila Qñ vo in estate si g̃t calidi tatē fulgura z tonitrua. Et qñ cōburūt pōderosi sūt hui° significatiōis nisi q sūt debiliores. ¶ Jtē dū cōburit aliqs leuiū ꝛc. hoc Alkindus in. 4°ca°

Capl'm. 22. De nā z q̄ntitate diuersa quarta

Scias q dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A meridie vo ad occasū nature estat. Ab occasu ad mediā noctē nature autūnalis. A media nocte ad ortuz nature hyemalis. ¶ Scias q dies ꝛc. Alkind° in. 3°ca° ¶ Jtē de hac materia dicit in. 31° differētia sexti tractat° introdu-

ctorij Albumazaris. ibi enī habet de naturis tēporū anni ꝛ ptiū dierū ꝛ quartarū zodiaci ꝛ ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē posuit alkindus. ¶ Itē quō planete superiores possunt esse cū sole retrogradi. Ad qō dicit Leopaldus qꝫ de superioribus nō pōt hoc fieri nisi ꝑ aspectus. ¶ Item sciendū ſm albumazar in. 28° differentia sexti tractatus sui introductorij qꝫ in oī hora efficiūt in circulo q̄ttuor qnarte. sicut sūt q̄ttuor tpa anni. ꝛ. 12. dom° sicut sūt. 12. signa. Quarta igit̄ ab ascendēte ad mediū celi ꝛ ei° opposita sūt dextre ꝛ masculine. Alie vo sinistre ꝛ feminine. Sūt etiā ibi q̄ttuor anguli q̄ttuor succedētes ꝛ q̄ttuor cadētes. Itē ſm q̄ttuor quarte luminū sil'es suo modo q̄ttuor āni triplicitatib°.

Cap'm. 23. De locis pluuiarū in terra ꝛ de ꝓuincijs quibus signis subiecte sunt.

Nature temporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo augent̄ uel diminunt̄ ſm appropinquationez illi° terre ab equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est ficca ꝛ occidentalis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida. Nature tēporū ꝛc̄. hoc habet̄ in alkindo cap'o. 5°. Item ps orientalis ꝛc̄. Ptolemeus in. 12°. ca°. prime ptis. ꝛ habent̄ etiā qualitates ſm istas ptes. ¶ Itē Ptolemeus satis concordat cū ista ꝓpositiōe nature tēporū in. 2°. ca°. secūde ptis quadripartiti.

Cap'm. 24. Per que loca terre fiunt pluuie.

Item ciuitates in quibus fiunt pluuie sunt inter latitudinez. 9. graduū ꝛ. 60. graduū *In alijs autē ꝓp̄ multitudinez caloris ꝛ frigoris nō fit nisi caloris siccitas ꝛ gelu.* ¶ Item ciuitates ꝛc̄. Alkindus in. 5°. ca°. Cap'm. 25. Que loca terre cuilibet triplicitati subiecta sunt.

Item Trigonus arietꝭ ptinet ad angulū terre habitabilis inter septētrionē ꝛ occidens. Et eius prim° gubernator est iupiter ꝛ mars habet pticipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri ptinet ad angulum qui est inter meridiē ꝛ oriens ꝛ eius prim° gubernator est venus pticeps vo saturnus. ¶ Trigonus geminorū ptinet ad angulū terre int̄ septētrionē ꝛ oriens ꝛ gubernator ei° prim° est saturn° pticeps vo iupiter. ¶ Trigon° cancri ptinet ad angulū qui est int̄ meridiē ꝛ occidens ꝛ gubernator est mars, deinde pticipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus ꝛc̄. hoc a Ptolemeo in. 3°. ca°. secūde partis quadripartiti.

Cap'm. 26. De ꝓuincijs quib° signis sint subiecte.

Item sūt ꝓuincie. 72. cū. 12. signis concordantes ſm Ptolemeū ita qꝫ versus sinistrā sint ꝓuincie remote a medio habitationis ꝛ versus dextrā ꝓuincie ꝓpinque.

Aries britania salatia vescamica.
Taurus cornua media persia
Hemini organia armenia mananeua
Lancer nomdia cargadema africa.
Leo italia gallia apuleia cecilia
Virgo babylonia algeziraetor.
Libra naquitrina cazqueda azonca.
Scorpio matagonitas marontania cantolia.
Sagictarius torcia calciata hispania.
Capricornus India orbana iadiechia.
Aquarius zaromatica torana acobod.
Pisces carmia vogofonia catizomonicas ⁊ garatica.
♈ Josum andonia terre iudeorũ.
♉ toclad cablaz riperus asie minor.
♊ corũãta in armonica insanus egyptus.
♋ zoma tusquia quinginqua.
♌ caprica zallia oratiza.
♍ aloe alaya trozen.
♎ cays ananzes caladotica.
♏ corma comatza cadoquia.
♐ terra de arabia ꝑplata.
♑ braga magodonia albabiris.
♒ arania adama ⁊ anthiopia mediana.
♓ lodia galliquia tamalia.
Item iste ꝓuintie. hoc a Ptolemeo.
¶ Sciendum ꝙ in quolibet 4°. terre sicut ꝓuincie que ꝑprie concordant cũ altero signo triplicitatis gubernantis illud quartũ ⁊ cũ planetis gubernantib⁹. ſz hoc diuisimus qz ꝓuincias ſm ista noia nõ bene cognoscimus nec ibi ꝙ quadripartitũ Ptolemei cõplementũ habemus. Quia etiã ꝙ modũ supradictũ poterimus cognoscere cũ quibus stellis seu planetis habuerũt concordantiã sufficiant illa que de ꝓuincijs scripta sũt.
¶ Item sciendũ ſm Ptolemeũ ⁊ haly in tertio ca°. secunde partis quadripartiti ꝙ si imaginet linea equidistãs equinoctiali ⁊ distans ab eo 36. gradib⁹: Item imaginet linea transiens ꝙ polos mũdi intersecans lineã ꝓdictam ⁊ distans ab occidente. 56. gradib⁹. punctus intersectionis dicit medium terre habitabilis. Due autem linee predicte distinguunt angulos terre predictos. ¶ Secundũ igit ꝙ aliqua ꝓuincia plus approꝓinquabit medio terre habitabilis ſm hoc plus participabit ut

Medium terre habitabile

gubernet a signo ꝛ planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiu-
torio mercurij. ¶ Item sciendū qꝫ p effectus possumus cognoscere pro
uincias ꝛ villas cū signis ꝛ planetis concordantes sicut p complexiões
ꝛ mores hominū ꝛ sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capitu
li secūde ptis. ¶ Itē ex tertio capitulo secunde ptis sciendū qꝫ stelle fixe
concordant cū puincijs fm illū gradū in quibꝰ sunt. Item in eodē capi-
tulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quibꝰ erāt
sol ꝛ luna ꝛ loca angulorū ꝛ maxime ascendēs in principio sue edifica-
tionis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis qui
eā edificare mandauit. Hec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad
iudicia mutationis aeris ꝫ forte plus facerent ad iudicia fortuniorū uł
infortunioꝝ illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq̄ loca esse in
tantū calida ꝛ alia intantū frigida qꝫ ibi nullū cōponit aial in tertio tra
ctatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota fm eūdem in qnta
differentia tertij tractatus qꝫ in terris duris ꝛ densarū partiū ꝛ in locis
montiū plus congregant venti q̄ꝫ in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

Item aries habet ꝛc̄. hoc in differentia quarta sexti tractatꝰ sui
introductorij. ¶ Item nota si placet sup illa ꝓpositione. nature
temporū ꝛc̄. sniam in. 5°. ca°. Cum volueris scire quantitatē na-
ture temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq̄
ad illam partē. Scias effectus calidorū ꝛc̄. s. in eodem libello Alkindi
quinto capꝫo. Item Albumazar in cōiunctionibꝰ magnis i vltima dif-
ferentia quarti tractatus ꝛ hyspalensis in pluribꝰ locis. ꝛ Alchabitius ꝛ
haly abenragel ꝛ plures alij fecerunt mentionem de istis terris ſz forte
alias poterunt poni cum p̄dictis q̄uis nō sit magna vis quere hoc.

Sequit secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones
magnas ꝛ eclypses ꝛ introitum solis in punctis equinoctialibus ꝛ a li-
js locis determinatis in zodiaco signorū.

Oniũctio maxima est cõiũctio triũ superiorũ.

si igit cõiungant in exaltationib⁹ suis signant aptationẽ aeris. Sed in casibus suis signãt siccitatẽ ⁊ terre sterilitatẽ. In signo autẽ aquatico multitudinẽ pluuiarũ. In aereo mltitudinem ventoꝝ. In terreo supfluitatẽ frigoris. In igneo siccitatẽ: ⁊ hoc idem intellige de cõiunctione saturni ⁊ iouis ⁊ martis. ¶ Oniunctio maxima est cõiunctio triũ ⁊c. hoc messahalach in .7°.9°.19°.⁊.11°.caplis. Lapl'm secundũ.

Cum fuerit saturn⁹. s.i signis pmarũ cõiunctionũ i quibus fiebãt ꝺiũctiones saturni ⁊ iouis ⁊ ascendẽtib⁹ earũ aut piecerit radios suos ad ea ex oppositiõe ul' q̃rto aspectu aut fuerit ipedit⁹ in signis terreis tenebras aeris ⁊ terremotũ faciet. Si in aereis niues ⁊ flatus ventoꝝ nocibiliũ ⁊ frigus. Si in aquaticis submersiões ⁊ ꝺiluuia ⁊ ꝑm quãtitatẽ fortitudinũ i loco erit euent⁹. ¶ Cũ fuerit saturn⁹ ⁊c. hoc i floribus Albumazaris sexti tractat⁹ terremot⁹. Capitulũ tertiũ.

Tẽ ꝺiũctio saturni ⁊ martis i ariete cuz testimonio iouis ⁊ lũe sigt siccitatẽ ⁊ aliqꝺ signale i aere. Itẽ ꝺiũctio eoꝝ i tauro cũ testionio luminariũ iouis ⁊ veneris augmentũ aquarũ ⁊ flatũ ventoꝝ. Itẽ ꝺiũctio eoꝝ i cancro cũ testimonio luminariũ ⁊ iouis sigt in oĩbus horizontib⁹ siccitatẽ. Itẽ ꝺiũctio eoꝝ i leone sigt timorẽ ꝑpter apparẽtiã signaliũ. Itẽ ꝺiũctio eoꝝ i virgine cũ testionio mercurij sigt tempestatẽ i seminib⁹. Itẽ ꝺiũctio eoꝝ i libra cũ testionio iouis sigt rubedinẽ i aere i ãno illo. Itẽ ꝺiũctio eoꝝ i scorpiõe si cũ eis fuerit iupit ⁊ luna sigt multas pluuias in pluuialib⁹ locis ⁊ cõmotionẽ mariũ. Itẽ ꝺiũctio eoꝝ i capricorno cũ testionio solis ⁊ mercurij sigt multitudinẽ ventoꝝ ⁊ fulguꝝ Itẽ ꝺiũctio eoꝝ in aq̃rio cũ testionio lune sigt paucitatẽ aquaꝝ pluuiarũ ⁊ multitudinẽ nubiũ. Itẽ ꝺiũctio eoꝝ i piscib⁹ ⁊ sol fuerit infortunat⁹ ex ꝺiũctiõe eoꝝ sigt paucitatẽ roris. ¶ Itẽ ꝺiũctio saturni ⁊c. hoc in cõiũctionib⁹ magnis Albumazaris ꝺria. 8ª ⁊ 1ª tractat⁹. ¶ Intelligendũ q̃

dicit. Cū fuerit saturn⁹ in signis primarū ɔiūctionū ⁊ ascendētib⁹ eaꝝ ⁊c̄ ꝑsigna primaꝝ ɔiūctionū intelligo in qb⁹ fiebāt ɔiūctiōes saturni ⁊ iouis ⁊ si g̃ q̃ erāt in ascendētib⁹ eaꝝ ɔiūctionū. Sz quō habet ascēdēs taliū cōiūctionū dicit ꝙ ascendēs alicui⁹ magne ɔiūctiōis ē ascendēs āni in q̃ fuit ɔiūctio illa: q̃re de hoc ⁊c̄. ¶ Itē sciendū fm baly in fine. 2ᶜ ꝑtis q̃driptiti ⁊ ē fm hermetē ut dicit ꝙ qñ ɔiūgunt̃ due infortune i signo terreo ⁊ fuerint ipediti luna existēte secū sig̃t ꝙ erit terremot⁹ magn⁹ ⁊ ruina ciuitatū ⁊ parietū. Et si aqueū erit dānū ⁊ forte nocumentū in aquis ¶ Itē ibidē dicit̃ ꝙ caput draconis calidū. cauda aūt frigida. Si saturnus se ɔiūxerit cū cauda dracōis hora significatiōis sig̃t ⁊ famē ⁊ forte frigus. ¶ Itē nota fm albumazar in dria. 2⁹ ꝑmi tractat⁹ de cōiūctiōib⁹ magnis ꝙ cōiūctio q̃ significauit diluuiū fuit añ illud diluuiū. 2287. āni Daomar dicit. 2279. āni. dñs orbis tūc satn⁹ cū signo cācri ⁊ fuit diluuiū die veneris ⁊ fuerit āni ade. 2226. vn⁹ mēsis. 23. dies ⁊. 4. hore. ¶ Itē ex̄ textū sic iueni scriptū imediata ɔiūctio saturni ⁊ iouis i ariete fuit añ diluuiū ꝑ. 81. ānos. ⁊. 202. dies ⁊ in. 6° gradu ⁊. 5°. minuto arietis. ⁊ hoc significauit diluuiū ⁊ sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn⁹ orbis cōtinet. 360. ānos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itē numer⁹ dierū a ꝑmo die diluuij vsq; ad primū diē x̄pi annoꝝ q fuit i die sabbati. 1132959. ¶ Itē nota fm Aristotelē in libro de ꝓprietatib⁹ elementoꝝ ꝙ diluuiū quod fuit in terra non fuit nisi *propter coniunctionem stellarum erraticarū in piscib⁹ ⁊ vent⁹ q interfecit gentes in addramoch fuit ꝓpter cō iūctionē eoꝝ i geminis.* ¶ Itē q̃uis diluuiū ꝑticulare potuisset significari ꝑ ɔiunctionē planetarū tñ diluuiū vl̄e nō. sicut forte etiā bonitas ⁊ excellētia dñi nr̄i ih̄u x̄pi seu beate v̄ginis potuer̄t ꝑ stellas repr̄sentari: ut in Ouidio de vetula aliq̄liter tangit̃ tñ ꝙ dinitas cū humanitate cōiūgeret̃ hoc supnāliť factū ē. etiā vl̄itas diluuij potuit miraculose eo incidere cū tpe significatiōis nālis diluuij ꝑticularis. ¶ Itē sciendū ꝙ diluuiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraꝝ cōtecto. 2ᵐ diluuiū tpib⁹ iacob patriarche in achaia. tertiū a tpe moysi in thessala cū in mōte pnaso fugierūt hoies. Lapl̄m. 4. De tēperie aeris ꝑ eclypsim.

Cum fuerit eclypsis solis in signis igneis sig̃t siccitatem ⁊ terre sterilitatē. Et in aq̄ticis multitudinē pluuiaꝝ ⁊ decrementum ab eis nisi aspexerint fortune. Cū fuerit eclypsis lune in signis frigidis sig̃t grauitatē frigoris ⁊ in aq̄ticis nimietatē pluuiaꝝ si adiuuat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas sig̃t tēperamentū aeris ⁊ sic de alijs. Cū fuerit eclypsis solis i signis igneis ⁊c̄. messabalach i. 7° ca°. ¶ Cū fuerit eclypsis lune in signis frigidis, hoc messalbaach i. 5° ca°

Capl'm.5. De significatione eclypsis in qua pte terre ꝛ qñ eueniet.

ITem in puincia uel ciuitate cū signo eclypsis concordan
te maxime si fuerit ibi visibilis eclypsis erunt accidentia
potissime que p eclypsim significant. ¶ Itē accidens du
rat fm numerū horaꝝ equaliū durationis eclypsis p ānos
videlicet si fuerit solis. menses aūt si fuerit lune. ¶ Item
principiū accidentis erit fm qđ distat eclypsis ab ascen-
dente. Vbi gratia: si sit versus orientē erit in q̄ttuor primis mensib⁹ ꝛ erit
maior fortitudo in termino primo totius durationis accidētis: ꝛ si ver-
sus mediū celi pricipium erit in alijs quattuor mensib⁹ ꝛ maior fortitu-
do erit in termino medio: ꝛ si fuerit versus occidentem principiū erit in
quattuor vltimis mensib⁹ ꝛ erit fortitudo in termino postremo. Itē au
gmenta uel decrementa accidentium veniūt in locis habentib⁹ in alijs
accidentib⁹ rationē: uel in locis habentib⁹ cū eis pticipationē in figura.
Veniūt etiā augmenta accidentiū uel decremēta fm status essentiales
ꝛ accidentales planetarū significatorū ꝛ fm pticipationē eorū in figu-
ra cū signis accidentia opantib⁹. Unde si significatores fuerint orietā-
les stantes veniet p eos augmentum. ꝛ si occidentales ꝛ sub radijs aut
ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum acci-
dentiū. ¶ Significatores autē eclypsiū appellant illi qui habuerunt di
gnitates essentiales ꝛ accidentales in loco eclypsis ꝛ angulo qui ē ante
eclypsim: sicut sunt applicatiões ꝛ ptinentie terre ꝛ fm pticipationem fi
gure: aut qꝝ fuerint dñi exaltationū trigonorū aut terminorū ꝛ hoc siue
sit vnus uł plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclypsis est p̄ponendus:
si vo plures ibi habuerint equales dignitates p̄ponemus eū qui magis
fuerit ibi circa angulū aut in suo haiz. Postea signatores in stellis fixis
lucētibus sūt etiā considerandi ꝛ illi qui sūt in signo eclypsis uel cū an-
gulo qui fuerit ante eclypsim. Ultimo vo considerand⁹ est planeta q̄ bo
ra eclypsis fuerit cum ascendente uel cū medio celi qualiscunq; sit eorū
qui sequunt locū eclypsis. ¶ Figure autē bestiaruꝝ siluestriū a parte se-
ptentrionali qñ habuerint fortē significationē in eclypsibus significāt
ꝓprie terremotū ruinā castrorū ꝛ motuū aeris sine suspitiõe. a parte vo
meridiei significāt cursū ventorū ꝛ multitudinē pluuiarū suo tpe. ¶ Itē
in puincia uel ciuitate ꝛc̄. hoc habet ex dictis Ptolemei ꝛ haly. 5°. ca°. se-
cūde ptis. Itē accidēs ꝛc̄. hoc habet in ca°. eiusdē ptis. Itē principiū ꝛc̄.
hoc in ca°. Itē augmenta ꝛc̄. hoc a Ptolemeo in. 6°. ca°. eiusdē ptis. Si
gnificatores ꝛc̄. hoc totū vsq; ibi. Si igit saturn⁹. extrahit ex dictis Pto
lemei in septimo capło secūde ptis quadripartiti.

significatores eclypsium q̄m

Capitulū sextm. significatione significatoꝝ eclypsiū

Tem si significatores tpe eclypsis fuerint in signis solstitialibus uel equinoctialib⁹ significatio sua generaliter erit in statib⁹ aeris in ꝓprijs temporib⁹ illi signorsicut ī ariete si in vere: in cancro vo si i estate ꝛ sic de alijs.

Capm septimū De significatiõe almutez eclypsis: ꝛ de dignitatibus essentialibus ꝛ accidentalib⁹ que sint.

Si igit saturn⁹ fuerit solus gubernator signat dānū ꝓpter frigus niues magnas grandines ꝛ nubes spissas potissime cū significatio eius fuerit in statu aeris. Si iupiter significat temperiē aeris cū multitudie ventorū. Si mars fīgt calorē ꝛ siccitatē ꝛ vētos calidos ꝛ corruptos ꝛ mortales tempestates radios ꝛ radios qui dicit caristo cū paucitate pluuiarū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriētibus. Si mercurius significat ventos turbinosos ꝛ festinos qui de leui mutant tonitrua corusca tiones terremotus ꝛ relāpagos: ꝛ qñ abscōditur fīgt minutiones in aquis: ꝛ qñ apparet auget. vnde qñ intrat sub radijs facit siccitatē ꝛ exit de sub radijs ꝛ ascēdit opaī humiditatē. ¶ Notandū etiā ꝙ loca in quib⁹ mercurius facit siccitatē sunt qñ est in dignitatib⁹ planetarū siccorū aut cū eos aspicit aut qñ intrat sub radijs solis ꝛ ecōtra autē est de humiditatib⁹. ¶ Si igit saturn⁹ ꝛc. hoc habet ex dictis ptolemei in. 8°. ca°. secūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū ꝙ multa alia sūt iudicia ꝓ eclypses que hic nō ponunt quia nō multū faciūt ad ꝓpositum. ꝛ de hoc specialē tractatū facere intendimus ꝓ dei gratiā. ¶ Nota ꝝm haly in sexto ca°. eiusdē ptis ꝙ ab horis tēporalib⁹ sciemus qñ erit accidens: ꝛ ab horis equalib⁹ quāto tpe durabit: ꝛ ab ascendēte principij eclypsis sciemus principiū accidentis: ꝛ ab ascendēte medij qñ erit maior fortitudo: ꝛ ab ascendēte finis cōplemētū. Et ab ascendēte coniūctionis sciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē sciendū ꝙ ꝓ horas tpales cognoscim⁹ qñ erit accidēs: ꝑ ꝙ significatio eclypsis solis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune vo vltra. 12. mēses. ¶ Itē sciendū ꝙ si cū eclypsi solis fuerit aliq̄ cōiūctio magna uel pua duplicabunt anni durationis ꝝm temp⁹ reddit⁹ illi⁹ cōiunctiōis uel oppositiōis uel alteri⁹ applicatiōis: ꝛ sic accidētia durāt denaria uel centenaria ul' millenaria annoꝝ. Si vo hoc fuerit cū eclypsi lune duplicabunt in menses. vbi gratia. Si cū eclypsi solis fuerit cōiunctio saturni ꝛ iouis in ꝑncipio arietis ꝛ durauerit eclypsis ꝙ duas horas durabit accidens fere. 12000. ānorū ꝛ si lune tot menses. Uerū est tñ ꝙ in tanto tpe mutant accidētia

p ſimilitudinē uel diſſimilitudinem ſignificationū eclypſiū ꝛ ɔiūctionū cōmediarū ꝛc̄. ¶ Jtē ſciendū q̄ fortitudo maior fuerit in principio medio uel fine duratiōis aſcendētis ſm elongationē ab aſcendēte ē regula generalis eclypſib⁹ cōiunctionib⁹ ꝛ oppoſitionib⁹ ꝛ ɔib⁹ applicationibus. ¶ Jtē nota ſup illa pticula. ſignatores ꝛc̄. ſm haly. 7°. ca°. 2°. ptis q̄ dignitates eſſentiales planetarū ſūt ſicut dom⁹ exaltatio triplicitas terminus ꝛ facies. Accidētales aūt ſūt applicatio ſeparatio oriētalitas occidentalitas maſculinitas uel feminitas. Aptio aūt cuz ſole ꝛ luna pticipatio in figura uel q̄ fit cū eclypſi ſup uno circulo uel ſup duobus circulis eq̄diſtantib⁹ uel q̄ habeat ſitū talē qualē hz eclypſis ꝛ hoc ē eſſe cum in uno circulo ex circulis q̄ ſūt eq̄diſtātes horizonti. Vbi grā: q̄ ſi altitudo eclypſis verſus orientē ſit. 7. graduū q̄ etiā ille planeta verſus occidens habeat altitudinē. 7. graduū ꝛ hac manerie q̄ habeat dignitates in angulo q̄ aſcendit añ eclypſim eſſentiales uel accidētales talis ē dñs eclypſis. ¶ Jtē ſciendū ſm haly q̄ angul⁹ añ eclypſim dicit ille q̄ hz tranſire p̄ locū p̄ modū equinoctij. ¶ Jtē ſciendū ſm haly ibidem q̄ ſi plures ſignatores fuerint equales in dignitatib⁹ p̄ponendus eſt ille qui fuerit in angulo fortiori ꝛ generaliť ille qui fuerit in ſuo haiz. ¶ Jtē ſm haly ibidem Ptolemeus noiauit ſignatores ſic ſole ꝛ luna q̄ op⁹ eo⁹ reducit ad nām p̄dictis. ¶ Jtē ſciendū ſm haly ibidē q̄ ſtelle lucētes de q̄b⁹ facit mētionē Ptolemē⁹ in. 5. p̄mis magnitudinib⁹. ¶ Jtē ſciēdū ſm haly ibidē q̄ angul⁹ añ eclypſim ſup p̄tē occidētalis ab eclypſi ꝛ angulus q̄ ſequit eclypſim ſe ponet in loco eclypſis in motu firmamenti p̄ quē facit diē ꝛ noctē. ¶ Jtē ſm haly ad figuras anguli anterioris ꝛ eſt q̄ poſtea ſequit aſpicere nō oportet. ¶ Sciendū q̄ ex dictis haly ꝛ Ptolemei habet q̄ angul⁹ occidentis p̄fert medio celi ꝛ mediū celi aſcendēti q̄ ſi eclypſis ſit ſupra terrā aſcendēs nō pōt eſſe occidentalis ab eclypſi ꝛc̄. q̄re de hoc. ¶ Jtē p̄ colores in eclypſib⁹ apparētes pōt fieri iudiciū: ſz de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mentionē. ¶ Jtem in centiloquio Ptolemei ꝛ in hyſpalenſi fit mentio de eclypſib⁹ ꝛ alibi vide ſi vis placet mihi. La. 8. De ſignificatiōe marſ̄ hora reuolutiōis.

SJ in hora reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ ſuis ſig̃t multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē ſaturni paucitatē earū. Jn alijs autē mediocritatē earū. Si in hora reuolutiōis ꝛc̄. hoc habeť ab albumazare in floríb⁹ ſuis in capło Scia autē pluuiarū ꝛ in ɔiūctionib⁹ magnis capitulo. Et ab hyſpalenſi capitulo primo.

Capitulū. 9. De ſig̃tione ſaturni ꝛ reliquorū planetarū in ſingulis ſignis hora reuolutionis

Item si saturn⁹ hora reuolutiõis fuerit in ariete ꝛ ei⁹ latitudo fuerit septentrionalis sig̃t corruptionẽ ꝛ densitatẽ aeris. Si fuerit meridionalis grauitatẽ frigoris ꝛ gelu in suis tpib⁹. Saturn⁹ in tauro septẽtrionalis signat tẽperamentũ: ꝛ pluuie erunt vtiles. meridionales vo corruptionẽ aeris. Saturnus in geminis septẽtrionalis sig̃t ventorũ flatũ vehementiũ ꝛ terremotus. meridionalis paucitatẽ pluuiarũ qꝛ si cũ hoc occidẽtalis fuerit sig̃t siccitatẽ aeris ꝛ desiccationẽ fontiũ. Saturnus in cãcro: septẽtrionalis sig̃t paucitatẽ aquarũ in fluminib⁹ atq; pluuiarũ. meridionalis mediocritatẽ. orientalis frigus tpe suo. occidẽtalis pluuias ꝛ ventos. Saturn⁹ in leone: septẽtrionalis multitudinem sig̃t pluuiaꝝ. Saturn⁹ in virgine: septẽtrionalis sig̃t suauitatẽ ventorũ. meridionalis paucitatẽ pluuiaꝝ ꝛ cõsumptionẽ aquarũ fontiũ. Saturnus in libra septẽtrionalis sig̃t siccitatẽ aeris ꝛ calorẽ ei⁹ paucitatẽ pluuiarũ ꝛ cõsumptionẽ aquarũ. meridionalis vo suauitatez ventoꝝ. Saturnus in scorpiõe: septẽtrionalis sig̃t multitudinẽ pluuiaꝝ ꝛ abundantiã aquaꝝ fluminũ. Saturn⁹ in sagictario: septẽtrionalis sig̃t multitudinẽ aquaꝝ fontiũ ꝛ frig⁹ hyemis. Saturn⁹ in capricorno: septẽtrionalis sig̃t tẽperamentũ aeris. meridionalis tenebras aeris tpe hyemis nubes atq; frig⁹. occidẽtalis calorẽ. Saturn⁹ in aquario: septẽtrionalis signat multitudinẽ pluuiaꝝ grandinẽ frigus ꝛ gelu. meridionalis paucitatez aquaꝝ fontiũ ꝛ fluminũ. Saturn⁹ in piscib⁹: septẽtrionalis sig̃t multitudinẽ flatus ventoꝝ septẽtrionaliũ ꝛ grauitatẽ frigoris hyemis. ¶ Jupiter in ariete: septẽtrionalis bonã cõplexionẽ aeris ꝛ paucitatẽ pluuiaꝝ meridionalis corruptionẽ ventoꝝ ꝛ grauitatẽ eoꝝ. Jupiter in tauro septẽtrionalis signat imobilitatẽ aeris ꝛ calorẽ. meridionalis abundantiã pluuiaꝝ ꝛ aquaꝝ fontiũ. Jupiter i geminis: septẽtrionalis bonitatẽ ventoꝝ mediocritatẽ pluuiaꝝ. meridionalis multitudinẽ tonitruoꝝ ꝛ fulminũ. Jupiter i cancro: septẽtrionalis bonitatẽ aeris ꝛ abundantiã pluuiaꝝ tonitruoꝝ ꝛ fulminũ. meridionalis pulchritudinẽ aeris. Jupiter i leone: septẽtrionalis grauitatẽ tonitruoꝝ ꝛ fulminũ. meridionalis siccitatẽ aeris ꝛ paucitatẽ pluuiaꝝ Jupr̃ in virgine: septẽtrionalis sig̃at paucitatẽ tonitruoꝝ ꝛ fulgurũ ꝛ mlt̃itudinẽ pluuiaꝝ. Si meridionalis pulchritudinẽ aeris. Jupit̃ i libra: septẽtrional' sig̃t multitudinẽ vẽtoꝝ occidẽtaliũ. meridionalis paucitatẽ pluuie. Jupit̃ i scorpiõe: septẽtrionalis bonitatẽ vẽtoꝝ. meridionalis multitudinẽ tonitruoꝝ. Jupit̃ i sagictario: septẽtrional' bonitatẽ aeris. meridional' paucitatẽ pluuiaꝝ. Jnpit̃ i capri. septẽtrional' multitudinẽ tonitruoꝝ ꝛ pluuiaꝝ ꝛ fulgurũ

Jupiter in aqnario septentrionalis tenebras aeris ⁊ multitudinē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū ⁊ fulgurū. Jupiter in piscibus septētrionalis significat multitudinē aquarū fluminū ⁊ fontiū. meridionalis multitudinē pluuiarū ⁊ paucitatē tonitruorū ⁊ fulminū.

¶ Mars in ariete septētrionalis signat calorē aeris ⁊ paucitatē pluuiarū. meridionalis grauitatē tonitruorū ⁊ fulminū. Mars in tauro septētrionalis multitudinē pluuiarū ⁊ bonitatē herbarū. meridionalis multitudinē tonitruorū septētrionaliū. Mars in geminis septentrionalis multitudinē pluuiarū. meridionalis paucitatē aquarū fontiū ⁊ fluminū. Mars in cancro septentrionalis paucitatē aquarū fontiū ⁊ multitudinē frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatū ventorū. Mars i leone septētrionalis paucitatē aquarū: directus flatū ventorū occidentaliū.

Mars i virgine

Mars i libra septētrionalis multitudinē tonitruorū ⁊ fulminū. Mars in scorpione septētrionalis paucitatē aquarū. meridionalis multitudinem aquarū fontiū. Mars in sagictario septētrionalis bonitatē ⁊ pulchritudinē. Mars in capricorno septētrionalis multā niuē cū frigore nimio. meridionalis calorē. Mars in aquario septētrionalis multitudinē frigoris ⁊ niuis. meridionalis grauitatē caloris specialiter retrogradus. Mars in piscib⁹ septētrionalis significat bonitatē cōplexionis aeris. meridionalis

Itē si saturn⁹ hora reuolutionis ⁊c. hoc extrahit ab Albumazare in florib⁹ suis capło tractatus *in ptibus latitudinis ⁊c. ⁊ in duob⁹ sequentib⁹ caplis. dicit etiā in fine illorū capitulorū q⁹ de inferiorib⁹ nō facit mētionē qz suos effect⁹* nō est ita exptus sicut de trib⁹ supiorib⁹.

Capitulū decimū.

ITē in reuolutiōe anni si plures planete fuerint cōiūcti i signis aq̄ticis sig̃t multitudinē plnuiarū. In igneis supfluitatē calor⁊ siccitatē ⁊ terre sterilitatē. In aereis multitudinem ventorꝝ. In terreis gelu atqꝫ niues. Siliter in q̄rtis ānis cū fuerit i signis frigidis sig̃t grauitatez frigoris. ¶ Itē cū mars fuerit dñs q̄rte estiualis ⁊ fuerit in aliq̄ domorū mercurij sig̃t multitudinez pestilentiarū. Et scito q⁹ grauitas siccitatis ⁊ terre sterilitas ⁊ penurie ānone nō sit nisi ex coiūctione planetarū i signis igneis ⁊c. Itē in reuolutiōe āni ⁊c. hoc messahalach in. 4°. ca°. ¶ Itē in reuolutiōe āni si saturn⁹ fuerit i signo terreo ⁊ nō fuerit planeta beniuol⁹ aspiciēs ipsū ⁊ fuerit luna i aspectu q̄rto ul⁹ opposito cū ipso tūc sig̃bit sup terremotū magnuz in q̄libet loco in cui⁹ signo fuerit saturn⁹ aut in aliq̄ angulorū signi terre. Itē in reuolutione ⁊c. hoc Abrahām secūdo capitulo. ¶ Item in reuolutiōe anni si mars fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autē minuet: ⁊ qñ

ſaturnus eſt in terreo addet frigiditatē. mars ṽo minuet. Mars autem i aereo addet caliditati ſue. ſaturn⁹ ṽo minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo addet frigiditatē. mars minuet eā. Jtē in reuolutione ꝛc̄. hoc Alkindus 8°. capl'o. ¶ Jtem in reuolutione inſpice dñm anni ꝛ lunā ꝛ partē fortu ne ꝛ dñm partis ꝛ tardagotū ꝛ quis habuerit dominiū ſup omnes. Si ſaturnus venus ꝛ luna ꝛ mercurius: erit pluuia anni multa maxime ſi fuerit in ſignis pluuioſis in aquario aut i fine capricorni ꝛ arietis ꝛ tau ri ꝛ principio leonis. Amplius illis ſcorpio piſcis ꝛ aquari⁹ ꝛc̄. Jtem in reuolutiōe ꝛc̄. hoc Alkindus. 8°. capl'o. ¶ Amplius ſub anni cōuerſione mars in ſcorpione venerē reſpiciens imbrib⁹ emanat. venus autem in ſcorpione exiſtens a marte reſpecta ꝓpter maria que ſcorpio habet plu uiarū facit iudicium. Si ṽo martis aſpectu careat ex relicto ducato nō erit multarū imbriū vbertas. Jtē venus ꝛ luna ꝛ mercuri⁹ ſub anni cō uerſione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca vtraq; domus ſaturni. earūq; oppoſita leo videlicet ꝛ cancer. de quorū numero piſces itidē erūt ꝓpter riuos quos habent ꝛ flumina. ꝛ ſagicta rius ꝓpter maria que in eius extrema ſūt uel exiſtunt. ꝛ ſcorpio ꝓpt̄ ſua loca ꝛ littora. Luna itaq; applicans veneri in eiſdē locis imbres ꝓten dit futuros. Sūt autem paucorū imbriū ſigna taurus ꝛ gemini. verūtn̄ tauri principiū ꝛ arietis finis ꝓpter nubes quas i pluuias iudicant. non minus quoq; virgo ꝛ libra modicas habent pluuias. capricornus autē plus habet frigoris ꝛ ſiccitatis q̄ꝫ pluuie: nec in ipſo fient imbres. ꝛ niſi luna de ipſo ſtellam in loco aquarū reſpiciat. Uenus ꝛ mercurius ſub lumine martiſq; aſpectu. Mars ipſi lune lumen ab eis reſecat ꝛ ꝓhibet niſi inquit cōuēt⁹ uel oppoſitio ſint in ipſo ſic nec pluuias affert. ¶ Am plius ꝛc̄. hoc in illo libro qui incipit. Cū malta ꝛē. ¶ Jtem ſub anni cō uerſione ꝛ quartarū eius ſcias aſcendēs ꝛ vtrū luna ſit in ſigno frigido uel calido uel humido uel ſicco ꝛc̄. planete applicantes rem coartantur maius gdē iudiciū pluuiaꝝ ſi dño circuli qui poſt lunarē collocat̄ ꝛ de ſcendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti appli cante ſi aūt ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit ꝛ rores. Ea dem q̄q; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū ſaturnū relinquit ſoli applicans nō aliud dabit iudiciū. Potior quoq; que dixi mus de oppoſitiōe ꝛ in ſignis que aquas ſignificāt facta applicatione: Cuiuſmodi ſūt aquari⁹ leo ꝛ ſcorpio in gradib⁹. ſ. eorūdē. Jtidē etiā in geminis ꝛ ſagictario cōuentu itaq; aut reſpectu forti deprehēſo ꝛ luna in domo ꝓpria ſaturno applicans aut in piſcib⁹ veneri aut in aquario cū venere ꝛ mercurio imbres vtiliſſimos ꝛ multiplices iducit. ¶ Jtem

ſub anni cõuerſione ⁊c̃.in hoc libello qui incipit Cũ multa ⁊c̃. ¶ Item in ingreſſu ſolis in ſcorpionẽ ſi fuerit venus orientalis:in ãni principio multos:in fine vo paucos denunciat imbres.occidentalis vo econtra. Soli etiã i eodẽ ſigno coniũcta:anni ⁊ menſis illi⁹ in quo cõueniũt prin cipia imbrib⁹ emanant. Qõ ſi de venere aliter accidat dum ſol arietis exordia ingredit.oriente cõſtituto ceteriſq; cardinib⁹ firmatis que oriẽ talis termini dominiũ vendicauerit ſtella: hec beneficia pluuiarũ p to- tum annũ adminiſtrat.Ueneris itaq; ⁊ mercurij ⁊ lune aut ptis alteri⁹ cum eadẽ applicatio uel cõuentus dum tres he ſtelle in ſignis mozent aquaticis.aut luna alteri applicat dũ nulli duarũ applicet imbres mul tiplicat. Mercuri⁹ etiã a marte corruptus aut ſub aduſtione conſiſtens ⁊ luna eidẽ applicans:primo paucas:medio multas nõ tñ ſine fulgure ⁊ tonitruis ⁊ aeris corruptiõe adducit pluuias. ¶ Rurſum eo anno plu uie rareſcũt quotiens luna cum marte fuerit:aut eidẽ venus applicet:⁊ aut forte ſit a duſta:luna iterũ cum ſole aut marte:aut ſi ſaturno mercu- rius applicet ⁊ luna eorũ alteri in anni principio pluuie redũdant:in ſi ne vo minuunt nubiũ denſitate facta ⁊ etiã aere corrupto.nam ioue in ſigno aquatico exiſtente dũ venus ⁊ luna eidẽ applicent:eo anno mul- tos: ſz martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui ⁊ ipſe toto anno imbriũ gaudet dñatu ⁊ cardine fortunatis applicans to tum annũ reddit pluuioſum. Ipſe nanq; a marte corruptus idẽ cum eo ſignũ obtinens dũ tñ luna marti applicet: nubib⁹ multis ⁊ paucis ma- nabit imbrib⁹. *Signũ iterũ in quo cõueniũt ſi eſt aereũ: ⁊ luna ſit eidez* applicata rores multiplicat ⁊ nebulas. *Qõ ſi idem mercurius imbrib⁹* fruat̃ dominio ⁊ ipſe corruptus : graues ⁊ multos eodẽ ãno nũciat im- bres.Sicq; corruptio ex ventis ⁊ nubib⁹ generat̃.Si autẽ hic fuerit iu- piter cuius corruptus ⁊ ſi pauce ſunt nulla tñ aeris erit corruptio. Ue- nus autẽ hanc dignitatez vendicans ⁊ marte infelice uel aduſto abſq; imbriũ ſtilla nebulas exauget ⁊ rores.Mars item eadez potius digni- tate paucas pluuias pauciores rores inducit.Saturnus itidez ⁊ ſi pau- cis humectet imbrib⁹ nebulas frequenter miſcebit:in ſigno tñ diſcurrẽs aquatico moduz pluuijs adhibebit. ⁊ adhuc p̃ſcripti dñi beniuolentia nubib⁹ accident nõ vlla quoq; induſtria venerẽ mercuriũ ⁊ lunã eorũq; p̃ſcriptos effectus neceſſe eſt.Alterna nãq; eorũ applicatio rores multi plicat aut detrahit luminari applicatione cũ fortunatis ⁊ infortunatis deprehenſa. Imbriũ quidã ꝓhibitio a marte ſole ⁊ ſaturno ꝓcedit.Sa- turnus tamen in aquaticis pluuias inducit. ¶ Item in ingreſſu ſolis. hoc Haomar.

¶ Sole itaq; primū libre ⁊ capricorni punctum ingrediente oriens fir met nō minus quoq; stellarū loca pscrutari necesse: quib⁹ diligenti obseruatiōe pquisitis si que fit veneris ⁊ mercurij ⁊ lune applicatio sz etiā martis locus ⁊ cui applicet mente puigili notandū est. nubiū eni obductio: ⁊ roris beneficiū: pluuiarūq; modus iuxta omnē stellarū applicationē: sicut de principio anni dictuz est: poterit deprehendi. Sole itaq; primū ⁊c̄. hoc haomar ⁊c̄. Capitulū vndecimū.

Item si saturn⁹ prefuerit significatori āni absq; respectu martis uel alteri⁹: erit supfluitas frigoris in hyeme i vniuersis regionib⁹ frigidis septētrionalib⁹. ⁊ regiōes vltra modū calide tēperabunt̄: ⁊ fortificabit̄ in frigiditate ⁊ sic citate cū fuerit ascendens in circulo sue augis. ¶ Mars cū prefuerit significatori āni tpabit̄ frig⁹ hyemis in regionibus septētrionalib⁹. ⁊ opabit̄ partē huiusmōi cū in hyeme iuent⁹ fuerit in finis septētrionalib⁹ ⁊ in estate in meridionalibus erit supfluus calor interimens aialia. ¶ Itē si saturn⁹ ⁊c̄. hoc in oria q̄rti tractat⁹ Albumazaris. ¶ Itē cū intrat sol libr̄ā. si venus sit sub luce solis ⁊ cū hoc sit occidentalis: pluuia erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē orientalis ⁊ visibilis erit pluuia econuerso. Si vo fuerit actualitas sua post illā horā p mensē ⁊ dimidiū: significat multā pluuiā in medio āni: ⁊ quanto erit plus vn⁹ sub radijs plus mutabit̄ aer ad pluuiā. ¶ Itē cū intrat sol libr̄ā ⁊c̄. hoc Alkindus. 8°. ca° hoc idem hyspalensis.

¶ Item sub ingressu solis in libraz venus ante solē min⁹. 30. gradibus discurrens ⁊ directa hyemis principia pluuijs humectat. Si vo nec ab inuicē distiterint circa finē ad ipsuz pmittit. Si vo maior q̄z. 30. graduū fuerit distantia hyemis principiū frigore sz paucis redundat imbribus donec interiectū spaciū ad minorē redeat quantitatē quotiēs autē suo cursu minor vno signo attendēda erit distātia ann⁹ ille multiplices habebit pluuias maiorē quoq; imbriū abundantiā solis ⁊ veneris in eodē signo generat pgressus. ¶ Itē sub ingressu solis ⁊c̄. hoc in libello Cū multa ⁊c̄.

¶ Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in libr̄ā vsq; ad. 20. scorpionis gradū nō min⁹ a luminari applicatione cū ceteris stellis potissimū dependet. Stella igit̄ cui luna applicat orietalis existens. finē anni uel mensis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāq; predictorū initia imbriū beneficio decorat. Hec tamē applicatio ꝑprie cum venere facta ⁊ mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nāq; orientalis ⁊ altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes p totum annum necnō maximas denotat pluuias. Imbrium nanq; multitudo

dum ♀enus ☿ mercurius ſcorpiũ capricornũ aquariuꝫ ☿ piſces ingredi feſtinãt ꝑcipue manat. Sꝫ etiã eorũ cũ luna de locis humidis nõ ſine reſpectu applicatio:cũ ita ſe habeant pluuias generales iutiles oſtendũt ☽una q̃q; alteri applicãte dũ alterã luna reſpiciat q̃diu reſpect⁹ inerit donec ab altera ſepeꝫ nõ aberit imbriũ multitudo, ☽una itidẽ cum ♄turno applicans molles ☿ ſuaues pluuias ſꝫ etiã quietas oſtẽdit ☿ nebulas obſcuras ☿ nigras. Si ♂o marti imbres ☿ tonitrua ☿ coruſcationes apportat plerũq; petras ☿ grandinẽ ☿ nubes croceas ☿ ruborẽ deſup ☿ candorẽ habentes. ☿ercuri⁹ gdẽ bui⁹mõi aſſumpto ducatu pluuias ventoꝝ rabiẽ eoꝝq; aſperrimos nũciat diſcurſus: nubes etiã incõtinuas ☿ diſperſas croceas quoq; ☿ fumi colorẽ habentes inducit. Sol autẽ ſi huiuſmodi ducatuꝫ aſſumat:guttas grandines ☿ nubes croceas portendit. ♀enus aũt eodẽ aſſumpto pluuias molles ☿ cõtinuos rores multos imbrib⁹ ſimiles ꝓfecto generat. ♃upiter ſerenũ ☿ ventos habet ꝓpitios. Nõ aliter q̃q; ceterarũ ſtellaꝝ adinuicẽ facta cõmunitas ſiue mixtio cõem ut ſupradictũ eſt exhibet efficatiã. Sꝫ illarũ etiaꝫ ducatos alternos:que nubiũ colores ☿ aeris variationes. His ꝑmit⁹ cõpenſatis ꝑ totũ annũ cũ difficultate remota ſpectare licebit. ¶ Itẽ ☽anni pluuioſi ☿c. hoc ♃aphar ☿c. ¶ Item notandũ ꝙ qñ ſol ad primũ gradũ ſcorpionis ꝓuenerit ſi mercuriũ ☿ venereꝫ orientales eſſe contigerit pluuias in principio anni futuras nulli ſit heſitatio:potius quidez ſi luna creſcens lumine in auſtrũ deſcendat venerẽ ☿ mercuriũ reſpiciens aut ſaltẽ dum ab altero ſepaꝝ alteri applicet ☿ vndiq; recepta:ſic eni ſub anni principio pluuias indubitanter adducit. Utriuſq; rurſũ occidentalitas ☿ lune cũ vtroq; uel ſaltẽ alteruter applicatio ☿ ipſa occidẽtalis videlicet ſub menſis principio ad ſeptimũ uel ad octauũ diem aſcendat ☿ poſt ſolẽ vadat ad occaſum:☿ ipſa etiã deſcendens curſu velox ☿ luce creſcens imbres ĩ fine ãni ꝑtendit futuros. Si ♀o lunã ☿ huiuſmodi ſtellas a dñis domorũ ſuarũ uel regnorũ recipi cõtingat ex multiplici imbriũ nec inutili redundantia fruct⁹ ☿ victualiũ ſeruaꝝ vbertas. Itẽ notandũ ꝙ qñ ſol ☿c. hoc in libello ☽ũ multa. ¶ Item cũ ſol intrauerit. 20. gradũ ſcorpionis apta aſcendens angulos ☿ planetas illa hora:poſtea aſpice iouẽ venerem ☿ mercuriũ:☿ ſi omnes tres inueneris occidẽtales aut retrogrados iudica ꝙ illo anno erũt multe pluuie ☿ humiditates. Et ſi oẽs inueneris orientales ☿ directos ☿ multi curſus ſignificat ꝙ illo anno erũt pauce pluuie ☿ humiditates. Poſtmodũ aſpice martẽ ☿ ſi eũ inueneris i aliquo angulorũ maxime in medio celi in aliquo ſignorum aereorũ ☿ habuerit aliquã cõmixtionẽ cũ mercurio ſignat tonitrua coruſcationes ☿

pluuias dãnabiles ꝛ fortes que ꝓueniũt ꝛna hora ꝛ postea recedunt ꝛ signa ꝛ locustas ꝛ damniũ in aere. Et si mars fuerit in aliquo signorũ terreox ꝛ i angulo terre ꝛ fortune fuerint appodiate ꝛ habuerit cõmixtionẽ cũ mercurio signat terremot⁹ ꝛ apparitionẽ igniũ in aere ꝛ res erpauescendas ꝛ damnũ in mineris ꝛ sulphuratis terris. Et si mars fuerit i angulo terre in signis igneis signat combustionẽ aeris in terra ꝛ damnãt omnes ꝓprietates terre ꝛ minere ꝛ damnant ꝛ comburunt messes. Et si fuerit mars in angulo terre iu signo aqueo i aquis diminutionẽ signat ꝛ damnum in eo toto qõ est in illis de aĩalibus ꝛ alijs rebus. Et si fortune habeant cõmixtionẽ cum eo minuũt ꝛ phibent damnũ tonitruorũ ꝛ corruscationũ in illo anno. Et si fortune cum illo nullã cõmixtionez habuerint tonitrua ꝛ corruscationes faciũt damna in illo anno ꝛ erunt radij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturn⁹ ꝛ fuerit in medio celi i aliquo signorũ aereorũ ꝛ habuerit cõmixtionẽ cuz mercurio ꝛ fortune ab eo remote fuerint signat damnũ in aere ꝛ multas pluuias damnabiles ꝛ durabiles que nõ abscindent. Et si saturnus fuerit in angulo sicut ꝑdixim⁹ ꝛ in signis terreis ꝛ habuerit cõmixtionẽ cum mercurio ꝛ fortune ab eo remote fuerint: accident terremotus ꝛ apparebũt sup terram aque magne ꝛ similia. Et si fuerit in signis aqueis ꝛ in angulo terre ꝛ fortune ab eo remote fuerint ꝛ habuerit commixtionem cum mercurio minuent aque in puteis ꝛ damnantur omnes res que morant in aqua de aĩalibus ꝛ alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis ꝛ sub terra ꝛ fortune remote ab eo fuerint ꝛ habuerint cõmixtionẽ cũ mercurio sigt damnũ in terra ꝛ ꝓprietatib⁹ suis ꝛ minerijs: ꝛ si mercuri⁹ nõ habuerit cõmixtionẽ cum eo erunt signationes ꝑdicte tñ minores ꝛ leuiores. Et habuerit cõmixtionẽ fortunarũ misce signatores anni ꝛ temperabit: ꝛ etiã minuent damna que diximus. ¶ Itẽ cum sol intrauerit 20. ꝛc̃. hoc haly in. 20°. ca°. octaueptis. Idem in libro haomaris: ꝛ in. 6°. ꝛ. 8°. capitulis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. graduz scorpionis rectifica ascendẽs ꝛ locũ lune ꝛ alias stellas ꝛ vide vtrũ luna veneri applicet uel mercurio: veneris igit mercurij orientales pluuias sub anni principio: occidentales sub fine largit. luna eni lumine addens ꝛ cõpoto imbres multiplicat vtrũq; vo decrescens remissius. ¶ Itez in introitu solis ꝛc̃. hoc in libello Cum multa ꝛc̃. ¶ Item cũ sol ingredit signum tropicum venus in signo aquatico ꝛ luna extra aquaticũ discurrente respecta eo tempore modicas infinuat imbres sz de aquatico respiciens eoz portendit redũdantiã. Item cũ sol ingredit ꝛc̃. hoc haomar ꝛc̃.

¶ Sole itidem in. 18. graduz scorpionis oberrante venus in aquaticis

vſq; ad ſubmerſionem pluuias generat. In ſigno humido mediocres. In ſicco modicas. ¶ Sole itidē ⁊c̄. hoc haomar ⁊c̄.

Capitulū. 12. De parte pluuiarū.

AMplius ſub anni ꝺuerſione ⁊ quartarū ei⁹ in ꝓncipio menſiū luminariū que cōiunctio ꝺuoꝝ luminariū. Pars pluuie ſemꝑ eſt notandū: ea nāq; ꝺe ꝺie a luna aꝺvenerē In nocte vo ecōuerſo ẽ aſſūpta ⁊ a ſole ſumpto exoꝛdio ſub numeri terminatiōe ꝑfectio occurrit In loco igit̄ pluuiarū repta annuꝫ iuꝺicat pluuioſum. luna quoq; ꝺū aꝺ martē ꝓueniet imbꝛes ꝺie ipſa aꝺꝺiderūt ⁊ ꝺevenere nō aliuꝺ erit iuꝺiciū. ¶ Amplius ſub anni cōuerſione ⁊c̄. hoc in libello Cū multa ⁊c̄. ¶ Uenus itiꝺem retrograꝺa ⁊ ſol in ariete uel tauro ver iuꝺicat pluuioſum. Item ipſa retrograꝺa exiſtens ꝺum ſol in capꝛicoꝛno uel aquario cōmoꝛat̄ hyems illa erit paucoꝛū imbꝛiū. Hec oia ſub anni cōuerſione notanꝺa occurrunt. Item ipſa retrograꝺa ꝺū ſol capꝛicoꝛnū aquariuꝫ uel piſces ꝓambulat oꝛiētalis in vere facta imbꝛes moꝺicos iuꝺicat ſꝫ hyemis ꝓncipiū multis humectat pluuijs. Naꝫ ſi in hyeme oꝛientalis exiſtat eius initia roꝛes. Ultima vo pluriḇ redūꝺabit imbꝛiḇ niſi ſtella quelibet ſoli ꝺiſcurrat affinioꝛ. ¶ Uenus itiꝺē ⁊c̄. hoc in libello Cuꝫ multa ⁊c̄. ¶ Item eſtiuo tꝑe cum ſol ingreꝺit̄ terminū martis fit i eſtate eſtus. in hyeme vo paucitas pluuiarū. ¶ Item eſtiuo tꝑe. hoc in floꝛibus hermetis. ¶ *Item ſole in ſignis ſeptētrionaliḇ cū marte facit calorem maximū. In hyeme cū ſaturno frigus magnū.* ¶ Itē *ſole in ſignis* ⁊c̄. hoc in libꝛo Almanſoꝛis. ¶ Aꝺ euiꝺentiā ꝑꝺictoꝝ ſciendū eſt quare habeat̄ ꝺn̄s anni q̄re hoc. ¶ Itē queriṫ vtrū poſſumꝰ habere aſcenꝺens ⁊ alios angulos hoꝛa introitꝰ ſolis in arietē uel aliuꝺ ſignū. q̄re hoc. ¶ Itē ꝺubitat̄ vtrū annꝰ ille incipiat ab introitu ſolis in libꝛā q̄n̄ fit obſeruatio introitus ſolis in eoꝺē ſigno. Et ꝺicit̄ q; in ꝓncipio anni erūt multe uel pauce pluuie. ¶ Item ꝺubitat̄ vtrū ꝓimus gꝛaꝺus ſcoꝛpionis ⁊ vigeſimus gꝛaꝺus eiuſꝺeꝫ magis ꝺebeant quoq; obſeruari q̄ alij gꝛaꝺus zoꝺiaci. ¶ Item quanꝺo ſaturnus fuerit in ꝺirecto arietis aut in eius triplicitate in ꝓncipijs reuolutionū ⁊ ipſe fuerit almutez. ꝺirecti curſus in angulo ſignat multas pluuias ⁊ paucum frigus. ſeꝺ cū fuerit non in angulis ⁊ aſpexerit aſcenꝺens ⁊ receperit ꝺiſpoſitionem lune ⁊ martē ſignat vehementiā frigoꝛis beſtias perimentis. Similiter autē cū fuerit caꝺens ab angulis nec aſpexerit aſcenꝺens ⁊ fuerit ꝺirectus. Si vo fuerit in geminis uel eius triplicitate ⁊ fuerit ꝺn̄s anni in angulo ꝺirectus ſignat foꝛtitudinē flatuū ventoꝛū ſeptētrionis ⁊ vehementiam

frigoris ⁊ pāucitatē pluuiarū. Et si fuerit retrogradus signat terremot⁹ specialiter si sit in angulo quarto. ꝙ si nō fuerit dñs anni ⁊ fuerit in angulo q̄rto respiciens dispositionē dñi ascendentis multi hoies morient causa illorū terremotuū. Et si nō fuerit in angulo ⁊ ascendēs ⁊ directus signat multiplices flatus euri ⁊ zephiri ⁊ magnā frigiditatē hyemis cuz terremotib⁹. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates aduenientes hominib⁹ ex ventis ⁊ humiditate etiā motuū terre. Et si fuerit directus nō aspiciens ascendēs signat flatū ventorū ⁊ leuitatē eoꝝ ⁊ vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatuz ventorū incessanter ⁊ fortitudinē eorū. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dñs anni nō aspexerit ascendens. ⁊ si directus signat destructionē vegetaliū causa valitudinis ventorū. ¶ Si ♄ saturn⁹ fuerit in cancro ⁊ eius triplicitate dñs anni in angulo directus ⁊ mars cadens ab eo fi ̄gt vehementiā frigoris. Et si nō fuerit in angulo ⁊ aspexerit ascendēs ⁊ directus signat multas pluuias ⁊ frigus. Et si fuerit retrogradus ⁊ aspexerit se cum marte ⁊ fuerit fortune ab eo cadentes augmentabūt frigus ⁊ aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

Capitulū. 13. De ascendente signo in reuolutiōe anni qd significet.

Item cū fuerit ascendens alicuius temporū reuolubiliū aries aut peruenerit ad eū anni. ab aliquo predictorū locorū signat ꝙ in ciuitatibus in quib⁹ fuerit almutez habūt venti orientales ⁊ occidētales cū temperantia aeris q̄rte septentrionalis aut q̄rte extreme ⁊ erit autumn⁹ ei filis in qualitate ⁊ vehementia frigoris in hyeme ⁊ augmentuz fluminū ⁊ siccitatis ⁊ fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendēs ⁊c̄. sicut dicit de ariete signat ibi flatū venti orientalis ⁊ occidentalis cū vehementia frigoris quarte vernalis: ⁊ bonā complexionē aeris quarte autūnalis ⁊ erit quarta hyemalis calida: ⁊ multiplicabūtur niues in medietate eius ⁊ corroborabitur frigus ⁊ fient pluuie pauce ⁊ tonitrua ⁊ fulgura cum casu grandinis cum extensionib⁹ mariū ⁊c̄.

¶ Cum gemini fuerit ascendens ⁊c̄. erunt venti calidi in quarta estiuali ⁊ retentio aeris in quarta autumnali ⁊ multe pluuie in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscatiōes ⁊ ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens ⁊c̄. cū frigiditate quarte vernalis ⁊ mediocritate aeris quarte estiualis: ⁊ multos flatus ventorū occidentaliū ⁊ aqueductus frigus vehemens in quarta hyemali ⁊ temperamentū quarte autumnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendēs ⁊c̄. signat aerem tenebrosū horā post horā

aim mediocritate aeris ąrte vernalis ꝛ declinabit ad frigus ꝛ erit vehe
mens calor in quarta estiuali ꝛ flabit ventus occidentalis in fine ei⁹ in
cessanter ꝛ erunt multe pluuie ꝛ forte frigus in quarta hyemali ꝛ pauci
venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens ꝛc̄. signat ꝙ erit aer te
nebrosus in hora post horam in quarta vernali plurium pluuiarū ꝛ in
cessant flatus ventorū septentrionaliū ꝛ vehementiū ꝛ ꝑsperabitur aer
quarte estiualis ꝛ erit quarta autūnalis mediocris ꝛ principiuꝫ quarte
hyemalis mediocre ꝛ finis eius vehementis frigoris. Et flabunt cū eo
venti septentrionales cū augmento pluuiarū. ¶ Cum fuerit libra ascen
dens ꝛc̄. obscurabit aer in hora post horā ꝛ multiplicabit flatus vento
rū calidorū vehemēt in quarta estiuali ꝛ equalitas erit quarte autum
nalis ꝛ mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendēs
ꝛc̄. accident in aere tenebre in hora post horā ꝛ pluuie multiplicabunt
ꝛ erit quarta vernalis calida ꝛ nubes erunt pauce in ea ꝛ pluuie ꝛ ven
tus ꝛ frigus ꝛ erunt estas ꝛ autumnus: ꝛ corroborabit frigus hyemis ꝛ
flabūt in medietate eius venti occidentales ꝛ multiplicabunt in ea plu
uie ꝛ aqueductus magni. ¶ Cū fuerit sagictarius ascendens ꝛc̄. erit ąr
ta vernalis multarū pluuiarū ꝛ ventorū. autūnalis quarta temperato
rū ventorū ꝛ quarta hyemalis frigida ꝛ humida. ¶ Cum fuerit capri
cornus ascendens ꝛc̄. signat multas pluuias in quarta vernali ꝛ bonus
aer in quarta estiuali ꝛ flatus ventorū orientaliuꝫ in eo cum caliditate
quarte autumnalis. ꝛ mediocris frigore in principio quarte hyemalis
ꝛ constrictionē eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens ꝛc̄.
erit quarta vernalis mediocris in frigore cū vehementia caloris in ąr
ta estiuali cum declinatione autūnalis ad calorez ꝛ multiplicabunt in
eo corruscatiões ꝛ tonitrua ꝛ pluuie ꝛ corroborabit frig⁹ in quarta hye
mali cum multis niuibus ꝛ flatu ventorū orientaliū. ¶ Cum fuerit pi
scis ascendens ꝛc̄. signat multū flatum ventorū occidentaliū ꝛ esse plu
uiarū in quarta vernali ꝛ vehementia caloris in quarta estiuali ꝛ me
diocritatē aeris in quarta autūnali. ꝛ frigoris multitudinem in quarta
hyemali. ¶ Scias etiam ꝙ si pars ascendētis fuerit in prima tertia ali
cuius signi etiā in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod
almutez aut venerit ꝑfectio ad ipsam aut in ꝓte septentrionali uel meri
dionali iudicandū est ꝟm naturaꝫ partiū signorū in prima tabula hui⁹
inuentorū. vnde in hoc sequit Albumazar Ptolemeū. ¶ Itē cum fue
rit ascendens ꝛc̄. hoc Albumazar in quarto tractatu de cōiunctionibus
magnis ꝛ hoc in. 12. differentijs extrabit.

Capitulū decimūquintū.

CUm fuerit saturno significatio albibuze ⁊ sup ascendens alicui⁹ inceptionis aut fuerit ei alcetabacia aut algebucia apud equidistantiā cursuū septeutrionis ⁊ meridiei. Si significatio ei⁹ sit sup elementū aereū signat vehemētiam frigoris ⁊ magnam congelationē: nubila vapores flumina tonitrua cozuscatiões ⁊ decursum niuiū. Jn aq̄tico vehemen tiā frigoris in mari ⁊ augmentū supfluū eius. Significatio vo eius ſm modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā eius signat impetuositatē ventozū ⁊ fortasse accidet vehemens calor. qp septētrionalis fuerit signat vehementiā calozis: meridionalis vo vehementiā frigoris ⁊ niuiū ⁊ multū rozis. Sed retrogradus tonitrua ⁊ coruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessant ⁊ vehemens frigus septētrionalis temperamentuz aeris: meridionalis pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vehementiā frigoris in oriente ⁊ occidente pluuias ⁊ ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo geminozū signat incessantē flatū ventozū validozū ⁊ multitudinē pluuiarū: septētrionalis terremot⁹ ⁊ ventos validos: meridionalis siccitatē ⁊ vehementiā calozis: occidentalis paucitatē pluuiaꝝ cū grossitie aer̄ sub radijs vehementiā frigoris valitudinē ventozū ⁊ multas aquas. ¶ Si fuerit equidistās signo cancri signat multū gelu pluuias ⁊ aquas meridionalis multas pluuias ⁊ orietalis siliter. ¶ Si fuerit equidistās signo leonis signat incessantē flatū ventoꝝ calidozū paucitatē pluuiaꝝ ⁊ vehementē siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. orietalis augmentū fluminū ⁊ inundationē eoꝝ. retrogradus corruptionez aeris ⁊ ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiaꝝ ⁊ validitatē ventozū. ¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū mediocritate pluuiaꝝ. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris ⁊ similit meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruozū coruscationū ⁊ augmentū aquarū in fluminib⁹. occidentalis paucitatē pluuiarū: ⁊ sub radijs paucitatē pluuiarū ⁊ si cū eo ibidē fuerit mercuri⁹ turbabit aer cū valitudine. ¶ Cū fuerit equidistās signo libre signat incessantem flatū ventozū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eoꝝ. occidētalis siccitatē cuz vehementia frigoris: qp si aspexerit iupiter aut luna potissime cū fuerit sub radijs turbabit aer ꝓpter ventos ⁊ calorē. ¶ Et si fuerit equidistans signo scorpionis signat fortitudinez hyemis cū multitudine niuiū. septētrionalis vehementiā calozis. meridionalis multitudinē pluuiarū. retrograd⁹ siccitatē aeris ⁊ si fuerit iupiter ⁊ luna ꝓpinqui signat

corusçationes vehementiã frigoris ꝛ casũ niuiũ ꝛ inundantiã aquarũ. ¶ Si fuerit egdistans signo sagictarij bonã cõplexionẽ aeris. septẽtrionalis flatũ ventoꝝ. orientalis bonã aeris cõplexionẽ. ¶ Si fuerit equidistans signo capricorni multitudinẽ pluuiaꝝ ꝛ terremotũ. septẽtrionalis multã ninẽ multitudinẽ gelu ꝛ humiditatũ. meridionalis hoc idem. sub radijs grandines ꝛ vehementiã pluuiaꝝ ꝛ valitudinẽ ventoꝝ. ¶ Si fuerit egdistans signo aquarij: multitudinẽ pluuiaꝝ: incessantẽ motum ventoꝝ ꝛ terremotũ in illo ãno. meridionalis supfluitatẽ pluuiaꝝ ꝛ nubiũ multitudinẽ. retrogradꝰ niues cum vehemẽtia frigoris. ¶ Si fuerit egdistans signo piscium vehementiã caloris ꝛ frigoris in suis tpibꝰ. meridionalis multitudinẽ pluuiaꝝ ꝛ augmentũ fluminũ. septẽtrionalis multitudinẽ flatꝰ ventoꝝ. orientalis paucitatẽ pluuiarũ. sub radijs multitudinẽ aquarũ cũ frigore: ꝙ si mars cũ eo fuerit signat paucitatẽ pluuiaꝝ Cũ fuerit saturno significatio albibuze ꝛc̃. hoc Albumazar in cõiũctionibus magnis in prima differentia tractatꝰ qnti ꝛc̃.

Sequit̃ tertia pars de iudicijs vlibus mutationũ aeris ꝑ cõiunctiones ꝛ oppositiones luminariũ.

Capitulũ primũ.

Cum fuerit Venus in oriente uel i alio car/

dine hora cõiũctionis uel oppositiõis luminariũ certũ ꝛ forte iudicium pluuiarũ our eriã sub cõuentu ꝛ oppositiõe solem respiciẽs imbrẽ affirmat multiplicẽ. Venus etiã sub radijs sub q̃libet respectu ptis cardinis multiplicat imbres grauissimos. nã quotiẽs luna eidẽ applicat pluuiã facit. ꝛ de sole in hunc modũ firmissimũ in aliq̃ ptis cardinũ ipsiꝰ siue eiꝰ oriẽte. domꝰ quoq; orientis in signo aquatico sub ducis cõuentu uel eidem applicãs. ¶ Cũ fuerit venus ꝛc̃. hoc in libello q incipit Cũ multa ꝛc̃.

Capitulũ secundũ.

Item rectifica angulos hora cõiunctiõis uel oppositiõis luminariũ imediate ꝑcedentis introitũ solis in eqnoctialibꝰ ꝛ solstitialibꝰ in illo climate in q̃ scire volueris: sicut fit in natiuitatibꝰ. postea accipe gubernatores locorũ cũ iunctionũ uel oppositionũ ꝛ angulorꝝ q hec loca sequũt. sicut fit in facto eclypsim. postea cõsidera rem generalez

ꝓuenientē a ꝓꝑietatib⁹ q̄rtax ⁊ á nā planetarū gubernantiū inſpiciēdo cui⁹ q̄litatis ſint. ſciēs augmentū ⁊ diminutionē accidentiū ꝓꝓiox illi⁹ q̄rti. Eodē mō fac in factis menſiū: inſpiciēdo tñ ad diūctiōes ſequētes ſi q̄rtū illud fuerit diūctionale uł ad oppoſitionē ſi fuerit oppoſitionale conſiderādo ad angulos ⁊ planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus. ¶ Poſtea conſidera appitionē ſtellax fixax q̄ ſūt circa appitionē planetarū aut elongationē vni⁹. ſ. ab alio ⁊ i ſuis ꝓꝑietatib⁹ ⁊ in ſtatib⁹: ⁊ q̄s ventos mouēt bee ſtelle ⁊ ꝓtes signox in qb⁹ ſūt. ſił'it' conſidera a ꝓte cuius venti ē latitudo lune ſi remouebit' a zodiaco signox: ita q̄ ꝑ hec oia poſſumus ſcire q̄s magis vincit de ſuis ventis i ſtatu mēſis. ¶ Ītē rectifica angulos ⁊c̄. hec ſnia Ptolemei in. 9°. ca°. 2¹ tractat⁹ 2ᶜ ꝓtis 2¹ q̄driptiti. Dicit haly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciam⁹ ꝑmo accidens vł̄e. ſ. qd erit qñ erit. poſtea inſpiciem⁹ in q̄ q̄rta ān̄i: accipiēdo opationē ab accidēte ad res ꝓꝑias illi⁹ q̄rti. Poſtea rectificabim⁹ aſcendēs ⁊ angulos alios diūctiōis p̄cedētis introitū ſolis i illud q̄rtū: ⁊ planetas ⁊ ſtellas fixas. ⁊ audiam⁹ qd totū ſignificet. vbi grā Ponam⁹ q̄ accidēs ꝓueniēs ex ſignificatiōe vł̄i ⁊ gubernatore illi⁹ ſit frigiditas: ſi hoc fuerit i eſtate dicem⁹ eſtas erit modici caloris: ⁊ ſic de alijs ſuo mō. ita q̄ fortitudinē accidēti ⁊ q̄le erit ſciem⁹ a nā gubernatoris ſm q̄ cōcordauerit cū q̄litate illi⁹ q̄rti. Eodē mō faciem⁹ in cōiūctionib⁹ q̄ caput menſiū dicunt: ſi q̄rtū fuerit cōiūctionale: uel oppoſitiōib⁹ ſi q̄rtū fuerit oppoſitionale: ita q̄ Ptolemeus certū principiū tpis tenet: eſt a diūctiōe uel oppoſitiōe q̄ eſt circa illū introitū ſolis in aliq̄ q̄rtox p̄dictorū: qr virt⁹ gubernatoris remanet ⁊ durat donec durauerit illud q̄rtū. ¶ Ambo loca ⁊c̄. ſz haly vna ē diūctio uel oppoſitio q̄ eſt circa punctū illi⁹ q̄rti qō ſol ingredit'. Alia eſt cōiunctio uel oppoſitio principij menſis in illo q̄rto. Inſpiciem⁹ enī quis dñabit' in vna ⁊ in alia: ⁊ vincit ille qui fuerit magis cōcors cū ꝓꝑietatibus illius quarti: ⁊ cum vł̄i ſm q̄ videbimus de poſſe illius virtutis uel debilitatē. Nō enī ſemp accidens vł̄e illius quarti vincit accidēs ꝓticulare ſz multotiēs eſt ecōtra. Sole aūt exiſtēte i leone accidit qñq̄ maior frigiditas q̄z eo exiſtēte i aquario. Conſidera igit' gubernatores: nā ſi fuerint plures aut fortiores quantū ad ſuos ſtat⁹ eſſentiales: ⁊ accidētales fuerint conſimiles: tūc nō dubites iudicare. ¶ Ītē ſm haly qñ ſciem⁹ de eo q dñat' in q̄rto ⁊ de eo q dñat' in menſe qd accidit in illo q̄rto ⁊ in illo mēſe illi⁹ q̄rti a ꝓtib⁹ ambab⁹. Et de appitione ſtellax fixarū q̄ apparebūt circa: ⁊ de applicatiōe planetax vni⁹ cū alio: ⁊ elōgatiōe ſua ⁊ declinatiōe ſuax latitudinū: ⁊ ꝓꝑietate signox ⁊ ſuarū partiū in quibus ſunt: ⁊ hec omnia cōmiſcebunt' ad inuicē ⁊ ſciemus virtutē vincentē: iudicabimus

ſm hoc rem contingentē quolibet tpe ⁊ quolibet quarto ⁊ q̄libet menſe
hic eni eſt loc⁹ q bene itelligenti ipſū ſufficit in hac arte. ¶ Immediate
p̄cedentis ⁊c̄. Hec eſt opinio Ptolemei ⁊ pluriū aliorū. Uidi tñ quedā
iudicia facta de ſtatu anni ⁊ menſiū a quibuſdā ſolēnib⁹ doctoribꝰ qui
iudicabant ſtatū quarti p cōiunctionē uel oppoſitionē poſt introitū ſo-
lis in illud quartū videlicet qñ cōiunctio uel oppoſitio in die introitus
uel in ſequēti die ⁊ hoc nō videt mibi incōueniens ad pñs. ¶ In natiui
tatibus ⁊c̄. Ptolemeus vult q rectificent anguli ⁊ cetere dom⁹ preciſe ⁊
ſituent in domib⁹ debitis planete ut videant eorum ſtatus eſſeutiales ⁊
accidentales ſicut fit in iudicijs natiuitatū ⁊c̄. Et angulo⁹ qui hec loca
ſequunt ⁊c̄. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q ſufficit aſpicē ad hūc
angulū qui ſequit locū cōiunctiōis uel oppoſitiōis in ſitu ⁊ iſto mō nō
facerem⁹ ſicut fit in eclypſib⁹ qr prius accipiebam⁹ illum qui eſt añ ecly
pſim ⁊ poſtea illū qui ſequit ut patuit in tractatu p̄cedenti. Alio modo
exponit q illi anguli ſequunt loca cōiunctionū uel oppoſitionū in vir-
tute ⁊ iſto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares eſſe
fortiorem. ⁊ ſic poſſemus etiam accipere angulū qui eſt ante cōiunctio
nem uel oppoſitionē in ſitu ſicut fit i eclypſibus. ⁊ credo q hec eſt inten-
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis poſſet dicere q bene itellexerit Pto-
lemeus de angulo qui ſequitur in virtute ſed mirabile eſſet q occidens
pferret q̄ñq̄ medio celi ⁊ medium celi aſcendenti. nec etiā eſt ſimile qr
in eclypſibus iudicat de bis que apparent ſup terraz. Sed cōiunctiōes
⁊ oppoſitiones de quibus trabit hec doctrina q̄ñq̄ ſunt ſub terra: q̄ñq̄
vo ſupra terram: ideo rationabiliter aſcendens qr eſſe fortius in virtute
q̄z alij anguli eſſet ſemp ille angulus qui ſequit i virtute locū cōiunctio-
nis uel oppoſitiōis ⁊ huic ſententie videt adherere in expoſitiōe ſecūde
ppoſitiōis ſecūdi capli ut videbit infra. ¶ Ad cōiunctionē ſequentē ⁊c̄.
Dic patet q virtus vni⁹ cōiunctionis poteſt durare ad aliam cōiunctio
nem ſi iudicia menſiū fiant p cōiunctionē ⁊ virtus oppoſitionis ſi fiant
p oppoſitionē. Apparitionē ⁊c̄. Hoc intellige qñ incipiunt occultari ſub
radijs uel qñ incipiunt exire de ſubradijs ⁊ melius apparebit inferius
Elongationē ⁊c̄. ſm aliquē aſpectum ⁊ hoc eſt valde neceſſariū. ¶ Et de
pprietatib⁹ ⁊c̄. Hoc vtrū ſint calidi uel frigidi ⁊c̄. orientalis uel occiden
talis directus uel retrograd⁹ ⁊ ſic de alijs. Quos ventos mouēt bee ſtel
le ⁊ partes ſignorū. hoc habet p introductoriū p̄cedens zodiaco ⁊c̄. hic
accipit zodiacum p eclyptica. Hec autē omnia magis patebūt inferius
dño concedente.

Capitulū tertiū Quō anni reuolutio ostendit auram.

Tē scias ascendēs ɔiūctionis uel oppositiōis t locū eiusdem q fuerit ī introitu solis in arietē t loca aliorū planetarū. Unde si saturnū iueneris in aliq̄ angulox ab ascendente aut in aliq̄ angulox a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitatū suarū t maxime in angulo mediȷ celi signat diuersitatē in aere t dānū t tenebras in tpe calorīs minuit calorē: t in tpe frigorīs facit magnū frigus t si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia t equalia sicut esse debēt. tñ qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor t debilior erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno t maxime in medio celi augebit calor ī medio caloris t minuet frigus in tpe frigorīs t ver t autumn⁹ declinabunt ad calorē. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter t venus aut luna fuerint aptāt t temperāt aerē t faciunt nasci t crescere illud qđ seminat t plantat. Et aspice similiter mercuriū qr si eū inueneris in medio celi ab ascendēte cōiunctionis t fuerit in aliquo signorū aereox t aliq̄ fortuna fuerit in aliquo angulorū mercurij signat diuersitatē in aere t ventos multos t dānabiles t hoc modo iudicabis qñ inueneris aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qr ī hoc tantū valet quantū cū fortuna fuerit in signo coniunctionis. Unde qñcūq; inueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut ī succedentib⁹ pone eū p signatore. postea inspice cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno t marte t si iueneris eū mixtū ꝺ q̄rto cū marte uel cōiunctione uel oppositiōe t mars fuerit in aliq̄ signorū igneox crescit calor in tpe caloris t minuet frigus in tpe frigorīs. Et si aspectus fuerit de 3° uel sextili t mars in signis igneis signat id qđ dixim⁹ sz nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtionē cū saturno de q̄rto uel cōiūctiōe uel oppositione t saturn⁹ fuerit in signis frigidis t siccis aut frigidis t humidis crescit frigus tpe frigorīs. t minuit calor tpe caloris. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili t saturn⁹ in signis ante dictis signat id qđ diximus sz nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis t humidis sz fuerit ī signis calidis t humidis que sūt gemini t ei⁹ triplicitas t habuerit cōmixtionē cū signatore ꝺ q̄rto uel cōiūctiōe uel oppositiōe signat q̄ aer erit temperat⁹ de bona complexiōe t si hec mixtio fuerit de trino uel sextili eo existēte in signis suprādictis est maior t maioris tēperiei t cōplexionis melioris. Siliter si mars habuerit cōmixtionē cum signatore t fuerit in signis siccis t frigidis aut frigidis t humidis t cōmixtio fuerit de

q̄rto cōiunctione uel oppositiōe tēperat aerē ⁊ facit illū bone cōplexionis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis tēperantia erit maior ⁊ crescent oēs res q̄ nascunt̄ ⁊ generant̄. ¶ Et adiuua te in hoc a pte aeris ventorū pticipē cū signatore. Et si saturnū aut martē inueneris cum luna uel eius dño: iudicabis ab eis sicut ante dixi mus p̄ existentiā eor̄ in angulis ⁊ aspectib⁹ signatoris. Hanc enī partez accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos met gradus ⁊ minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendentis ⁊ pijciendo ab ascendēte: ⁊ ubi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitu in q̄rtis que sūt aries cancer libra capricorn⁹. Siliter fac in introitibus solis in quolibet. 1 2. signor̄ principio. ¶ Itē scias ⁊c. hoc dicit haly abenragel 26°. ca° octaui libri. Idē haomar ⁊ Alkindus. 8°. ca°. q̄uis p alia verba. Sciendū est q̄ esse in septima domo ascendētis ⁊c. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.

Item aspice prius q̄z sol intrat principiū arietis cōiūctionem luminariū uel oppositionē eorū que fuerit ante: ⁊ si fuerit signū ascendēs de signis pluuie signat hoc sup pluuiā q̄ descēdet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: ⁊ eo magis si locus oppositiōis uel diūctionis fuerit i uno angulor̄ ascendētis in illo tpe fm latitudinē regionis ad quā luminaria equaueris: q̄ si locus oppositiōis uel cōiūctiōis fuerit i una domorū cadentiū: iudica q̄ nō descendet pluuia in toto illo mense: nec in maiori pte illi⁹ anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis ⁊ dñs ipsius signi aspiciat lunā hec significatio completa sup descensiōnē pluuie. Et si fuerit almutez in ascendente tunc erit magis. Si uo fuerit almutez cū luminarib⁹ tunc erit pluuia usq̄z ad abundantiā. ¶ Qđ si scire volueris diem in quo descendet pluuia tūc debes considerare diē in quo luna pueniet ad gradū ascendentis: tunc enī descendet pluuia. Et ego Abrahām dico q̄ verū est si fuerit signū ascendens unus angulorum signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocūq̄z aspectu. nam si nō esset nō consisterent q̄ nubes ⁊ nō descenderet pluuia ⁊c. ¶ Itē aspice prius q̄z sol ⁊c. hoc in libello abrahe in. 2°. ca°. qui incipit Sciendū ⁊c. q̄d intelligat p signum terre fm Johannē de saxonia intellexit signū quod fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici q̄ signum alicuius terre dicit illud cū quo maiorē habuerit concordantiā. ⁊ hoc habebat prius a Ptolemeo ⁊ ab alijs in fine primi hui⁹. Item sciendū q̄ inter signa aquatica iste enumerat aquariū ⁊ leonē ⁊c. sed hoc est prius dictum.

Capitulum quintū.

ITem inquire locū ⁊ horā cōiunctionis uel oppositiōis p̄cedentis introitū solis in arietem ⁊ librā: p̄ter hoc cōperiūt indi horam inroitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem ab illo tp̄e aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel oppositionis: ⁊ in qua mansione sint singuli planete semp̄ cōputando. 13. gradus ⁊ tertiā uni⁹p vnaquaq; mansiōe a capite arietis inchoādo. Inquires tertio ad quē planetā luna aspectū habeat recedēs a minuto grad⁹ in quo fuerit oppositio uel ciūctio. q̄ si aspexerit saturnū ⁊ uter q; fuerit in māsione humida ⁊ si nō sit ipedit⁹ saturn⁹ ab aspectu iouis. erūt nubes nigre ⁊ pluuia lenta ⁊ durabilis. Et planete iferiores aspexerint saturnū. s. venus ⁊ mercuri⁹ erit pluuia maior ⁊ durabilior: ⁊ hec est cōsideratio ad cōperiendū pluuias āni. Siliter cōsiderabis ciūctiōes oppositiones ⁊ q̄drata in singulis mensib⁹ ad cōperiendū pluuias mēsiū ⁊ ad iueniendū diē in q̄ pluuie incipiāt: ingre distantiā in q̄ fuit ciunctio uel oppositio uel q̄drata ad grad⁹ planete pluuialis. ⁊ si luna fuerit i signo mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: ⁊ in firmo cuilibet gradui diē: ⁊ si in cōi in prima medietate singulis gradib⁹ dies singulos ⁊ i alia cuilibet gradui horā vnā: ⁊ vbi terminabit distributio: in die eodē ⁊ hora erit pluuiarū initiū. ¶ *Subtilissimi igit̄ indorū cōsiderāt tarditatē ⁊ velocitatē pluuie fm velocitatem ⁊ tarditatē cursus lune ⁊ fm augmētum luminis sui ⁊ noticie: dicentes augmentū ⁊ velocitatē pluuie seq.* Si planete cui vim dat sil̄is sit lune i accidentib⁹ p̄dictis interiacentib⁹ lunā ⁊ planetaz: totidē horas supputabis in velocitate ⁊ tarditate ⁊ in minutione totidē dies ut veniat pluuia. q̄ si cū p̄dictis mars aspexerit saturnū maior fit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel oppositionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca ⁊ luna ei vim dat ⁊ neuter inferiorum ipsum aspiciat ertt nubila absq; pluuia. Et si luna dat vim Ioui vtroq; existente in humido ⁊ alter inferiorum iouem aspiciat ros erit ⁊ nebula tantū: q̄ si ioue ⁊ luna sic positis ⁊ neuter inferiorum iouem aspiciat ⁊ ipse applicat ad saturnū uel aspiciat saturnū pluuia erit. Et si luna ⁊ mars fuerint in mansionib⁹ humidis ⁊ alteruter inferior martē aspiciat: sequēt̄ nubila terribilia tonitrua lampadū ⁊ grādo: ⁊ nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Dic notandū q̄ mars quolibet aspectu significatione imbrium exauget lunā ⁊ stellā cū applicuerit: in generādis pluuijs oino iuuat. Illa enī eidēp̄pe ⁊ principalit̄ applicāte inest dilatio. Si vo alit̄ accidat nec signat ⁊ idē

corrũpit nubes quas Martialis pducit natura croceũ desup ruborem
nõ sine candore habentes. ¶ Jtẽ lunaris cũ sole applicatio in mansiõe
humida ꝛ sol in locis vbi nec dignitatem nec potestatẽ habeat saturno
ꝛ marti applicet pluuiarũ lapsus asperrimos aquarũ quoq; inundatio
nes portẽdit: nubes etiã croceas ꝛ que cito dissoluũt generat ꝛ postmo-
dũ serenũ aerẽ efficit. Si vo fuerit in sicca fine applicatiõe malorũ nul-
lam pluuiã ferme fore ostendit. ¶ Notandũ insup q; lune cũ maliuo-
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiã largit beniuole illi⁹ quoq; aspe
ctu infortunate rores ꝛ efficatiã dissoluũt ꝛ phibent ꝛ horã future signa
tionis puertunt cui⁹ quoq; hore certos ꝛ inuariabiles euent⁹ luna eidẽ
maliuole cõiuncta ꝛ hoc inestita pfectio reducit. Ampli⁹ luna eidẽ ap-
plicans ꝛ in eodẽ cõnexu ꝛ signis ꝛ humidis mansionib⁹ imbres denũ-
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaꝫ ppie
respiciant mercurio accessantes siue nõ. Si vo nec his supiorib⁹ appli-
cet q; ipsa tunc sic fortunata imbriũ cessat signatio. Uenus tunc demũ
stelle supiori dũ eodeꝫ modo fuerit applicans imbres maximos ꝛ assi-
duos confert nec in venere dũ ea sic se habeant aliqua erit fallacia in
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dũ in eodem nodo nec si-
gno humido nec mansione humida cõmoret. Nã si luna eidẽ applicet
ꝛ ista ꝛ sic se habeant nubes ꝛ rores ꝛ nebulas absq; imbribus inducit:
quotiẽs aut ut p̃dixim*us* *sic se habuerit luna* post cõiunctionẽ saturno
ꝛ marti accedat nimiã pluuiã inducit ingruentiã. *Luna* autẽ ioui ꝛ soli
applicante dũ tñ sit inter vtrũq; aliquis respect⁹ dico uel applicationis
configuratio nec imbres. luna nãq; tunc demũ in loco optimo sub ali-
quib⁹ sextilib⁹ centroꝝ locis huic significationi dicatis q; fortunata ef-
ficit cassar ꝛ perimit ducatũ dũ iã fortunatis aliqua cõfiguratio rñde-
rit. Dee igit vniuerse occasiones aio sunt notande: nubes etiã que tunc
generant candide rores multos ꝛ inconstantes celos p̃figurãt imbres
ꝛ continuos. Ueneris quoq; adiectum testimoniũ pluuiarũ redũdan-
tiam pfecto inducit quotiens etiã mercurius aut cuꝫ stellis supioribus
aut alteri earũ applicet p pluuiarũ redũdantia ꝛ assiduitate submersio
nes ꝛ etiã ruinas admouet timendas: q̃uis tñ nec mercurialis appli-
catio cum superioribus ꝛ pluuie erunt. rursus mercurius postq̃ veneri
accesserit maliuolis applicans submersio ꝛ ruina imbriũq; assiduatio
timenda est. ¶ Mercurius itidem venerem de signo aquatico ꝛ man-
sione humida aspiciens aut in eodẽ loco uel nexu locatus ꝛ pluuie ter-
mini excedunt. q; si affit respectus dum aliter q̃ supra dictum est se ha-
beant pluuiarũ demonstratur mediocritas.

¶Mercurius rursum ⁊ si rores ut supradictū est habeat iudicare si be-
niuolas in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdē generis effe-
ctus ⁊ earū nature admixtus efficit mendacē eiusdē ducatū puer-
tit ⁊ educit effect⁹ alios cuiusmodi est multiplex ventorū rabies vndiq3
aerē depellens erit ventorū quantitas ꝑm stelle potentiā cuius genus ⁊
ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunaz applicet mendacio polluūt
sz veritate gaudebunt ⁊ ꝓmissa oīno exoluent nisi inquā eorūz status ⁊
habitus ioui ⁊ soli ut supradictū est aliquo configuratiōis genere ꝓprie
referant. Sic enī luna oīno ꝓmissa transmutat earūq3 postq3 luna eidē
accesserit cum saturno uel marte. Applicatio nunq3 mendax efficit. ve3
debiti ⁊ assidui ducatus augmentū inducit ⁊ nebulas. si vo quidā plu-
uias ꝑdictas variare ꝑsumant nō tamen nubes densissimas ⁊ aeris hu
morem valebunt puertere verū nebulas generabunt ⁊ vapores in aere
sublenabunt diuturnos ⁊c̄. ¶Amplius luna in humida mansione soli-
uaga etiā ab omnib⁹ stellis cadens ⁊ ab eisdem solitaria in centroꝫ ali
quo existens ⁊ in sui natura actione singularis nubes inducit ⁊ rores
multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex qui
bus replet̄ horizon ventos concitat diuersos ex quibus tonitrua corru-
scationes ⁊ fulgura ꝓcreant̄. Si vo deinceps stelle applicet que ꝑdicte
stelle genus obtineat si inquā fortunata fuerit ꝑdicta dissoluit: maliuo
la nanq3 existens duplā quā cetere stelle ꝓpriam exhibent efficatiam.
Unde notandū q3 soliuaga discurrit in ꝑdicta solutione fortissima iue
nit̄. Ex ꝑdicto quidem manifestum est qñ luna cum beniuolis aut eorū
hospitio aut etiam cū stellis que fortunatis applicant nullaten⁹ imbres
denunciat. cum maliuolis nanq3 econtrario discurrens pluuias gene-
rat vniuersas. nanq3 lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestma. i.
cōuentu exponens in his que necessaria videbant̄ ad huius cognitionē
habendā que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quō in oppo
sitione ⁊ tetragono agi debeāt deinceps exponatur. ¶Item inquire lo
cum ad horam cōiunctionis ⁊c̄. hoc totum habetur ex libro Japhar.
Sciendum q3 vsq3 ad illā partē: Notandū preterea. hoc sumpsi in quo-
dam capitulo de pluuijs a Japhar extracto: quia per clariora exprimit
verba. Residuū etiam poterit poni in breuioribus verbis ⁊ clarioribus
si videat̄ expedire ⁊c̄. Capitulū sextum de temperie aer̄ ꝑ annū.

¶Item volens scire naturā in singulis annis: cōsidera cōiunctio-
nem solis ⁊ lune uel oppositionē que est anteq3 sol intrat arietē
⁊ considera i quo signo sit saturn⁹ ⁊ si sit in signo igneo erit an-
nus calidus. In frigido talis ⁊ sic de alijs. ⁊ misceas cū natura

signi cū natura termini in quo est saturn⁹. Natura aūt cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associant uel eum aspiciūt. sic iudicabit de ioue cuz associabit luna soli uel opponit añq; sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciuz veneris z mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis z lune in vnaquaq; portarū zc̄. Quomodo autē fiat apertio portarū dicet inferius dño concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis z lune dominiū erūt lampades tonitrua z fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturn⁹ aspicit in loco martis z ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas z tenebras. q; si planeta retrograd⁹ ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Jtē volens scire zc̄. hoc in prima pte quadriptiti. hyspalensis ca⁹ volens zc̄. Jdem fere haomar in ca⁹ Ad pfectā zc̄. Aliq tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt. quere hoc.

Capitulū septimū.

Item radix i pluuijs ut aspicias ascēdēs cōiūctiōis uel oppositionis q̄ fuerit ante introitū solis in quodlibet signū z aspice dñm ascendentis z dñm loci cōiunctiōis uel oppositiōis z qñ isti dñi fuerint in locis humidis z pluuiosis significat pluuiā z econtra. z qñ applicuerit ad planetas humidos z pluuiosos pluuiā significat z econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus filiter signat pluuias. z qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias vbi mars sepatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias z econtra. Et scias qñ erūt pluuie ꝓpter signatorē in scorpione erunt pluuie in dāno. z si fuerit ꝓpter saturnū erūt submersiōes. Et ꝓpter martē radios z cōbustiones aeris signat. ¶ Jtē radix in pluuijs zc̄. hoc in octaua pte libri baly abenragel ca⁹ 27⁹ versus finē.

Capitulū octauū.

Item iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis z lune: considera ascendens z eius naturā: z de qua mansione lune sit: z naturā domini signi in quo ipse est z naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dño eius uel i eius aspectu z qui sūt cōiuncti lune uel ꝓspiciant: z in qua domo uel mansione sit luna z que testimonia ꝓualuerint: talis erit lunatio si dom⁹ vsq; ad tēpus oppositiōis: q; si fuerint eq̄lia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuia circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspexerit uel intrauerit signū pluuiosuz q; si nō est pluuia ventura imutare potest aerē coniūctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarū transeat a dextro in sinistrum uel econuerso:aut de velocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis : aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis:uel hec oia ecōuerso:aut intret aliquod signū uel ingrediat̄.nam bis cōtingentib⁹ frequenter aer clarus turbid⁹ efficit̄ ꝛ econtra:ꝛ sicut iudicam⁹ de cōiunctiōe ad oppositionē ꝑ ascēdens ꝛ eius dñm.sic etiā iudicam⁹ ꝑ horā oppositiouis vsq; ad cōiunctionē.Et filiter in oppositiōe consideram⁹ gradū supra terraz existentē ꝙ si luna ē lumine alicuius pluuialis planete ꝑ cōiūctionē uel aspectū in hora cōiunctionis uel oppositiōis tot dieb⁹ finitis post horā cōiunctionis uel oppositionis solis ꝛ lune incipiet pluere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluuie que sumit̄ a sole in saturnū ut postea patebit licet cōfirmauerit:aut ꝙ sit venus in scorpione capricorno uel aquario lumine ꝓportionalis:aut ꝙ sint tres planete in aquario iūcti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus valent q̄z vnū in hyeme.Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus valent q̄z vnū in estate. ¶ Item in vna terra pluit q̄q̄z ꝛ in alia nō:ꝛ hoc pōt esse ꝓpter diuersitatē ascendentis ꝛ planetarū ꝛ signatoꝝ terris determinatis ꝑdñantiū. ¶ Itē iudiciū ꝑticulare de aeris mutatiōe ꝛc̄. hoc inueni in quadā extrauagante hyspalensis. Itē fere in fine prime ꝑtis addit tñ quedā de signo illius terre.quere hoc ꝛc̄.

Capitulū nonū De apertione portarū.

ITem aptio portarū dicit̄ cū planeta inferior iūgit̄ superiori ꝛ fuerint dom⁹ illorū oppofite sicut solis ꝛ lune cū saturno uel eorū aspectus ad saturnū:iouis eodē modo cū mercurio. veneris cū marte.sz ven⁹ signat humiditatē.mercuri⁹ ventos.saturn⁹ nubila ꝛ frigus.mars ventos a dextro. iupiter temperiēq; ventos a sinistro qō in cancro magis signat.sic mars in capricorno. ¶ Mercuri⁹ itaq; si aspexerit dños aptionis portarū uel fuerit cū eis cōiunct⁹ in cōiunctiōe solis ꝛ lune uel oppositiōe erit vent⁹ ꝛ pluuia:ꝙ si aptio portaruz fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua ꝛ fulmina hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autē debes ꝙ pluuia q̄q̄z ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe solis ꝛ lune ꝛ si tunc fuerit aptio portarū q̄q̄z dilatat̄ cui⁹ rei causā ignorare nō debes. Si itaq; in apertiōe portarū cū luna cōiungit̄ soli uel ei opponit̄ fuerit ipsa luna in angulo. 10. ꝛ fuerit in signo mobili :tūc in ipsa oppositiōe uel cōiūctione erit pluuia si autē fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuia �fm ꝙ fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo:ꝛ tūc expecta pluuiā magnā cū ꝓuenerit lūa ad oppositū signi ascēdētis i cōiūctiōe uł oppōe ꝛ durabit pluuia �fm ꝙ luna ꝓueniet ad aspectū planetarū uel ad signa

horā pluuie ꝛc̄

pluuiã significantia. ¶ Item apertio portarũ dicit cuz ꝛc. hoc extrahit a libro hyspalensis ꝛ a pluribus alijs. Addit ꝙ luna fuerit in signo alicuius ciuitatis quere hoc ꝛc. Capitulũ decimũ de die ꝛ hora pluuie.

Item in quacũqꝫ cõiunctione uel oppositiõe solis ꝛ lune cõiungat luna aut dederit vim suã saturno. scito ꝙ i illo mense descendet pluuia: poteris quoqꝫ scire diem in qua descendet. cõputabis eni gradus equales que fuerint inter locũ cõiunctionis ꝛ locus aspectus ꝑcise completi seu ꝑfecti ꝛ qñ ꝑficiet numerus illoruz duorũ ſm quẽ dabis cuilibet gradui vnũ diem tunc pluuia. ꝛ magis testimoniũ clarũ si cõtingat ꝙ si luna illa die siue vna suarũ clauiũ que sint claues patet inferi⁹. ¶ Item semꝑ cõsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima domo. hoc eni signat supra pluuiã. fortitudo nanqꝫ planete qui ẽ in domo prima cõputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidẽ septime domus iouis ẽ mercurius qui ambo signãt sup ventos: ꝛ tu debes inspicere in quolibet mense si dñs signi ascendentis est iupiter uel mercurius ꝛ aspiciat vn⁹ alterũ hoc significaret ventos multos qui se renouarẽt in mundo. ꝛ cũ hoc toto si essent in aliquo angulorũ ascendentis tũc significarent semꝑ supra pluuiã cum fulgure ꝛ coruscatiõe ꝛ magis si esset inter eos aspectus quartus aut inimicitie ꝙ si alter eorũ foret i signo terreo tũc signaret sup grandinẽ tempestuosũ ꝛc. Item in quacũqꝫ cõiunctiõe ꝛc hoc Abraham de seculo ꝛc. Capitulũ vndecimũ.

Item ſm antiquos peritissimos astrologos quotiens luna a venere recedens marti applicet aut ecõuerso significationẽ pluuiarũ ꝑfecte reducit. A mercurio nanqꝫ recedẽs ioui applicãs idem signat aut econuerso. Aut a saturno recedẽs soli applicans uel econtra idẽ signat ꝛ nõ aliud prestat iudiciũ. Sunt hec autẽ singulaꝝ stellarum quasi manatoria que aptiones portarũ satis cõgrue nuncupant. Harũ itaqꝫ stellarũ oppositio declinate. 3°. uel. 4°. ꝛ ad partẽ australẽ ꝛ altiorẽ facta deprehensam ꝓprijs emanat pluuijs. Si inquã inter. 19. gradum scorpiõis a. 19°. tauri cõmorentẽ gradus. Item ex pte australi tũc demũ circa occurrit significatio quotiẽs a. 19°. tauri ad. 19. scorpiõis gradiũt. Et iterũ istarũ portarũ virtus optimiqꝫ significatio ut qua die uel hora nubibus uel pluuijs aer incipit variari ꝑ singulas vrbes aut etiã vicos sub imbriũ guttarũ stillicidio oriens ꝛ locus lune sꝫ etiã cui luna applicet superioribus videlicet aut inferioribus sũma diligentia ꝙquirat. non minus quoqꝫ an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut

oppositione ⁊ cõuentu aut etiam sit recepta. Adhuc etiã cui luna applicet quinto gradu constiterit: Lita etiã sit uel tarda uel media in austrũ descendens aut in septẽtrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine deprehensis luna stella qua die primo pluere incipit applicatio certum de imbribus p̃ singulas ferias dabit iudiciũ: quousq; videlicet ea stella ad aliud signũ transit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarum iudicio tali uel tali die nullatenus p̃sumendũ erit donec q̃ qñ luna eidem rursus applicet, pfecto discernas. Sivo applicatio imbres demõstret alios iuxta ipsum modũ ⁊ numerũ de multitudine ⁊ paucitate referendũ erit etiã illius signi naturã humidũ videlicet fuerit aut siccũ aut mediũ. Item quoq; signũ stelle cum qua fit lunaris applicatio: nam etiã ea die qua imbres expectas lune cursum celeritas ul' tarditas eiusq; in austrũ descensus aut in septẽtrione sublimatio notanda videt̃. Et de stella cui hec applicat in hunc modũ: nã ex stelle huius statu nõ minima imbriũ erit agnitio lune rursum atq; stelle latitudo pariter notanda. vtraq; enĩ australis ⁊ visioni existens affinior: ⁊ latitudo similiter eadez die largit̃ ingruentiaz latitudine quidẽ diuersa si nec affit receptio nubes p̃tendit steriles aut parũ ponit fecundas. Ad hunc quoq; modũ in qualibet regione uel vrbe aut termino si de lune applicatiõe uel receptione aut cõtra de eisdẽ necne in p̃dictis locis siti de natura etiã signorũ stelle cui applicat ea que diximus repiri contigerit nec aliq̃ detur iudicium nisi inquantum stelle alteri velociori applicat aut in eius cõuentu fit: qz igit̃ ⁊ hic ducatũ p̃meruit iuxta eius potentie vires ⁊ debilitatẽ de iudicio erit referendũ ⁊c̃. Item ſm antiquos ⁊ peritissimos astrologos ⁊c̃. hoc etiã habet̃ in libello qui incipit Lum multa ⁊c̃.

Capitulũ. 12.

Item considera ascendens cõiunctionis mensis arabum si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuia si infortuna nõ erit. Similiter de alijs angulis ascendentis ⁊ aspice qñ luna erit in opposito gradu ascendẽtis cõiunctionis ⁊ asperit eam aliquis planetarũ significantiũ pluuiã erit pluuia. Item considera ascendens ⁊c̃. hoc Alkindus in sexto capitulo.

Capitulum. 13.

Item in principio mensis considerat̃ luna si fuerit in aliqua mansionũ pluuiosarũ applicatq; ipsã planeta retrogradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis si fuerit aliquo signoꝝ aqueoꝝ tũc signat ipsa sup pluuiã ⁊ hoc est considerandũ potissime in principio mensis añ introitũ solis in arietẽ. Postea in quolibet aliarũ q̃rtarũ

anni qz tunc qualitates tempoꝝ mutant. ¶ Item qñ ab eodem minuto vnuꝫ luminare recedet ab alio: vide in qua mansione z singule stelle fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus z tertiã vnius incipiendo a primo minuto arietis: z considera vtrũ sit in humida ficca uel media scias etiã aspectus complexiones z applicationes planetarũ illa hora. Similiter fac in z duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo humido z planeta aspiciat eã aut cõiungeꝫ ei signat generationem pluuie p̃cipue si aspexerit aliqua infortuna. Si enĩ aspiciat infortuna aut applicet ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis quieta. Si autẽ martẽ pluuiam signat cũ fulgure z tonitruo z grandine. cum mercurio pluuiã cum vento forti inter sese distillantez. Et si fuerint luminaria in eadem mansione signat multã pluuiã cum magnis guttis. ¶ Itẽ in p̃ncipio ꝛc̃.hoc Abrahã de seculo ꝛc̃. Item qñ ab eodẽ minuto ꝛc̃. hoc Alkindus octauo capl'o.

Capitulũ. 14.

GRadus iterũ cõuentus uel oppositionis p̃ singulos menses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cõuentum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obliuionis tollat incõmodũ. Nã cũ mercurio aut veneri applicet sub eodẽ cõuentu uel oppositione pluuias effũdit. Si vo de signo. 10. de exagono videlicet aut trigono aut oppositione luna videris applicantẽ stella cui cõuentũ uel oppositiõis relictis ea applicet iuxta citũ cursum uel tarditatẽ descensum uel ascensum nec minus quoqꝫ ſm illius loci naturã z ſm lunez illius stelle latitudinẽ ut supius dictum est iudicij semita teneaꝫ. Si enĩ in eadez parte aut cardine discurrat z stella cũ qua lunaris fit applicatio sub terra moretur de antedictis facit iudiciũ. Si enĩ stella oriens nõ respiciat quãdo quelibet figura euꝫ respexerit imbriũ sequit renouatio. Ad hunc quoqꝫ modũ lune in oriente aut stellarũ ipsaꝝ negato respectu dum tñ ea pluuias designet absqꝫ nubiũ obscuratione subiti imbriũ aderũt discursus De mansione quidẽ lune indoꝛũ animaduerte sententiã: ĩ humida videlicet aut sicca ut indoꝛũ fides est: luna ĩ humida mansiõe stelle in humida mansione applicans pluuias ostendit: potissimũ quidẽ si in eodẽ nodo constiterit in humida qꝫ si in diuersis z humectantibus discurrãt z si nõ generales: pluuie tamen erũt: ea enĩ si locata stelle ĩ mediocri locate z in vno nodo applicans paucis affluit imbrib⁹ quoꝛuꝫ sunt initia sũt sine ipsa fortioꝛa erunt. luna enĩ in mediocri existente dum tñ eidez stelle in humido z nodo vno existenti fiat applicatio z si exordio min⁹ in fine tñ multipliciter aderit redũdantia. poꝛro si eũdem minime obtineant nodum imbriũ mediocritas plerũqꝫ etiã imbꝛes occurrent sz ste

riles. ¶ Gradus iterū cōuentus ⁊c̄. hoc in libello q incipit Cū multa ⁊c̄.

Capitulum. 15.

Item p singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis ⁊ lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib⁹ accentus pscrutari necesse est. Ea igit̄ veneri uel mercurio applicante ⁊ hinc pluuiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui⁹ rei euidentiā notandū qñ luna cardines ingrediēs veneri ⁊ mercurio applicat ipsa ducit die pluuias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q; si aliqñ accidisse ppendas fulgura erauget atq; tonitrua tñ paucos denunciat imbres nisi rursum in oppositiōe cōstiterit q; si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte pluuias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositionē orientē firmato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā mensis partē copiosis replebit imbrib⁹. In cōuentu uel oppositione cū venere ⁊ saturno signū aquaticū obtinenti applicatio ⁊ hec duo loca imbribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmoret. martis rursum cuz saturno applicatio nubes imbres ⁊ ventos multiplicat nubes detrahit ⁊ aera corrumpit: mercuri⁹ iterū horā cōuentus ⁊ oppositiōis veneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p singulos ⁊c̄ hoc in libro haomar ca⁹

Capitulū. 16.

De pnosticatione ventorū p stellas fixas ⁊ planetarū aspectus.

Item ventoq; cognitio ⁊ pluuiaq; experiētia sicut imbriū ex cōuentu uel oppositione ⁊ duob⁹ tetragonis oīno dependet quare est: stellas quoq; ventos designant mercuriū videlicet martē ⁊ solē attendere res hortat̄. Cū enim mars vētos exaugeat saturn⁹ pbibet ⁊ maxime retrogradus ⁊ in signo terreo ōtscurrens: nō minus quoq; aquatica ⁊ sicca contradicunt. mercurius enī stella est ventorū ⁊ pariter aerea signa. Ut igit̄ veniētes p̄uideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq; a cōuentu recedit eidē applicās ⁊ cū eo ⁊ sub eodē cōnexu in cōtraria mansione discurrēs ventorū nūciat discursus, rursū mercurio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo ⁊ mansione discurrēs nec ille retrograd⁹ obscuros efficit ⁊ aerē variat etiā sepe i aere ventoq; timēda nascit̄ rabies. ¶ Unde notandū q; saturn⁹ retrogradus etiā si mercuri⁹ eidem applicet ventis penit⁹ cōtradicit. mercurio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo ⁊ mansione que ventos iudicat venti calidi procedunt ⁊ in aere feruor generatur:

nubes quoq; horizonta possident plerūq; ignes ab ethere dilabunt uel in eodem apparent uel ventorū calor alterat marte potissimū retrogrado. Marte quoq; in signo cōmorante ⁊ minor ineſt ventorū significatio: verū pluuias multas ex modico ventorū largit. nā idem mercurius ioui applicans aut veneri aut in mansione ventos significante ⁊ in eodem nodo cōstiterit ventos reducit. Jupiter autē maiorē in ventis assumit efficaciā: eius enī est omniū ventorū ꝓpitiatio ⁊ leuitas. mercurius itidē soli configurat⁹ aut eūdē nodū ⁊ mansionē que ventos signat obtinens ventos ferientes generat ⁊ pessimos. Subtilissime autē acquisitionis est mercurij ⁊ lune cuz ceteris stellis cōmunitas siue admixtio ꝙ si fiat nihil deposito efficit. Jtē ventorū cognitio ⁊ pluuiarū ⁊c̄. hocre perit in libello Japharis vltimo capło. Ad euidentiā predictorū ⁊c̄.

Sequit quarta pars libri de iudicijs ꝑticularibus que non solum fiunt p̄ coniūctiones uel oppositiones luminariū: sz etiā ꝑ alias figuras particulares. Capitulū primū.

Cum luna fuerit i centro a sole et fuerit ap

tio portarū ⁊ fuerit applicatio uel aspectus uel luminū trāslatio seu receptio uł collectio luminū inter dīm ascendentis cōiunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens cōiunctionis uel oppositiōis solis ⁊ lune p̄cedētis ⁊ dīm suū septime iudica ꝙ in illo mense erunt pluuie tempore pluuiarum aut ventus ⁊ sic de alijs qō autē affirmat significationez lune est ꝙ fuerit venus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel ꝙ sit vnus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi qr tunc erit pluuia sine aliquo dubio. ¶ Jtem cū fuerit apertio portarū luna existente in aliquo centrorū p̄dictorū sequent venti uel pluuie calor uel frigus fm naturā dnoz apertionis portarū ⁊ fm naturā tpis. Jtem si tunc iueneris lunā in signo humido applicante planete humido licet ibi nō sit apertio portarū tū poteris habere fiduciā de pluuia. ¶ Cū luna fuerit ⁊c̄. hoc extrahit ex. 29°. ca°. octaue ptis libri haly abenragel ⁊ ex dictis haomar in ca°. Quotienscūq; itaq; ⁊c̄. qd sit esse in centro require

supza in septimo prime ptis. Item cuz apertio ꝛc̄. hoc in. 28° ca° octaue ptis Haly abenragel. ꝛ in haomar capl'o Tepestiua itaqꝫ imbziū ꝛc̄. de hac materia etiā habes in capl'o Ad pfectā. in eodē libzo specialiter ab ab illa pte Nō minus qnoqꝫ. 12. equantis ꝛc̄. vsqꝫ ad illā partē Ascēden te anni ꝛc̄.

Capitulū secundū.

ITem qñ fuerit q̄rta signans de humiditate a retrogradatione planetarū ꝛ tempozū suoꝝ inspiciā cōiunctionē luminariū igit̄ nisi fuerit applicatio cū retrogrado in cōiūctione sua signū est serenitatis ꝛ in oppositiōe sua similit̄ In q̄rta autē hyemali si luna fuerit in cōiunctione a centro a sole ꝛ a planetis retrogradis ē sūma rei ꝛ significatio eoꝝ fortioz qñ erūt ꝛ retrogradi ꝛ applicati cū sole. Si igit̄ cōtingit ꝙ inter solē ꝛ lunā ꝛ omnes planetas retrogrados sint iste ptes cū ascēsionib⁹ climatū erit pluuia in sūmo ſm ꝙ affirmat vis q̄rte ꝛ natura tēpozis ꝛ planetarū significantiū ꝛ lune: ꝛ si descendens fuerit de vno uel de duobus minuit̄ significatio ſm ꝓportionē sue vtrtutis: ꝛ si nō fuerit significatio ab altero istozū centrozuz nō erit quicqꝫ nisi venus humid⁹ humida aura in vere frigida: in hyeme fortioz istarū significationū est ꝙ luna sit in longitudine ꝓpinquiozi minuēs in lumine suo. Itē si luna iūgat̄ planete retrogrado aut si in cētro ab eo ꝛ a sole ꝛ sic addens lumine signū est pluuie ſm ꝙ affirmat tēpus planetis. Sz qñ erit coniuncta sicut dictū est ꝛ fit minuens lumine minuet id. Itē si planete sint retrogradi in secunda q̄rta circuli in hyeme vere aut autūno erit significatio fortioz. Sz si tunc retrogradant̄ in tertia q̄rta signū est magis diminutū: qz ventus meridionalis multiplicabit̄ illic. Sz qñ erit retrogradatio in pte septētrionali erit pluuia cū ventis septētrionalibus. Qñ vo fuerit directi in estate ꝛ luna in lumine suo minuēs ꝛ cōtumabit̄ erit signum grandinis fulguris ꝛ radioꝝ. Si fuerint etiā directi in pte septētrionali aut retrogradi in pte meridionali erit signū fulgur⁊ ꝛ grandinis. ¶ Itē qñ erit in prima q̄rta signi erit signū humiditatis a retrogradatiōe planetarū ꝛ luna addens lumie inspiciem⁹ in ea sicut in q̄rta hyemali ꝛ centris lune positis. Et qñ fuerint retrogradi cū sole in vna quarta erūt fortiora in quarta secūda circuli aut ī capite cancri aut in meridie qñ multiplicabit̄ ventus meridionalis humidus. Qñ erit sol in secūda q̄rta circuli ꝛ fuerit in signo humiditatis inspice cētra que posui ꝛ planetas retrogrados ꝛ addētes in lumine suo fortificabunt̄. verūtñ si fuerit cū sole in vna quarta erit caliditas fortis valde cōburens. Et si fuerint retrogradi in p̄ma q̄rta fil'iter. sz si fuerint ī inclinatiōe meridionali erit aura

mitis ⁊ qñ applicabit luna cum illis planetis retrogradis in centris no minatis mouebit ⁊ aera ad qualitates nubis grandinis ⁊ fulguris ⁊ cū fuerint illic directi debilitat̄ significatio. Qñ erit sol in q̄rta 3ª circuli ⁊ erūt planete retrogradi in illa pte illud est signū humiditatis ⁊ hore plu uie qñ manserit luna in centris dictis a sole: ⁊ cū stat significatio q̄ sint planete retrogradi pars eox̄ pti terre ⁊ applicet̄ ps eox̄ pti terre 3°. 7°. uel q̄rto aut in p̄dictis centris: ⁊ erūt planete retrogradi in septētrionali pte erit siguificatio fortior qñ cōiunget̄ eis luna ⁊ erit sol in centris dictis ⁊ ibi erūt planete addentes lumine: tūc si fuerint planete directi in pte me ridionali ⁊ retrogradant̄ in pte septētrionali ⁊ applicabit̄ cū eo planeta ⁊ luna est minuēs lumine suo signū erit pluuie ⁊ niuis tūc q̄ directi age bant tūc ptes septētrionales ⁊ cū fuerit luna in cētro a planetis retrogra dis si soluerint donec luna fuerit in centris tūc distillabit cōgelatio: ſz si fuerit luna addēs lumine suo soluet tūc illud. Jtē qñ fuerit q̄rta ⁊c̄. hoc extrahit̄ ab alkindo in. 4°. ca°. ⁊ tres ꝓpositiōes sequētes. Capitulū. 3.

Tem si vis scire vim ⁊ debilitatē multitudinē ⁊ paucitatē pluuiarū cōsidera naturā tpis ⁊ vim suā ac debilitatē ꝼm q̄ dixi de gradibus nature tempis ⁊ ciuitatis. sed si fuerit nā tpis tui in sūmo frigida ⁊ humida tūc significatio for tior planetarū ostendet significationē fortiorē pluuiarū: ⁊ si natura tpis tui fuerit frigida ⁊ humida in equalitate tūc mediocrice ⁊ ſz ꝓportionē viriū significatiōis aque sig̃bit. Et cū hoc si vis aspice naturā martis ⁊ veneris: ⁊ si fuerint frigidi humidi aut cali di ⁊ inter eos fit applicatio ex opposito aut ex obliquo p̄dictox̄ ⁊ latitu do eorū ⁊ erūt cōtinui cum sole aut vn⁹ eorū. Deinde considera applica tionē lune cū sole ⁊ centrorū p̄noiatorū ⁊ concordantiā. Si fuerit natu ra lune similis nature eorū illud est signū aque. Sz si vis sua est debilis ⁊ cōcordauerit illis duobus hec figura: ⁊ nō erūt retrogradi: ⁊ erit illud tēpus estiuale aut vernale erit adhue aqua multū fortis ⁊ cū hoc toni truū fulgur vent⁹ ⁊ grando multa: ⁊ erit multitudo aut paucitas ꝼm ꝓpi gtatē vapox̄ terre ⁊ erit frigiditas venti ⁊ caliditas ꝼm q̄ cōcordauerit latitudo lune ⁊ mansio sua a sole ⁊ ps ⁊ natura tpis. Si vo significatio p̄dicta fuerit i hyeme aut autūno nec fuerint retrogradi erit aqua debi lis distillās durante tpe siccitatis. Si vo fuerint retrogradi in tpe veris ⁊ estatis ⁊ cū fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in sūmo q̄ dictū est ⁊ in estate minus ꝑ multitudine caliditatis in aere aut ꝑ modo approp̄inq̄tiōis terre sue aut q̄ erūt in fūdo eccentricox̄ suox̄. Sz si fue rint retrogradi in hyeme in declinatione septētrionali erit minus q̄ di

co:ſi in declinatione meridionali erit plus ſi calidiores ſint retrogradi
ꝛ in fundo eccẽtricorũ ſuorũꝛ fuerit tũc applicatio cuũ ſole ab oppoſito
ꝛ duorũ planetarũ ſiliter ſi hec ſint in vere erit finis rei. In hyeme vo ꝛ
autũno minuet parũ. Si vo in cõiunctione planetarũ fuerit ꝛ duo pla-
nete cõtinui vnus alij ab vno cẽtrorũꝛ natura lune ſilis illi ꝛ erit in vere
ꝛ hyeme illud ẽ ſignũ pluuiarũ ꝛ fuerit in eſtate ꝛ vere illud ẽ ſignũ toni
truoꝝ multorũ cuꝫ aqua. Si igit fuerint duo planete cõiuncti in centro
aut cõcordauerit illis luna in natura illud eſt ſignũ pluuie ſicut dico: ſꝫ
centro ꝛ hore qñ figurat illud tempus ſi luna fuerit adiuuans nã ſua ſi
fuerit alius planeta a venere ꝛ marte in silitudine nature illorũ augmẽ
tabit res ita ꝙ fiet quaſi diluuiuꝫ. Si vo fuerint oẽs planete figurantes
ps eorũ partẽ in centris ꝑdictis ꝛ ſint retrogradi in hyeme ꝛ autũno ꝛ i
inclinatiõe meridionali erit de roꝛib⁹ ꝛ pluuijs ꝙ interficiet populos ꝛ
ciuitates ꝛ clima ꝑter pauca. Sꝫ ſi fuerint in vere ꝛ eſtate retrogradi ꝛ i
inclinatione meridionali erit ſiliter niſi ꝙ nõ cõicabit res cum oibus ꝛ
erũt cũ hoc fulgura ꝛ tonitrua ꝛ grando fortis. Cũ autẽ fuerint retrogra
di in quarta eſtiuali ꝛ tempus eſtiuale nõ erit ſignificatio ſup aquã erit
ſiccitas ſũma in climatib⁹ ſeptentrionalib⁹ ꝛ calor fortis ꝙ interficit po
pulos ꝑcipue ꝙ erũt ꝑpe equationẽ diei. Qñ autẽ erit ſignificatio pluuia
lis duorũ planetarũ ꝛ fuerit ſignificatio cõſũmens de trib⁹ reb⁹ non erit
quicꝯ. Cũ fuerit ſignificatio pluuialis de duob⁹ planetis aut tribus uel
ꝗttuor i eſtate erit ſũme mitis aura illi⁹ eſtatis ꝛ pue caliditatis: nec erit
aqua multa niſi fuerit ſignificatio de gnꝫ planetis. ¶ Itẽ ſi vis ꝛc̃. hoc
ex. 5°. ca°. Alkindi. ¶ Hic poſſunt notari quedã q̃ ab alkindo dicunt in
iſtis capitulis vltra practicã ꝑdictã. quere hoc ꝛc̃.

Capitulũ quartũ.

Item aſpice horam coniunctionis aut ꝑuentionis ꝛ q̃rta ꝛ
prima ꝛ ſecũda ad lunã cũ quo applicat illa hora ſi cum
venere ꝛ mercurio ſignificat generationeꝫ pluuie in illa
ſeptimana ꝛ hora illi⁹ erit ꝓm quantitatẽ graduũ qui ſũt
inter lunã ꝛ planetas duos quibus applicatur ꝛ ponã ſcꝫ
gradũ ꝑ die ꝛ minutũ ꝑ horã: ꝛ qñ luna conſequit gradũ
illius planete cui applicatur ꝛ venus in ſcorpione aut i capricorno aut
in aquario erunt pluuie multe. ſimiliter mercurius ſtat in aliquo illorũ
triũ ſignificat pluuiã. Et quando fuerit venus ꝛ mercurius in ꝑdictis ſi
gnis ꝛ luna oppoſita aut cõiuncta illis in quarta ſui ſignificat pluuiam
¶ Item aſpice ꝛc̃. hoc Alkindus in. 6°. ca°. verſus capituli finem.

Capitulum quintū.

Item nō solum oportet considerare cōiunctionē uel oppositionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansuetudinē accedentiū: sz iudicandus est etiam qñ luna fuerit dimidiata in luce z erit principiū signate mutationis ut plurimū p tres dies anteq̄z luna sit cum sole: z post etiam p tres dies ita q̄ sit in elongatione partiū equaliū. Similiter sciemus hoc a pticipatione quā habebunt cum planetis z qōlibet horū statuū z aliorū sicut est in sextili z trino aspectu z poterimus scire mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt z signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: z virtus horū statuū pticularium qui erūt die q̄libet erūt ꝓprie a stellis fixis que sūt luminis z operationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis uel occidentis respectu solis qz reducūt ut plurimū status pticulares in naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̄ aliqō luminariū transit p angulos ita q̄ mansuetudo z fortitudo que erit in statibus cuiuslibet temporis accidunt qñ transibūt luminaria p hec loca sicut recentia z minutio sunt p transitū p hec loca z mutatio: statuū ventor̄ erit ꝓprie qñ transibunt luminaria p hos angulos z mutatio sua erit vento qui erit a parte vbi erit latitudo lune. Et qñ pticularia accidentia erūt similia vniuersalibus opus fortificabit̄ z certificabit̄. Item nō solum ꝛc̄. hoc a Ptolemeo. 12°. ca°. secūde ptis. ¶ Sciendū ſm haly ibidē q̄ p oppositionē sciemus quid accidat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctionalis uel p cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p quartā lunationis sciemus id qō accidit in illa quarta iudicādo sicut p cōiunctionez z oppositionē z p compationē pticularis q̄ vniuersali i sciem⁹ illud qō accidet in illa q̄rta. ¶ Itē sup verbo illo' signate mutationis ꝛc̄. exponit sic. Luna currit p vnū duob⁹ dieb⁹ cōpletū z vna pte tertij z ex hoc posuit Ptolemeus cōpletū die ꝓpter breuitatē. Et qz virtus corpis lune est añ uel post p. 12. gradus ꝓpter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur duob⁹ modis. Primo mō q̄ luna transit in. 6. dieb⁹ duo signa cōpleta z transeūdo duo signa puenit ad tot numeros graduū quot sūt in firmamento sextili z sic ibi oportet q̄ applicet ad punctū dñi significationis in trib⁹ ante z in tribus post z hora qua puenit ad ipsū mouet̄ significatio illa. Secūdo modo intelligit̄ q̄ virtus lune voluit̄ cū virtute solis tribus diebus ante suā applicationē z sic etiam remanet iuxta vsq̄ ad tres dies post suā applicationem qz corpus solis habet. 15. gradus añ z. 15. gradus post. z corp⁹ lune. 12. ante z. 12. post. Modus autē primus ma

gis cõcordat cũ opinioue Ptolemei nihilomin9 vterq3 habet rationem
zc̃. ¶ Notandũ q9 sicut in morbis acutis q̃rta ut plurimũ est nũciatiua
septime z sic p tres dies añ apparet signũ salutis uel timoris ita suo mo
do añ diunctionẽ uel oppositionẽ solis z lune potuit apparẽ pricipiũ
signate mutatiõis in aere. Quere igit causã hui9 si placet in dieb9 creti-
corũ. ¶ Sciendũ iterũ q9 qñ luna distat a sole. 45. gradib9 añ uel post di- Quando Luna dicatur esse in centro.
cit in centro a sole z ꝓpter ꝓpinquitatẽ cõiunctiõis ul' oppositiõis si aer
mutet tũc sicut cõsueuit fieri potissime cũ luna ẽ in centro a sole. Sm Al-
kindũ z plures alios magis ad fil'itudinẽ signationis uel oppositionis
mutabit q3 ad similitudinẽ signatiõis alteri9 figure: hoc aũt fit trib9 die
bus cõpletis añ cõiunctionẽ z trib9 diebus post. vnde signator cõiũctio
nis modicũ variauit locũ suũ in zodiaco in tanto tpe z iõ illũ locuz uel
stellã fixã quã aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per
45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendũ Sm haly vbi supza q9 in qualibet appli-
catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut prius in
cõiunctionib9 z oppositionib9. ¶ Jtẽ Sm haly ibidẽ stelle lucentes sunt
ille que sũt prime magnitudinis z postea secũde magnitudinis z sic de
alijs: ita q9 virtus earũ crescit cũ mane apparuerint exeũdo radios solis
aut intrãdo sub radijs solis z sic virtutes solis z lune q3uis sint victrices
tendũt tamen ad virtutes earũ z post q3 ita est cũ stellis fixis magis de-
bet hoc iuenire in planetis. p cõmixtionẽ igit virtutũ earũ poterim9 sci-
re accidentia pticularia cuiuslibet diei. ¶ Jtẽ haly exposuit sil'iter Non
minus zc̃. vult dicere q9 qñ aliqõ luminariũ transibit p aliquẽ angulo-
rũ qui fuerit in applicatione sua prima signabit p additionez uel dimi-
nutionẽ accidentis applicatiõis z additio erit significatio sui transitus
fuerit ipsa met significatio radicis uel minutio si significatiões sunt di-
uerse. Et post q3 ita est q9 applicuerit gubernatori aliqõ luminarium uel
ipsi gradui significatiõis faciet idẽ vnde grad9 significatiõis luminariũ
qõ fuerit supza terrã in illa applicatiõe post modicũ gradus solis ẽ gra
dus significatiõis. Sil'iter Sm fortitudinẽ ãguli erit fortitudo rei z man
suetudo: qñ ascendẽs z. 10m fortiores sũt alijs: z etiã hoc pz i crescentia
maris z nili. Unde qñ luna transit p aliquẽ gradũ fig̃tionis fit in crescẽ
tia additio. vbi gratia: qñ luna transit p illud signũ qõ fuit ascendẽs in
cõiunctiõe uel oppositione añ introitũ solis in cancrũ uel aliud signũ z
applicat gubernatori uel transiuerit p locũ diũctionis uel oppositionis
sig̃t augmentũ nili nisi alia maior sig̃tio hoc disturbet. Jtem venti mo
uent̃ de vna pte ad aliã boza qua transit aliqõ luminariuz p aliquẽ an-
gulũ ex angulis ascendẽtis sig̃tionis Sm ptẽ ad quam declinat latitudo
lune zc̃.

Capitulū sextum.

Item si ille qui dñaf in cōiunctione uel oppositiōe fuerit humectans ꝛ cōmiscebiť cū stellis fixis humectantib⁹ ꝛ locus cōiunctionis uel oppositionis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel sol in tali loco. hec res siyna. s. applicuerit alteri aspectu aliquo signat ꝙ erit illa dies humida ꝛ multe pluuie. Et si saturnus rebus istis applicueri t erit pluuia fortis ꝛ damnosa cū lubrigaf. Et si iupiter erit tē peries ꝛ tempus saporosum ꝛ omnes alias applicatiōes intelliges hoc modo. ¶ Itē quottidianos imbres lunaris p̄ singula p̄gressio manifestare poterit ipsi⁹ g̃ in cardines ingressus eiusq̄ cū venere ꝛ mercurio ac reliquorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applicatio cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens ꝛ supradictis stellis applicās ipsa die pluuias signat ꝛ generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiorē euidentiā signa aquosa scire necesse humide: ꝛ sūt venus ꝛ mercuri⁹ nature ꝛ luna expressius tanq̄ mercuri⁹ ꝛ venus ꝛ luna amicanť imbrib⁹. venus itaq̄ horis qōlibet signorū obtinens aut lune itidē applicās imbres signat venus itidē cū mercurio in signis aquaticis ꝛ luna similiter ʒ in fine signi alteri eoꝝ applicans ꝛ multos ꝑfitenť imbres pauciores tñ q̄ in principio. luna itidē cum venere absq̄ mercurio in signis aquaticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē venere remota. Amplius luna i huiusmōi quolibet veneri ꝛ mercurio applicās dū pluuiarū obtineant signa. pluuiaꝝ notāt ⁊stantiā q̄usq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Venus iterū mercuri⁹ ꝛ luna maliuolis applicantes nec eisdē cōiuncte die ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: ven⁹ cum sole locata dū vtriq̄ mercurio ꝛ lune iungaf eadē die nubib⁹ redūdant. Mercuri⁹ autē ꝛ ven⁹ capricorniū applicās ꝛ luna in tauro aut i piscib⁹ idē. Irē p̄dictarū altera in capricorno ꝛ luna in tauro aut in virgine veneri ꝛ mercurio de oppositiōe applicās ad ipsuz p̄cipue dū luna i tauro cū cauda morer̄ ꝛ a saturno recedat: ac venus cū ipso marte in aquario ꝛ mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbrib⁹ ether onoraf. ¶ Itē si ille ꝛc. haly in fine glose. 11°ca° secūde ptis q̄dripartiti Ptolemei Itē quottidianos ꝛc. haomar in penultio ca°. ꝛc.

Capitulū septimū.

Item cū sol est in hemisperio australi ꝛ ven⁹ sub radijs ei⁹ eidez luna applicāte ipse die ꝛ hora p̄tendit imbres futuros: nō min⁹ quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē oppositā i scorpione morer̄. hoc etiā idē martis ꝛ veneris sub scorpiōe ventos iudicabit. Itē cū sol est ꝛc. Ista ꝓpositio cū consequentib⁹ habeť in libro Cū multa ꝛc.

Capitulum octauū:

Item sole in aquario existente luna eidē applicante aut in eiꝰ oppositione locata ꝛ venꝰ ibi cōmorēt in ipsa hora pluet. Itē quocꝫ solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoꝝ oppositiōe aut tetragono discurrēs cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: qꝫ si cōuenerit ꝛ mereuriꝰ pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde liczꝫ eis aspectꝰ nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra ꝛ venus in sagictario luna eis comitate ipa die pluuias inducūt ꝛc. Itē sol in aquario luna in leone eadē die minꝰ imbriū erit discursus: Itē mars sol respiciēs ꝛ luna dū venus ꝛ mercurius hāc aut illū comitantē imbres pñtes ꝛ grossas insinuūt guttas. Sic quocꝫ in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpione stille grandes tonitrua ꝛ corruscationes generantē. Itē sol rursū in piscibꝰ uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagictario cōmorante in vaporosis vticꝫ locis ipsa die imbriū tulit effluentiā. Amplius autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrēs ꝛ etiā luna imbriū stillas grauissimas lampades ꝛ tonitrua ꝓtendit. Itē in leone virgo pisces ꝛ etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositione aut cū venere discurrēs stillas nō sine lampadibꝰ tonitruo ꝛ fulgure mittit. Itidē etiā luna in leone lāpades tonitrua ꝛ fulgura generantē: pariqꝫ mō in regionibꝰ eqnoctialibꝰ linee subiectis in secūdo climate tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5°ꝛ in. 6° remissiꝰ. mars quidē retrogradꝰ si eū aspexerit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitio martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dñio posito discurrēs sol in aq̄rio uel i piscibꝰ situs die ipsa pluuia ꝓ notāt redūdātiā. Sole quidē in piscibꝰ ꝛ luna ꝛ marte i respectu fulgura erūt ꝛ tonitrua ꝛ pluuiarū redūdātia ꝛ fulgurū lapsꝰ. Itidē etiā sol i ariete ꝛ scorpiōe luna in leōe ꝛ sagictario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe vētos generat frigidissimos nō minꝰ eodē in capricorno ꝛ potissimū in aquario existēte dū saturnꝰ in oppositiōe eorū discurrat ꝛ alterū luna aspexerit. Itē sole ꝛc. hoc ibi supra. Capitulū nonū.

Item si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositione uel cōiunctiōe. luna itaqꝫ in mansionibꝰ eq̄lis cōplexionis ac siccis discurrens aut si deinceps stellis inferioribꝰ q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudicium. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius ꝛ aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus ꝛ mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiciāt aut cū ipsa mozenī luna etiā de locis humidis eisdez applicet imbzes innuit timendos:ea enī de locis siccis ⁊ equalib⁹ applicans uel respiciens mediocres oīno pluuias iuducit. luna itidē in singulari ⁊ p̄pria natura nebulas ⁊ imbzes etiā raras affert candidas ⁊c̄. Item cū luna ⁊c̄.hoc extrahit a Japhar in pagrapho Est itaq; tetragonus.⁊ forte hoc alibi ut credo satis habet.q̄re hoc. ¶ Uult tñ ibi q; a p̄mo ingressu solis in libzā ⁊ p̄ totū annū ⁊ in exordio anni ⁊ ɔiūctionib⁹ ⁊ oppositionibus solis ⁊ lune ⁊ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione i illa p̄positione Inquires ⁊c̄.ad euidentiā p̄dictoz̄ū.

¶ Sequit quinta pars libzi de iudicijs mutationū aeris p̄ cōiūctiōes ⁊ aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de p̄ntia lune ⁊ aliozū a sole in certis locis zodiaci.

Cum ad aliquē terminū certū dispositiōes

aeris volueris p̄nosticare:scias primo loca omniū planetarū ad eūdem terminū: ⁊ ille planeta qui plures fortitudines uel testimonia habuerit i suis signis erit dispositor tpis fm sui naturā. Consydera tñ fortitudinē aut debilitatē quā habuerit dispositor a cōiunctiōe uel aspectib⁹ suorū similiū aut suoz̄ contrarioz̄:⁊ ex loco suo in eccentrico ⁊ epicyclo ⁊ ex nā cōi tē pozis⁊ ex hoc iudica qualitates aeris. Sic igit poteris p̄cognoscere qñ erit calor p̄excellens qñ plures planete calidi habuerint plura testimonia ⁊ cū hoc se aspexerint de tertio aspectu. Cognosces etiā frigus p̄excellens p̄ testimonia frigidoz̄ū planetarū. Poteris etiā p̄cognoscere humiditatē p̄excellentē p̄ planetas humidos abundantes testib⁹ ⁊ potissime cū se aspexerint de tertio ⁊ in signis aquosis. Cū ad aliquem ⁊c̄.hoc extrahit a quodā libello q; incipit Ad p̄nosticandū diuersā aeris dispositionē ⁊c̄. ¶ Sciendū q; iste auctor sic p̄tendit. Primo ponit signoz̄um qualitates sicut prius patuit p̄ tabulā. Postea ponit nās planetarū nec oīno sicut alij dicūt:dicit:saturn⁹ est sūme frigidus ⁊ ex ɔsequēti siccus. Jupiter ē temperate calid⁹ ⁊ humidus plus tñ abundat in eo caliditas q̄ humiditas. Mars superflue calidus ⁊ siccus plus tamen calidus q̄ siccus. Sol temperatissime calidus ⁊ siccus : ⁊ ut verius dicam : inter qualitates summe equalis. Uenus temperate calidus ⁊ superflue hu-

humidus.mercurius autē inclinaī ꝑ naturam suā ad eum planetaz cui cōplectiī ex planetis ⁊ signis: diciī tñ in se frigidus ⁊ siccus. luna vō in natura sua diciī temperate frigida ⁊ summe humida. Unde diciī fons humiditatis sicut sol est fons calozis ꝙuis sol sit temperatissime calidꝰ. ¶ Postea dicit ꝙ planeta in domo sua habet quinqꝫ fozti tudines ⁊ dignitates seu testimonia.⁊ in exaltatione quattuoz.in triplicitate tres.in termino duas.in facie vnā. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio ⁊c̄.sicut pzius ⁊c̄.patuit ꝑ tabulā vbi ꝙ ponit leonem ꝑ domo solis:cancrū ꝑ domo lune. libzā veneris.arietē martis. sagictariū iouis.⁊ capzicoznū saturni.qz ut dicit ibi fuerunt creati in ozigine mūdi. Postea dicit ꝙ quinqꝫ planete habent accidētales potestates in quinqꝫ signis residuis ut saturnꝰ in aquario.iupiter in piscibus. mars in scozpiōe.venꝰ in tauro.mercurius in geminis vnde dicunī eoz accidentalia domicilia. Sciendū tñ ꝙ nos vtimur hic.s.ꝙ planete in istis domicilijs tot fozti tudines habent sicut in alijs ⁊c̄. Postea dicit ꝙ planete foztunanī qñ aspiciūt seinuicē aspectu amicabili uel debilitanī si aspiciunt se aspectu inimicitie. ⁊ hec amicitia uel inimicitia fit ꝓpter contrarietatē uel similitudinē signoz in qualitatibꝰ pzimis sicut patuit pzius. Ponit etiam ⁊ aspectus sicut pizus. Postea dicit ꝙ cōiunctionē dicunt astrologi aspectum foztissimū.nos autē inuenimus multotiens oppositū.s.aspectus ꝙ pzimus dicebanī esse foztiozes ⁊c̄. Postea dicit ꝙ alie sūt foztitudines uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo scz ozrus ⁊ occasus ꝓgressio statio ⁊ retrogradatio: ⁊ sicut patebit inferius. Foztioz est qñ est in ozru uel ꝓgressiuus ꝙz occidentalis uel stationarius uel retrogradus. Postea dicit ꝙ omis planeta in supiozi pte sui deferentis foztiozē habet in istis inferiozibꝰ opationez ꝙz in inferiozi ⁊ hoc est ꝓpter eius motum velociozē fm reuolutionē diurnā. velociꝰ mouetī:ipse ꝓbat ꝑ hoc ꝙ paralellus egnoctiali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maioz ⁊ plus distat a suo centro ꝙz ille qui est descriptus eo existente in opposito augis ⁊ sic cū magis spacium ptranseat in equali tpe velocius mouetī fm reuolutionē diurnam. Cum ḡ fm pḃos ⁊ astrologos fm motus supiozū mouenī ista inferioza. ⁊ hoc etiā notabiliter patet ꝙ sol ascendit augē crescenī vegetabilia:qñ autē recedit fit econuerso.hoc etiā patet potissime in effectibꝰ lune:qz in qualibet oppositione ⁊ cōiunctione solis ⁊ lune fluxus est marimus: ⁊ hoc est qz tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc fluxus minus ⁊ hoc qz tunc est in opposito augis. Et nota ꝙ oziente luna cōgreganī vndiqꝫ aque ⁊ tumulanī ⁊ eleuanī quasi versus suā causaz ⁊

originē: ꝛ ceſſat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi ꝛ cuz ibi fuerit minuit̄ tumoꝛ ille ꝛ fluunt aque ad locum oppoſitū ꝛ generat̄ tumoꝛ conſimilis ꝛ hec eſt cauſa quare ſunt duo fluxus in die naturali ꝛ ficca cumen aque moueꝫ ſicut luna ab oriente in occidēs ꝛ ſe tenet ſemp verſus lunā. ¶ Infoꝛtunant̄ etiam planete cū fuerint ꝓpinquioꝛes zenith capitis ꝛ debilitant̄ cum fuerint remotioꝛes. Poſtea ponit tabulam rotundā ad cognoſcendum foꝛtitudinē planetarū ꝛ totum patuit ꝑ tabulas ꝓius poſitas in introductoꝛio. Poſtea ponit ꝓacticam ſz nō oīno nec ita explicite ſicut poſitum eſt: qđ tñ ſupius in textu dictū eſt extrahere aut ab alijs que explicite dicunt̄ aut ab illis que ꝑ ſuuz ꝓceſſum ꝛ per ſua exempla dant̄ intelligi. ¶ Poſtea exemplificat ꝛ hoc ꝑ teipſum poſſes facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus noſtrū. ¶ Nota ꝙ ſicut ad cognoſcendū quando erit aer aquoſus cōſideranda ſunt ſigna aquoſa ita intelligendū de calidis ſuo modo ꝛ ſic de omnibus qualitatibus ꝛc̄. ¶ Dubitatur vtrū planete velociꝰ moueant̄ motu diurno eis exiſtentibus in auge cū in augis oppoſito. videꝫ ꝙ nō: quia qñ velocius mouent̄ ꝓꝓio motu tardius mouent̄ motu diurno cuz iſti duo motus ſint ad oppoſitas partes igit̄ ꝛc̄. Item dubitat̄ vtrū plus influant in iſta inferioꝛa cum ſint in auge: ꝛ videꝫ ꝙ nō: qꝛ cum ꝑ lumen operent̄ ꝛ coꝛpa eoꝝ minoꝛa videant̄: minus vident̄ influere. Item exemplū de ſole nō videꝫ ad ꝓpoſitum: qꝛ ego dico ꝙ creſcentia herbaꝝ ꝛc̄. nō fit ꝓpter ꝓpinquationē ſolis ad augē ſz quia ſol eſt magis ꝓpe zenith capitis.
¶ Item videꝫ male dicere ꝙ aque fluūt ad locum oppoſitū lune ꝛ generat̄ ibi tumoꝛ quia cū luna ſit quaſi mater humiditatis videꝫ ꝙ in parte oppoſita nō debeat eſſe tumoꝛ aque imo tñ verſus lunā. Ad ꝓimū quere reſiduū.

Capitulū ſecundūū.

ITem cū volueris ſcire temporis varietatē: ſcito ſigna diuerſoꝝ planetarū vtrū ſint calida uel frigida: ꝙ ſi fuerint calida ſignāt caloꝛem in eſtate ꝛ temperamentū in hyeme. Si in ſignis frigidis ſignant frigiditatē in hyeme ꝛ temperamentū aeris in eſtate. Similiter cuz cōiuncti fuerint in aquaticis ſignāt ſupfluas in hyeme pluuias ꝛ temperamentū uel multitudinē roꝛis in eſtate. ¶ Item cum fuerint planete ponderoſi quibus debet copulari aſpectus ſolis in directo alicuius ciuitatis. ſ. in ſignis ſeptētrionalibus ſignāt ſiccitatē ꝛ terre ſterilitatē. Cuz vo elongati fuerint. ſ. cū fuerint in meridionalibꝰ ſignat multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderoſi omnes oꝛientales ſignant multitudinē pluuiarū in hyeme ꝛ nimiā ſiccitatē in eſtate ſi occidentales fuerint. Stella rurſū in qualibet domo einſdē nature diſcurrēs ꝛ recepta dū recipiens bonū obtineat locum debitus oīno ſequit̄ effectus.

optima quidē ꝛ maioꝛ de efficacia certitudo si in ipsi⁹ natura cōstiterit. Ad hec etiā luna cū ioue ꝛ venere ac mercurio ex vna ꝑte applicans imbꝛes generat estiuātes. In austro quidē magis imbꝛib⁹ opportunū reuere potissimū ꝛ ioue receptis ꝛ luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturn⁹ eni in signis humidis pluuijs minime ꝯtradicit. ꝛ hoc modo i lune applicatione exequendū erit. si vo in eadē ꝑte ꝯiūgant̄ dū inferioꝛ sub supioꝛi moꝛet̄ cuiusmodi sūt mercuri⁹ iupiter ꝛ venus ꝛ mars. luna etiā ꝛ saturn⁹ quotiēs igit̄ ambo cuiuslibet inferioꝛi applicet postꝙ inferioꝛ a supioꝛi sese euaserit roꝛes estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire ꝛc̄. hoc habet̄ in. 6°. ca°. messahalach: qualit̄ debeā planetis ponderosis copulare solē. q̄re. Stella rursū ꝛc̄. hoc habet̄ i libello q incipit Cū multa. ꝛ qꝛ satis obscure loquit̄ querat̄ expositio. Capitulū tertiū.

ITem testimoniū est ut cū mane videat̄ quantū est a sole in saturnū ꝛ tantuꝫ a loco lune cōputet̄ ꝙ si cōputatio finiat̄ in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij ꝛ iouis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat̄ cōputatio si sit humida uel ficca �fm quā iudica. Itē si hāc partē mercuri⁹ aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eadeꝫ die ventos ꝓcreari necesse est: foꝛtioꝛes quidē luna eā comitante p̄cipue si ven⁹ eidem cōsoꝛs extiterit. Itē considera introitū lune i primo p̄cto cuiuslibet signi ꝛ qui eā deꝓpꝛio fouebit aspectu ducat⁹ officiuꝫ ꝙ huiꝰ rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū ꝛc̄. hoc in quodā extrauagāti ca°. q incipit Uolens aūt scire. Idē Abꝛaham auenezre. Ideꝫ in libꝛo haomar in fine capli 2 'q̄uis ibi dicat̄ ꝙ ab haomar fuit p̄termissa hec pars: ipse tñ nō posuit ꝙ si cōputatio finiat̄ vsq̄ ibi. Itē si mercuri⁹ hauc ꝑtē aspiciat ꝛ p̄cedentes hoc vltimū nō ponūt. Sꝫ si oia hec cōcurrūt foꝛtius efficiet̄ iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi. Capitulū quartū De hoꝛa pluuie.

ITem luna intrās cancrū hoꝛa solis. virginē hoꝛa veneris. libꝛā hoꝛa iouis. sagictariū hoꝛa ꝓpꝛia. taurū hoꝛa martis. geminos hoꝛa mercurij. si g̃t �fm naturā dñi ꝛ signi in quo ꝑte est. Itē cuꝫ luna intrat aquariū uel scoꝛpionē uel capꝛicoꝛnū hoꝛa saturni signat q̄ hoꝛa erit mutatio aeris. Qñ aūt ps. i. grad⁹ triū planetaꝝ a q̄ veneris. s. ꝛ mercurij ꝛ lune erit in aliq̄ signoꝝ aque ꝛ diriget̄: in illo abū dabit pluuia adeo ꝙ nocebit ppl'o. Itē luna intrās ꝛc̄. hyspalensis ideꝫ nisi ꝙ ipse dicit signat pluuiā ad modū signi in q̄ dies signi uel hoꝛe est Alkindus etiam ibidem nisi ꝙ ipse addit leonem hoꝛa iouis aut etiam libꝛam significat pluuiam ꝛ ventū �fm naturā signi ꝛ ꝙ erit de substanta istoꝝum signoꝝū erit. Similit̄ idē haomar nisi ꝙ ipse dicit sagictariū

hora mercurij ⁊ ibi dicebat̄ geminos hora mercurij. dicit etiā geminos leonē aut libram hora iouis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit̄: Ea etiā rursum scorpij signuz hora saturni ingressa ventos nūciat frigidos. nā ipsius in aquariuz uel pisces ingressus aera pturbat ⁊ puertit. Item cū luna intrat aquariū ⁊c̄. Alkindus igit̄ sciendum q; ps hec accipit̄ p gradu ⁊c̄.

Capitulū quintū De signo oriente ⁊ asuph.

Item hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimū dinoscat̄: vnde si fuerit signū aquatticū designat pluuias: melius quidē signū hui⁹ luna possidente pluuiarū administrat ducatū cuiuscūq; luna applicabit stella. quotiens enī luna eā cui applicat stellam sequit̄ inundatiões pluuiarū innuit. Uenus rursū atq; mercurius quotiens vterq; alter signū aquaticū possidet ⁊ luna eis adiūcta imbres adauget nisi forte in maliuolo aspectu uel cōiunctione cōmoretur. Itē saturno transeunte de vno signo in aliud fiunt dyachintes q̄s arabes vocant assub: uel quedā alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrū pluuiā facit. Item hora transitus ⁊c̄. hoc haomar versus finē illius capl̄i Quottidianos ⁊c̄. Item saturno transeūte ⁊c̄. hoc in floribus hermetis. pōt hic notari. s. tempus generationis cometarū ⁊c̄. quere de hoc. Item venus intrans ⁊c̄. hoc Albumasar ⁊ plures alij ⁊c̄.

Capitulū sextum.

Item luna *in signo feminino* si aspiciat planetā retrogradum *in signo feminino statim pluet. Itē luna* iuncta planete retrogrado aucta lumine signū est pluuie. *Item luna in signo* ⁊c̄. Hyspalensis addit cū luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta ⁊ considerat eā planeta retrogradus i signo feminino necessario pluuia erit ⁊ videt̄ q; ꝓpositio hec supponat aliquā aliā significationē planetarū sicut p apertionez portarū ⁊ huiusmodi. ⁊ sic cōtinuaret̄ cum dictis hyspaleusis p̄cedentib⁹. Item luna iūcta ⁊c̄.

Capitulū septimū.

Scias iterū q; luna declinatione meridionali qñ applicatur cū directis ⁊ est signatio siccitatis mouet̄ aer ad sūmū frigidū si fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione septētrionali ⁊ calor est in estate ⁊ applicat̄ cū planetis retrogradis ⁊ erit addens lumine suo mouebit̄ diuersitas ventorū ⁊ si fuerit minuēs lumine minuet̄ illud. Itē si lune in scorpione opponit̄ mars pluuie abundabunt maxime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Itē cum luna est in oppositō aut cuz

venere in piſcibus ariete libra ⁊ ſcorpione erunt lampades tonitrua ⁊ fulgura. Scias iterū ⁊c. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Jtē ſi lu ne in ſcorpione ⁊c. Jtē cū luna ⁊c.

Capitulū octauū.

Tem cū ſol eſt in hemiſperio auſtrali ⁊ venus ſub radijs eius ſi luna ſibi applicet ſtatim pluet. Jtem cū venus in ſcorpione uel aquario uel capricorno cōiungiq̄ luna ei uel eā aſpicit ſignificat pluuiā multaz. Similiter mercurius in ſtatione aliquo triū p̄dictorū ſignor̄ ſic fit tribus planetis cōiunctis in aquario. Jtem cum luna mercurio aduſto applicat aut de ſcorpione opponit̄ pluuiā. Jtem cuz ſol ⁊c. Jtē cum ven⁹ ⁊c. Jtem cum luna mercurio ⁊c.

Capitulū nonū.

Luna igit̄ a marte diſcedens eadē die pluuias inuit in ſigno p̄cipue aquatico ꝑ ſingulos autem dies ꝑ ſigna que imbrib⁹ dicant̄ erit diſcretio ſicut cancer ſcorpio aquari⁹ ⁊ leo: p̄cipue aquari⁹ ⁊ leo. Stelle iterū pluuiaz ſignifica tiue venus mercuri⁹ ⁊ luna: potiſſimū venus ⁊ mars. venus iterū p̄dictor̄ qōlibet occupans dū ea in extremo ſigni uel medio cōmoret̄. Luna iterum ſigna aquatica pmeando veneri applicans eadē die pluuiarū *innuit redūdantiā. Uenus itidē ⁊ mercurius* dū huiuſmodi *ſigna pambulant etiam luna* ſiliter alteruter applicans ⁊ finē ſigni obtinens pluuias priorib⁹ tū minores aduehent. Luna itidē ⁊ venus in ſignis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarū habet iudicū nec aliud dū mercuri⁹ ⁊ luna ad hui⁹modi ſigna pueniūt liceat venus in pluuioſo nō ambulet. Luna in eiſdē ſignis veneri ⁊ mercurio applicans dū ſimilia gradiant̄ aut cū eadem diſcurrant donec luna ab eis ſeparet̄ pluuias renouât. Luna igit̄ a marte ⁊c. hoc haomar in fine ⁊ aliqua ibi ponunt̄ que ſūt ſimilia eis ſeu illis que ſequūtur in illa ꝓpoſitione que ſic incipit Jtem quotidianos imbres ⁊c.

Capitulū decimū De planetis pluuioſis.

Tem ex cōiunctiōe ſaturni ⁊ iouis fit frigus. Jtem ſi ſol ſaturnus ⁊ iupiter fuerint in aliquo ſignorūz aquaticorū ⁊ cauda cū illis timendū eſt in illa parte ſigni de pluuiis multis cū torrentibus corrūpentib⁹ ciuitates ⁊ hoc cum adiuncti fuerint in hyeme etiam ſimiliter in eſtate ⁊ erūt nubes grando aut aues equitantiū ⁊ hoc erit fin māſionem lune cū illis. Et ſi fuerit ſol cōiunctus ⁊ ſaturn⁹ ioue ⁊ marte i vno

B. ſtæ. Genovefæ. Paris.

signo aqueo erit signū pluuie, ⁊ torrentiū nociuarū ⁊ pluuiarū: ⁊ fortius qñ adiunget cum sole ⁊ marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi ⁊ aspiciet eos saturn⁹ ex q̄rto aut cōiunget cū eis. si fuerit in signo. 10°. inspice venerem qñ intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Jtē ex cōiunctiōe saturni ⁊c̄. hoc in florib⁹ hermetis. Jtē si fuerit sol iunct⁹ ⁊ saturnus ⁊c̄. hoc in 6°. ca°. Alkindi. ⁊ nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū est prius iō nō est vis. ⁊c̄.

Capitulū vndecimū.

Item temperātia aeris fit ex cōiunctiōe iouis ⁊ solis ⁊ hoc maxime cū cōiūctio illa fuerit in signis aeris. Jtē ex cōiunctione solis ⁊ martis in signo bicorpeo ⁊ tpe veris fit tenebrositas aeris ⁊ infirmitates frequenter cōtingūt. Jtē estiuo tpe cū sol in termino martis fit estus i hyemali siccitas ⁊ paucitas pluuiarū. Jtē cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū marte estiuo tpe in signis aquilonarib⁹ certissime pōt p̄dici q⁹ nubes ⁊ scintillatiōes ⁊ tonitrua fient in aere: ita etiā ut p̄iculū sit boibus futurū ꝓpter aeris pestilentiā ex nimiā corruscatiōe futura. Jtē tēperantia aeris ⁊c̄. hoc in florib⁹ hermetis. Jtē cum iupiter ⁊c̄. hoc Albertus in fine capituli de tonitruis ⁊ pōt notari causa si placet ⁊c̄.

Capitulū. 12.

Item martis ⁊ veneris sub scorpione cōuentus pluuiam facit. Jtem venus in scorpione existens a marte respecta ꝓpter maria que scorpio habet pluuiarū: si vō martis caret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriuz erit vbertas. Jtem martis ⁊ veneris ⁊c̄. Jtem venus in scorpione hoc in libello qui incipit Cū multa ⁊c̄.

Capitulū. 13.

Item scias loca applicationis mercurij cū tribus superioribus ⁊ cū quo applicaī ⁊ a quo sepatus fuerit. Si cum saturno erit ventus fortis cum tenebra magna ⁊ puluere. Si cum ioue significat ventū mitē absq; pluuia. Si cum marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum corruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā ⁊ erit forte grando in ea paruus ⁊.q. solis pluuie nō residēt in ea. Jtem qñ mercurius applicuerit cuz marte erit pluuia interpallata ⁊ ventus ⁊ fulgur. Et qñ venus cum ioue erit pluuia larga ⁊ descendet ⁊ ꝓficiet. Qñ luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars conculcans aliā. Qñ cum marte: nubes interscissas ⁊ gelu ⁊ fulgura ⁊ forte apparebit arcus nec erit pluuia cōmunis. Qñ vō luna cum venere ⁊ ioue: erūt nubes ⁊ ros multe vtilitatis. Qñ vō cū mercurio: erut nubes pallide colores fumosi ⁊ ventus bonus cū pluuia. Jtem scias loca ⁊c̄. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte ꝛc̄. hoc Alkindus octauo capitulo ꝛc̄.

Sequit̄ sexta pars de hora pluuie ꝛ vbi ꝛ qñ fortior aut debilior ꝛ que sint loca apta ad hoc ꝛ de duratione eiusdem. Capitulū primū.

Cum planete erunt in sūmo ad significatio/nem sup pluuiā ꝛ luna sil̄iter i loco significationis ꝛ applicationis gradu ad gradū de centris a sole ꝛ planetis cū a scēdentibus climatū: ꝛ erit ascendēs supra horizontē aliquorū illud ē signū hore pluuie in loco vbi sic ascendit. Et fortior significatio ē illi cui firmat luna illa hora i angulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis significatorib⁹ in eqdistante equatori diei etiā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizonte q⁹ p horizontē fiat illa hora abscisio supra punctū qđ ascendebat cū luna in signorū circulo etiā vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit̄ res ꝛ qñ fuerit aliquis signatorū in angulo terre aut orientali aut occidentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiā humores q̄diu sol ꝛ luna ꝛ signatores fuerint applicati pars eor̄ parti. Et etiā res fm numerū planetarū ad angulos illi⁹ terre tūc qñ ceciderit sol ꝛ luna ꝛ planete pars eorū a parte de gradib⁹ applicationū q̄uis planete sol ꝛ luna manserint in angulis: nō erit aliqs vbi applicuerint ad inuicē ꝛ cū hoc fuerit eorū pluuialis dignior est significatio cū fuerit applicatio grad⁹ cum gradu ꝛ vnus planetarū ad angulos nō erūt vires ita fortes ſz minuet̄ multū nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa ꝛc̄. Cū fuerit sol i hora p̄cipij significationū in medio celi debilitabit̄ ꝛ minuet̄. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior ꝛ qñ depressa durabit humiditas donec compleant̄ nature ꝛ abscindant̄ planete a centris planetis: cū fuerit in hora applicationis cū gradu planete ꝛ luna cadentes ab angulis horizōti aliquorum debilitabit̄ significatio apud eos ꝛ tūc erunt nubes cum fuerit sol in horizonte orientis ꝛ luna ꝛ planete significatores in horizonte occidentis ꝛ in angulo est signum pluuiarum ꝛ horarū suarum.

BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE

Item cū fuerit sol in horizonte occidentis ⁊ luna in horizonte orientis ⁊ aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuie. Scias debiles significationes nō significat in littorib⁹ maris ꝓpter multā depressionē nisi rores ⁊ nubes: ſz significant in locis electis ⁊ erit pluuia cū fuerit sol ⁊ luna ⁊ planete pars cū parte i centris pluuialib⁹ p̄dictis in horis applicatiōis gradus cuz gradu ⁊ qñ fuerit aliquis planeta ⁊ signatores in aliquo angulox si sol tūc fuerit super zenith capitū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuialis in aliquo loco ⁊ nō fit i alio tñ locus a quo ventus venerit supra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer eni soluit partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete ⁊c̄. hoc Alkind⁹ cap'o quinto paragrapho notato ⁊c̄.

Capitulū secundū.

Cum errauerit modus ꝓphetandi. i. iudicandi cū venere ⁊ marte: ꝓpheta ⁊ iudica cū ioue ⁊ mercurio. si eni fuerit humidi aut frigidi ⁊ fuerit inter eos applicatio de cētris ⁊ de sole ⁊ luna ⁊ cōcordauerint applicatiōes ꝑs parti ⁊ hora tpis de. 4°. 7°. 3°. ⁊ sextili aut cōiunctione illa est hora p luuie ⁊ de debilitate ⁊ fortitudine ⁊ loco ꝑ retrogradationē pausationē applicationē ⁊c̄. iudicabis sicut dictū est de venere ⁊ marte nisi ꝙ minus significāt q̄z mars ⁊ ven⁹ ⁊c̄. Similiter aspice saturnum ⁊ solē si fuerint humidi calidi aut frigidi humidi ⁊ iudica ꝑ applicationes ⁊c̄. sicut feciſti cū ioue ⁊ mercurio ſz remissius significant q̄z venus ⁊ mars iupiter ⁊ mercurius ⁊ significatio fortior est cū vni significationi addunt̄ alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco ⁊ similiter. 4°. 5°. 6°. 7°. nā nūq̄z fallit vsq̄z ad septem ⁊ sūt vires sue ꝑm elongationē loci ab equatore diei. scias ꝙ in locis in quib⁹ sūt aque fortior significationū forte te decipit in estate aut media in vere: ſz i hyeme debilior nūq̄z fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam ſz in tpe generationis nō mentiet̄ quicq̄z. Scias ꝙ signū rerū ⁊ pluuiarū est qđ sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuialis ⁊ illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis qz mutat̄ temp⁹ de natura ad naturā. si eni fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta ꝙ fiat ad illud tempus. Cū errauerit ⁊c̄. hoc vbi supra cōsequentis ⁊ dependet hec ꝓpositio ex illa precedente. Si vis scire vim ⁊ debilitatem ⁊c̄.

Capitulū tertiū.

De illa ⁊ hora pluet cum luna in cardine ⁊ in aqueo applicat veneri ⁊ mercurio ⁊ durat q̄diu durat applicatio. Die illa ⁊c̄.

¶ Item cū fuerit luna applicās alicui planete aut ipsa separata

ꝛ fuerit eoꝝ latitudo eqnoctialis:eadē die luna faciet opꝰ illiꝰ plāete. Cū fuerit luna in aliq̄ angulo ꝝ hemiſperij ꝛ planeta in ipſo linee anguli eq diſtans cū luna:aut in aliq̄ angulo eiuſdē hemiſperij faciet opꝰ illiꝰ planete. Cū fuerit luna in oppoſitiōe alteriꝰ planete etiā fuerit eoꝝ latitudines ab ecliptica in diuerſis ptibꝰ eq̄les uel fere: luna faciet opꝰ eius. Cū oꝛiť luna aut occidit ſeu aliū angulū intrat ꝛ aliꝰ planeta ſibi illū angulū attigerit ꝓpter varias latitudies licet etiā ſint diſtūcti p gradꝰ eq̄les tñ faciet opꝰ illiꝰ planete. Ite cū fuerit luna applicās ꝛc̄. hoc in aliquo antiquo auctoꝛe inueni: ſꝫ hoc a magiſtro meo habui ꝛc̄.

Septima ps de mutatiōe aeris que ē p ſignalia ſupioꝛa q̄ p metheauroꝝ ſniam hñt cognoſci. Et quedā alia ſignalia vulgariť appꝛobata.

Capitulū primū De coloꝛis circa eclypſim ſignificatione.

I coloꝛ lumiariū hoꝛa eclypſis uel apparēs circa luiaria fuerit niger uel tendēs aliq̄liť ad viridez ſigt ea q̄ ſūt de nā ſaturni. Sꝫ albū parū tendens ad croceū iouis. Si tenderit verſus vermiliū clarū martȝ. Si croceus tendēs ad coloꝛē aureū: ſplendidū veneꝛ. Si vo coloꝛes diuerſi fuerint mercurij. In oibꝰ aliſs ſigtionibꝰ p coloꝛes hoc mō iudicabis. Et hoc ē magnū iuuamētū ꝛ cognoſcendū planetā dñantē: ꝛ ſi in toto coꝛpe lunaris eclypſati aut in oībꝰ ptibꝰ q̄ ſunt circa appuerit coloꝛ ſignū ē ꝙ accidēs ab eclypſi erit i maioꝛi pte regionū cū accidente cōcoꝛdantiū: ſi vo verſꝰ illā ptē accidēs erit i regionibꝰ cū aſcendēte cōcoꝛdantibꝰ q̄ ſūt verſꝰ illā ptē. Si coloꝛ luiariū hoꝛa eclypſis ꝛc̄. hoc extrahiť a Ptolemeo : haly in. 9ō. caꝰ. 2ᵉ ptis q̄driptiti ꝛc̄.

Capitulū ſecundū De comete ſignificatiōe vbi ꝛ qñ

Ite p cometas fiūt iudicia vnde accidēs erit i regionibꝰ cōcoꝛdātibꝰ cū ſigno in q̄ appuerit ꝛ in cuiꝰ ſigni directo extiterit ꝛ p coloꝛē eiꝰ ꝛ formā ſcies cū q̄ planeta cōcoꝛdauerit p quē ſcies q̄litatē accidētis ꝛ ſm q̄litatis vtutis planete dñantis ibi erit virtꝰ accidētis. Tēpus etiā duratiōis ſignalis coꝛꝛūdet duratiōi accidentis: ꝛ ſm haly aſpice ad hoꝛas q̄ ſūt int̄ ſignale ꝛ aſcēdēs ſicut fit in eclypſibꝰ ꝛ erit cito uel tarde ſm cōpationē eiꝰ ad ſolē. vnde ſi i mane matutinali apparuerit erit cito. Si i veſpe erit tarde ꝛ generaliť facias ſicut i eclypſibꝰ. Ite p cometas ꝛc̄. hoc ab eiſdē ibi ſupꝛa.

Capitulū tertiū.

ITem aſpice ad ſignalia apparentia circa ſolē cū oriť p ſciendo illa q̄ accidūt de die: uel dū accidit p ſciēdo illa q̄ accidūt de nocte: ⁊ p ſciendo ea q̄ multū durāt. Inſpice in horis quib⁹ ſol hz ꝓticipationē cū luna de figura q̄ q̄libet figura mōſtrat ut plurimū ſtatū q erit ab ipſa hora vſq; ad horā q̄ luna ſe ponat in figura p⁹ modū veniēte. Itē aſpice ⁊c. hoc ex. 13°. ca°. 2°. ꝓtis quadriptiti ⁊c.

Capitulū quartū De ꝓnoſticatiōe aure p arcū uel angulū ſolis.

QUm ſol oriť uel occidit clarus limpid⁹ ſine nubib⁹ uel alia re ipſū coopiente figt ſerenū diē: ſi ⁊ circul⁹ ei⁹ fuerit diuerſorū colorū uel trabēs ad vermiliū ſicut ignis: aut q̄ ſint radij venientes a ſole uel q̄ ſūt circa eū de vermilio: aut q̄ ſint nubes q̄ dicte ſūt ſoles ab vna ꝓte ei⁹ ⁊ aſſimilent colori nubis tendētis ad vermiliū ⁊ fuerint radij ſolis extenſi ⁊ longi figūt ventos fortes ⁊ mouebunt a ꝓte q̄ ipſa ſignalia apparebūt. Si vo ſol niger aſcēdit uel q̄ tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ ꝓtib⁹ nubes q̄ dicte ſūt ſoles uel radij qui de ſole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem figūbit aerē hyemalē ⁊ pluuias. Itē ſol pur⁹ oriēs atq; nō feruēs ſerenū diē uūciat: pallid⁹ grandinē. Si vo occidit p̄die ſeren⁹ ⁊ oriť tantus certior fides erit ſerenitatis. Itē ſol cōcau⁹ oriens pluuias p̄dicit. Idez ventos cū aūt exorientē eū nubes rubeſcūt q̄ ſi etiā nigre rubentib⁹ interuenerint ⁊ puluias. Itē ſi oriētis aut occidētis radij videnť coire pluuias ⁊ ſi cirra occidentē rubeſcūt ambos ſerenitatē futuri diei ſpondēt. Si vo in exortu ſpargenť ꝓtim ad auſtrū ⁊ ꝓtim ad aglonē licz ſit pura circa eū ſerenitas tñ pluuias cū vento figūt. Et ſi in ortu aut in occaſu otracti curuanť radij imbres mōſtranť. Itē ſi in occaſu ei⁹ pluat aut radij in ſe nubes trabūt aſperā in ꝓtimū diē tempeſtatē figūt. Luz in oriente radij nō illuſtres eminebūt q̄ circa circūdati nō ſint: pluuiaz ꝓtendit. Si aūt exortū nubes globanť hyemē aſperā denūciabunt ſi ab ortu repellunť ⁊ ad occaſū adhibēt ſerenitatē. Si nubes ſolari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpeſtas erit. Si vo etiā duplex orbis fuerit contractior q̄ ſi hoc in ortu uel in occaſu ita ut rubeſcūt nubes maxima oſtēdeť tēpeſtas ⁊ ſi non ambiūt ſz incūbant a q̄cūq; vento fuerit eū ꝓtendunt. Si aūt a meridie imbrē. Si oriens tingiť orbe ex qua ꝓte roſe ruperit vent⁹ expecteť ſi totus defluxerit equaliť ſerenitatē dabit. Itez ſi in ortu longe radius p nubes porrigeť ⁊ medius inanis erit pluuias figt. Si ante ortuz radij ſe oſtendāt aquā ⁊ ventū: ſi

circa occidens candidus circulus erit nocti leuẽ tempestatẽ. Si nebula vehementiorẽ. Si candente sole ventũ. Si autẽ circulus erit ex qua regione ruperit se figt magnũ ventũ. Item sol in ortu suo maculosus uel sub nube latens pluuiã ꝑsagit. Et si palleat tẽpestuosũ denũciat diẽ. Si cõcauus videt ita ut in medio fulgens radios ad austrũ ꝛ aglonẽ emittat tempestatẽ humidã ꝛ ventosaz ꝑnũciant. Si pallidus in nigras nubes ad aglonẽ accidat ventũ ꝑsagit. Sero rubens desigt mane serenuz. Si mane imbres denũciat ab aglone fulgur tonitruũ ꝓtendit ꝛc̃. Cũ sol oriĩ ꝛc̃. hoc vbi supra. ¶ Notandũ ſm haly sup illo verbo figt serenum hoc est qr hoc ostẽdit qꝺ est oĩ fumositati limpidꝫ. Itẽ color diuersus in circulo solis est mercurialis ꝛ color tendẽs ad vermiliuz ignis cũ fuerit radij veniẽtes a sole uel q circũ fuerint ẽ mercurialis. Itẽ nubes q̃ dicũtur soles sũt q̃ reuerberãt radios solis ꝛ qñ tendũt ad vermiliũ sunt etiã fumi de natura martis. Silit̃er etiã radij longi extensi monstrant sũmũ siccũ ꝛ ꝓpter hoc signt oĩa ista ventos fortes a ꝑte in q̃ apparuerint. Itẽ nigredo ꝛ viriditas qꝺ fumositas ẽ de natura saturni. Itẽ nota qꝺ tota significatio signaliũ ẽ certa si cõcordauerint cũ figuris ꝑmis luminariũ q̃ tales habeãt significatiões ꝛ ꝑ oĩa sic intelliges. Itẽ Alkindꝰ fere idẽ in fine capl̃i qnti. Itẽ ⊙ purꝰ ꝛc̃. hoc extrahit̃ a quodaz libro qui incipit De tempestiua q est de tempestatũ ꝑsagijs vsq; ad istã partẽ. Item sol i ortu ꝛc̃. hoc in quodã extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

Capitulũ quintum

Item aspice ad locum lune die tertia ante cõiunctionem uel oppositionem: ꝛ die tertia anteq; sit dimidiata i luce uel tertia die post has horas ꝛ clare fuerit ꝛ circũ se nõ tennerint rem aliquã demõstrat serenũ ꝛ si subtilis vermilia ꝛ qõ remanet de suo circulo siue luce fit clarũ assimilando qꝺ moueat̃ significat motũ ventoꝝ a parte qua declinat ꝛ si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerẽ hyemalem ꝛ pluuias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatiue destruat̃ significat aeris claritatem ꝛ si fuerint duo uel tres significãt aerem hyemalẽ. Et si tenderit ad vermiliũ fumum ꝛ sit intercisus significat aerem hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat etiam aerẽ hyemalem cum grandine minuto. tendens vo ad viridez cũ nigro ꝛ fuerit intercisus significat etiã aerem hyemalem ꝛ quanto plures fuerint circuli ſm hoc res quas dixim⁹ erunt multe. ¶ Itẽ luna q̃rta maxime obseruat egyptꝰ. Si suspendẽs exorta puro nitore fulserit serenitatẽ. Si rubicũda ventos: si nigra pluuias ꝓtendit. In. 15. cornua eiꝰ

obtusa pluuia erecta ⁊ infesta ventos sp signāt q̄rtā cū maxie cornu eiꝰ acuminatū septētrionalē atq; rigidū illū p̄sagit vētū: inferiꝰ austrū vtraq; recta noctē ventosā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat ⁊ vētos ⁊ imbres p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̄rta die luna erit directa magnā tempestatē p̄sagit i mari nō coronā circa se habeat ⁊ eā sincerā qñ illo mō ⁊ nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Jtē si in plenilunio p dimidiū pura erit dies serenos sig̃bit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maiorē tempestatē ⁊ maiorē ventū. Si tres aut magis intrupti aut distracti nascēs luna si cornu supiori abstracto surget: pluuias decrescens dabit Si inferiore aut pleniluniū si i media illa nigrina fuerit imbrē in plenilunio. Jtē si plena circa se habebit orbē ex q̄ pte maxie splendebit ex ea ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē. Si añ q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit Si. 6ª vehementiꝰ ⁊ flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt etiā ipsiꝰ lune. 8. articuli quotiēs in angulos solis incidat plerisq; intrat eos tm̄ obseruātibꝰ p̄sagia eiꝰ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. ⁊ interluniū ⁊c̄. Jtē aspice ad locū ⁊c̄. hoc ex. 13º ca. 2ª ptis q̄dripartiti Ptolemei. ¶ Sciendū q̄ qñ circulꝰ solis ⁊c̄. monstrāt q̄ fumositas ē ⁊ ppter hoc sig̃t serenū Jtē intersio mōstrat motū ipsiꝰ fluuiꝰ iō si g̃t vētos. Alkindꝰ fere idē dicit in fine q̄nti ca' ⁊c̄. Jtē lunā q̄rtā ⁊c̄. hoc i libro tēpestatū p̄sagijs vsq; ad illā p̄tem Considera colores ⁊c̄. Capitulū sextū.

YTem cōsidera colores circuloꝝ q̄ sūt circa planetas ⁊ stellas fixas lucētes ⁊ fm hoc sicut priꝰ iudica. Jnspice etiā ad stellas fixas specialiē ad illas q̄ multū adiūctate vna circa aliā magnitudinē ⁊ colores: vnde si apparuerint maiores ⁊ maioris lucis q̄z sole ⁊ sig̃nt cursū ventoꝝ a qua cūq; pte fuerint. Jtē nebulose ꝓprie sicut stella q̄ dicta ē p̄sepe ⁊ alie tales si assimilabunt coopte in tpe sereno q̄ vix appareāt uel q̄ sint spissi sig̃nt multas aquas. Jtē cōsidera ⁊c̄. hoc ex 13º ca. secūde ptis q̄dripartiti Ptolemei vsq; ad illā Jtē cū repēte. ¶ Sciēdū fm haly q̄ q̄libet stella trahit fumū q̄ concordat cū nā sua. qñ igit multus fumꝰ apparuit in pte alicuiꝰ eaꝝ sig̃t q̄ virtꝰ illiꝰ vincet. Jtē stelle que sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ ⁊ scorpionis. Jtē stelle nebulose de quibꝰ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Jdē fere Alkindꝰ in fine q̄nti capli ⁊c̄. Capl'm. 7. De ꝓnosticatiōe aure p stellas fixas.

ITem cū repente stellaruꝫ fulgur obscurat ut illud neq; nubila neq; caligine accidat graues signat tēpestates. Si volitarie plures stelle videbunt quo ferant albescentes ventos ex his ptibꝰ nūciabūt aut cursitabūt certos. Si illud in pluribꝰ ptibꝰ fiet in-

constanti ventos ꝛ vndici. Si vo aliquã stellã errã incluserit orbis imbꝛẽ sicut ꝛ i signo cãcri ꝛ stelle pue aselli appellate exiguũ inter illas spaciũ obtinẽtes nubeculã quã ꝑsepia appellãt hoc cũ i celo sereno apparere desierit atrox hyems sequet. Si in alterã illarũ agloniã caligo abstulerit auster zenith: si austrinã aglo. Jtẽ cũ repente ꝛc̃. hoc in libro de ꝑsagijs tẽpestatũ ꝛc̃.

Capitulũ. 8. De ꝓnosticatiõe ventox ꝑ cometas.

Item stelle comate significãt siccitatẽ ꝛ vẽtos ꝛ qd inde accidet erit �means multitudinẽ harũ rerũ. Jtẽ comete cũ eas circuit nigredo ꝛ tenebꝛe signt siccitatẽ fortẽ ꝛ ventos in qua ꝑte apparuerint ꝛ ẽ duratio ꝛm quãtitatẽ luis tenebꝛe: ꝛ si fuerit de ꝑtib⁹ oppositis signt vẽtos ꝛ pluuiã ꝛ nubis cũ tonitruis ꝛ fulgure ꝛ cũ fuerit in estate signt pluuiã. sil̃iter ꝛ i hyeme. ¶ Jtẽ cursus stellax ex vno angulo signt ventox cursũ a ꝑte illa ꝛ si cucurrerẽt ex angulis diuersis significãt vẽtos iordiatos. Et de q̃ttuor angul̃ signt diuersũ aerẽ hyemalẽ ita ꝙ pueniet ad tonitrua ꝛ lampades ꝛ sil̃ia ꝛc̃. Jtẽ stelle comate ꝛc̃. hoc a Ptolemeo ex. 13°. ca°. 2°. ꝑtis q̃driptiti. ꝛm haly comete fiũt oẽs de fumo ficco ꝛ si apparuerint nebulose signat vẽtos multos ꝛ siccitatẽ aeris ꝛm eax magnitudinẽ ꝛ durabit ꝛz eax duratiõnẽ. Jtẽ comete ꝛc̃. hoc Alkind⁹ i fine ca⁹gnti. Jtẽ cursus stellarũ ꝛc̃. hoc Ptolemeꝰ in. 13°. ca° 2°. ꝑtis q̃driptiti. ⁹Sciẽdũ ꝛm haly ꝙ anguli sicut sũt inter septẽtrionẽ ꝛ occidẽs ꝛ sic de alijs ut supra ꝛc̃.

Capiiulũ nonũ.

Tẽ celũ cũ eq̃liter splendidũ erit tũc i articulis tẽpox que ꝓposuim⁹ autũnũ serenũ ꝑsagabit frigidus. Jtem si ver ꝛ estas nõ sine refrigerio aliq̃ trãsierit in autũnũ serenũ ac densũ minusq; ventosũ faciẽt. autũni vo serenitatẽ vento sam hyemẽ facit. Jtẽ celũ ꝛc̃. hoc in libro de ꝑsagijs Autũnũ serenũ ꝛc̃. Jtẽ si ver ꝛc̃. hoc ibi supra.

Capitulũ decimũ De ꝓnosticatione ventox ꝑ tonitrua.

Tem si i signis hyemalib⁹ audiant tonitrua sicut in capricorno uel aquario tũc i initio veris ꝛ forte ꝑ totũ annũ plus vẽtabit q̃s in alio ãno. ¶ Jtẽ cũ in estate vehementi⁹ tonitruit q̃s fulgurat ventos ex ea ꝑte denũciat ꝛ eꝯ si min⁹ tonuerit q̃s fulgurat imbꝛẽ cũ sereno celo fulgura erũt ꝛ tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si ex oib⁹ q̃ttuor ꝑtib⁹ celi fulgurabit cũ aglone tm̃ in posterũ diẽ aquã ꝓtẽdit cũ a septẽtrione ventũ cũ ifestiuo tpe ab austro choro ul̃ fanonio serena fulgurauerit ventũ ꝛ imbꝛẽ eisdẽ ꝛgionib⁹ demõstrat. Jtẽ tonitrua matutina ventũ signt imbꝛẽ meridianã. Jtẽ si in signis hyemalib⁹ ꝛc̃. Albert⁹ in cõpendio suo g incipit Passiões ꝛc̃. in ca°. Deinceps i fine

Jtē cū in estate vehementi⁹ ꝛc. hoc in libro de ꝑsagijs tēpestatū vsq; huc
Jtē fm ꝓnosticationē ꝛc. Caplm. 11. De diuersitate nubiū qd signt.

Tem cū nubes celo sereno in celū ferūt ex q̄cūq; ꝑte illud fiet venti expectent̄ si in eodē loco globabunt̄ appropinquante sole discutient̄ ꝛ hoc aglone fiet vent⁹. Sz austro imbres ꝑtendūt sole occidēte si ex vtraq; ꝑte ei⁹ celū petēt tēpestatē sig̃būt vehementi⁹ arcu ab oriēte in nocte aquaminat̄ ab occidēte in posterū diē. Si nubes ꝛ vellera lane spargunt̄ multo ab oriēte aquā in triduū ꝑsagiūt: cū in cacuminibus montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint asseuerabit. Jtē nube grauida candidante ꝙ vocāt albā grando imminebit celo q̄uis sereno nubila q̄uis pua ꝓcellosū dabit: nebule aut mōtibus descendētes aut celo cadētes uel in vallib⁹ sedētes serenitatē ꝓmittūt. Jtē cū nubes celo sereno ꝛc. hoc etiā ibi supra. Sciendū fm Ptolemeū in. 13°. ca°. 2°. ꝑtis q̄driptiti ꝙ nubes q̄ assimilant̄ floccis lane significant aliqñ aerē hyemalē.

Capitulū duodecimū.

Tem fm ꝓnosticationē rusticoꝝ qñ in hyeme remittit frig⁹ expectant̄ niues nisi sūt nubes obscure. Aliud aūt signū ē ꝛ verius vapor niuis future lucid⁹ est ꝛ pallid⁹ ꝛ videt̄ mult⁹ ꝛ hoc est signū caritatis sue. Jtē qñq; stat in aere diu sicut ꝙ. 8. dies ꝛ hoc est signū caloris. Jtē fm ꝓnosticationē ꝛc. hoc fm Albertū ca°. illo Nix autē ꝛc. Caplm. 13. De ꝓnosticatiōe ventoꝝ ꝙ diuersa signalia vulgi.

Tem tēpestuosa pluuia ꝙ est i vento ꝓcedente. Jtē venti fortes fiūt ꝓcipue in autūnis. Jtē tēpus flati aglonis plus i vere ꝛ minus in autūno. Jtē incensū frig⁹ ꝛ imensus calor sūt cā abscisionis ventoꝝ ꝛ pluuia sequēs est etiā causa abscisiōis eorū ꝛ hoc est fm qd. Jtē añ tonitrua sunt venti validi ꝛ fortes. Jtē tēpestuosa pluuia ꝛc. hoc Albert⁹ in ca°. qō incipit Jn vtriscq; aut ꝛc. Jtē hoc supius scribebat̄. s. cū ventis ꝛ si placet fit vacuatio ventoꝝ fm Albertū in ca°. Dico aūt ventos. Jtē intensū frig⁹ ꝛc. Albert⁹ in ca°. Dico aūt ventos. Jtē ante tonitrua ꝛc. Albert⁹ ca°. Deinceps nr̄a ꝛc. Ca. 14. De grādinis figtiōe.

Quando i vere uel autūno grando de celo ceciderit: tunc piculū iminet frugib⁹ dire gelideq; pruine ꝛ hoc raro fallit nisi sol p⁹ grandinē calidior aerē terramq; lustrauerit: grādo si media estate ceciderit circa solstitiuz estiuale signū est in supiori aeris regiōe frig⁹ esse ꝙ maximū. Pars inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Jtē qñ in vere ꝛc. Albertus in ca°. grandines ꝛc. Caplm. 15. De ꝓnosticatiōe

aure ꝑ circulum celi siue iridē.

Item arcus i diuersis tpib⁹ diuersa sig̃t in meridiē eni ortus magnā vim aquax mōstrat. Si vo circa occasū fuserit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexerit ꝓmittit serenitatē. Itē arcus si apparuerit cū aere hyemali signat serenū ⁊ eō. Et colores etiā ꝺsiderādi sūt sicut dictū ē pri⁹. Itē arc⁹ duplices pluuias nunciāt a pluuijs serenitatē. Itē arcus in diuersis tpib⁹ ⁊c̄. Albert⁹ in ca° Restat vidē causas ⁊c̄. Itē arcus si apparuerit. hoc Ptoleme⁹ in vltimo ca° 2° ptis q̄dripliti. ¶ Sciendū ſm baly ꝙ cā bui⁹ est qz in tpe sereno mōstrat additamentū fumositatis aquose: ⁊ in hyemalib⁹ sig̃t minutionez ⁊ ꝓpter hoc sig̃t serenū. Item arcus duplices ⁊c̄.

Capl'm. 16. Pronosticatio aure ꝑ colores nubiū.

Item q̄drupler est nubes ꝺtinēs ut frequenter forte tonitruū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantuluz nigra ⁊ spissa dat forte tonitruū specialit̄ si vapor intrinsecus fit mult⁹ ⁊ spissus. rubescēs aūt ex nigro ē nubes valde spissa de se sz vapor ignit⁹ iā resultat ꝑ ipsā ⁊ iō illa fortiorē frequēter dat ictū q̄z nigra: virēs aūt cū nigro ⁊ rubore quo est pessima oīuz nubiū ⁊ timēda si directe fit circa ciuitatē aliquā ⁊ sig̃t ꝙ frequēter emittit fulmina magnox lapidū ꝙ deijciūt turres ⁊ edificia incendūt ⁊ boies. Albā aūt nō oz timere si enī fulmina cadāt sup edificia statim extinguūt̄ añq̄z tangant ea nisi sint valde ficca ⁊ cremabilia. Itē colores corruscatiōis ut plurimū sūt videlicet rube⁹ clar⁹ ⁊ albus flā meus ⁊ ruffus q̄ niuosus. prim⁹ timend⁹ qz incedit. 2⁹ spargit se ⁊ nō ledit nisi facile cremabilia. 3⁹ autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit sil' ⁊ incēdit. Itē q̄drupler ⁊c̄. Albert⁹ in ca°. Deinceps. Item colores ⁊c̄.

ipse idem. Capitulū. 17.

Item signa antecedētia terremotū sūt frig⁹ ex vapore frigido ⁊ sonus ex motu subterraneo. sequētia aūt sunt caligo ⁊ tenebre circa solē ⁊ stellas ꝑter dispositionē nubiū. Itē signa ⁊c̄. Albertus in ca° terremot⁹ in fine. Capl'm. 18. De ꝓnosticatiōe aure ex igne.

Item ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequūtur pluuie. Iā luceri⁹ fungi si flexu sese volitet flāma ventū ⁊ lumina cū sese flāmas elidūt aut vix accendit̄. Itē cū pendēte scintille coeternant̄ uel cū tollentib⁹ ollas carbo adheret aut cū cōtent⁹ est fauillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concrescit ⁊ carbo vehement̄ plucet ventox ⁊ aquax ē sig̃tio. Itē ignes ⁊c̄. hoc totū in libro de ꝑsagijs ⁊c̄. Capl'm. 19. De ꝓnosticatiōe aure ex mare.

Té mare si trãquillũ i portu cursitabit murmurabitve int seven tũ pdicit si illud in hyeme imbrẽ littoraqz ripe resonabũt tranquille asperã tẽpestatẽ. Itẽ ipsi⁹ marj trãquill⁹ sonit⁹ spume dispersо aut aq̃ bullãtes pulmões re marini in pelago plurimorũ dierũ hyemẽ ptendũt sepez filẽtio intumescit inflatũqz alteri⁹ solito iam intra se ventos eẽ fatet̃ z etiã quidã son⁹ montiũ nemorũqz mugit⁹ mutationes aure ptendũt arborũ siue aura q̃ sentient folia ludẽtia. Lanugo ppli aut spine volitãs aquisqz pluuie inatantes aut in cãpanis venturã tẽpestatẽ pcedẽs suus fragor celi z murmur nõ dubiã significationẽ bñt. Itẽ mare zc. in eodẽ libro pſagijs zc. Lapĺm. 20.

Tem delphin trãquillo luligo volitãs conche adherẽtes echini astringẽtes sese aut aerena subintrãtes tẽpestatis sũt signa. Rane q̃z vltra sonitũ vocale z fulices matutino clangore. Itẽ mergia anates q̃z pluuias rostro purgãtes ventũ. Ceteraqz aquatice aues cõcursãtes: grues i mediterraneo festinãtes mergiqz uel camꝑma ria aut stagna fugiẽtes: grues filẽtio p̄ sublime volantes serenitatẽ sicut noctua in imbre garrula uel sereno tẽpestatẽ: coruiqz singultu quodam latrtanes seseqz etiam cõcutientes si cõtumabũt. Si vo carptim vocem resoluebãt ventosũ imbrẽ: gratuli sero a pabulo hyeme z albe aues cõgratulant̃: z cũ terrestres volucres cõtra aquã clangorẽ dabũt pfũdẽtes sese hyemẽ ꝫz maxime cornix z hyrũdo cũ iuxta aq̃s volitãt ut pẽna sepe pcutiant quecũqz in arborib⁹ habitãj fugitãs in nidis suis z anseres cõtinuo clangore intẽpestini idẽ. Ardea in medijs arenis tristis: nec mirũ, aquaticos volucres intantũ p̄sagia sentire aeris z aque cum sint fere eiusdẽ complexionis. Item Delphin zc. vbi supra zc.

¶ Item pecora exultantia z indecora lasciuia ludẽtia easdẽ significationes bñt: echones celũ olefecrantes seqz lambẽtes contra pilũ turpes quoqz porci Alcenos sibi manipulos feni laterãtes segniterne etiã circa industriã ab aut formice cõcursantes aut ouapferẽtes.

Itẽ vermes terreni erũpentes trifoliũ inborrescere z foliũ contra tẽpestatem subrigere certũ est: necnõ in cibis z mensis nostris vasa quedaz extulentiũ addit̃ sudorẽ sup positorijs relinquẽtia duras tẽpestates p̄nũciant. Itẽ cũ sole z cordis z ptib⁹ corpis multis in sensib⁹ infinita p̄sagia apparebũi. Itẽ pecora zc. In eodem libro vsqz ad finẽ.

Repertoriũ de mutatione aeris Finit.

Hyppocratis libellus de medicorũ astrologia incipit:
a Petro de abbano in latinũ traductus.

Cum legerē libros hyppocratis medicoꝝ optimi: iueni hūc puū ſz magne vtilitat] librū: ⁊ valde neceſſe ē oīb⁹ medicis. Qui hūc bñ ſcierit ſanitatē mortē uel vitā ifirmitat] poterit ꝓnūciare. Jubet ꝯ hyppocras ut medic⁹ aſpiciat lunā qꝛ qñ plena eſt laīe: tūc creſcit ſanguis in boie ⁊ i oib⁹ aīalib⁹: ⁊ i mari ⁊ in cūctis reb⁹ mūdanis eoꝝ creſcit cōplexio. Qñ igit infirm⁹ occūbit oz lunā iſpicē. Nā ſi exeat a ↄiūctiōe tūc creſcit egritudo q̄uſq; veniat ad graduz oppoſitiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide ſi ſit cū mal' planet]: aut i loco malo. aut ſi aſpexerit dñm dom⁹ mortis: ⁊ ꝑ hoc poteris ſcire ſi ifirm⁹ mori debeat uel nō: uel ſi hēbit magnā ifirmitatē uel curā. Signū arietis.

Nunc videam⁹ nām oīuz ſignoꝝ iuxta principiū lune. Cū cuiq; infirmitas accidat: ⁊ luna ſit i ariete cū ♂ aut cū ſole erit egritudo i capite ꝑpter nimiā caliditatē ☉. Et dolebit ei⁹ pulſ⁹ capitis. Habebit q̄z febres calidas: ⁊ nō recedet ab eo caliditas. Patiet q̄z anxietatē: ⁊ vix loquet. In pectore q̄z patiet nimiuz calorē: ⁊ dolorē patiet i pulmōe: ⁊ hēbit vehemētiſſimū pulſū. Neceſſe erit ei minuere ſanguinē de vena cordis: ⁊ vti reb⁹ frigidis: ⁊ cibo ⁊ potu minuētib⁹ calorē: ⁊ hec egritudo deueniet i freneſi. Et ſi in eo fuerit ſaturn⁹ aut ♂ morietꝛ ex hac egritudie infra tres dies a die q̄ fuerit. ☽. cū. ☉. ꝑ q̄rtū aſpectū: ⁊ plus ē ⁊ hoc ſi. ☽. addat ſuo lumini. Si. ☽. fuerit in ariete ⁊ eā aſpexerit ifortuna ex. 4⁹ uł oppōe. Si fuerit ſol erit hec egritudo i capite: ⁊ iſta egritudo ducet eū extra vitatē ⁊ inſaniet: ⁊ nūc creſcit: nūc minuit egritudo. Et ē filis illi q vidē nō pōt. Qui aūt neſcit aſtronomiā nō poterit ſcire ei⁹ egritudinē. Et ſi fuerit i diminutiōe ſui luis: aut i diminutiōe graduū qñ reuertit ad primū aſpectū ſaturni qñ eū dimiſit ⁊ ꝑ aliū aſpectū eū aſpexerit terminat ifirmitas ſiue i bono ſiue i malo. Qđ ſi aſpexerit infortunā morietꝛ. Nota ꝙ. ☽. ⁊ dñs aſcendētis fortiſſime opant: ⁊ iō ſp qđ ꝑmo aſpiciat a iudicib⁹ ⁊ loc⁹ ☽. ⁊ aſpect⁹ ei⁹: deiñ dñs aſcēdēt]: Sz meliorabit ſi non aſpexerit. Et qñ iuenit. ♄. aut. ♀. ꝑ aliquē aſpectū añq; veniat ad ↄiūctionē: erit infirmitas ex aliq̄ flegmate albo: q̄ infirm⁹ primo ſentit grauedinē. Si. ☽. fuerit addēs ſuo lumini ⁊ gradib⁹ ⁊ fuerit ſol ⁊. ♂. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: ⁊ exiet ſanguis de narib⁹: ⁊ oportebit eū vti frigidis ⁊ erit ei op⁹ facē medicinā vnde apoſtema matureť. Et ſi fuerit. ☽. cū. ♀. i loco. ☉. euadet infirm⁹ ſz pri⁹ habebit magnū piculū: iō mercuri⁹ ↄcordat ſe cū. ♂. in vno negocio: ſz mās nō facit ſic cū ſaturno. ⁊ morietꝛ cū ſaturn⁹ erit in loco. ☉. Si fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuri⁹ uel. ♀. hēbit infirmitatē diuerſā Si aūt aſpexerit eū. ☉. uel. ♂. in aliq̄ aſpectu op⁹ eſt ut des ei aliquam

leuē medicinā ꝛ leuē dietā:ꝛ qñqꝫ ſedeat qñqꝫ ſe moueat ꝛ ꝟoluat: ꝛ fac eū ſedere i aliq̄ loco ꝟbi poſſit ꝑ totū ꝟidē ꝛ balneo ꝟtaſ: ꝛ ſedeat plane ꝟbiqꝫ ꝛ ſicut ꝟelit: ꝛ da ei aquā bibere frigidā. Tauri.

QUm incidit ifirmitas ꝛ. ☽ .ſit i tauro ꝛ aſpiciat eā. ♂ ex.4°.iſta infirmitas ē ex ſanguīe: ꝛ ſentit calorē ꝛ ſiccitatē ꝛ dolorē i nocte: ꝛ nō pōt dormire ꝛ hꝫ volūtatē bibendi vinū ꝛ res calidas Neceſſariū eſt ei minuere ſanguinē: ꝛ dare medicinā q̄ reddat eū frigidū ꝛ humidū. Sꝫ ſi fuerit i ipſo ſaturn⁹cū. ☽ .aut venerit ad eum ꝛ nō iuenerit fortunā morietꝫ vſqꝫ ad decem dies qñ cepit eū ifirmitas: Primo ſi fuerit. ☽ .addēs ſui luie ꝛ gradib⁹: ꝛ aſperſerit eā. ♂ .ex.7°.ul'. 8°. ꝛ. ☽ .fuerit ad ſatnū ꝛ. ☿ .cū ea fnerit:erit infirmitas hec ex flegmate: ꝛ erit debilis eger ꝛ dirupt⁹ ꝛ vix poterit loq: ꝛ erit ſtomach⁹ indigeſtus: ꝛ nō poterit digerē cibaria ꝛ intus hēbit calorē. Et neceſſe ē ei medicina laxatiua. Et cū. ☾ .puenerit ad oppoſitū locū ifirmabitꝫ grauetꝫ ꝛ morietꝫ niſi fuerit. ☽ .fortunata: ꝛ ſic euadet vſqꝫ ad.4.dies. Qñ aligs ifirmabitꝫ ſi luna fuerit in tauro ꝛ. ♂ .ꝛ. ☉ . cū ea infirmitas erit i pectore ꝛ maxie de nocte: ꝛ erit ei lingua cōbuſta pre nimio calore quē patietꝫ in ore ꝛ ī oculis: ꝛ hēbit fluxū ventris ꝛ multū ſitiens: ꝛ erit balbutiēs. Et neceſſe ē ei medicina cōſtrictiua ꝛ ſanguis minutio: ꝛ dieta ei⁹ ſit frigida: ꝛ a calidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aſpectu ad. ☉ .ſi minuitꝫ egritudo euadet: ꝛ ſi augmentabitꝫ morietꝫ. Qñ fuerit in oppōe ſolis ſi iuenerit iouem nō morietꝫ. Et ſi eſt infortunata morietꝫ. Geminorū.

SI luna fuerit i geminis cū aligs īcipit infirmari ꝛ fuerit in.4°. aſpectu ſatni uel oppōe erit ifirmitas illa ex triſticia: uel quia amiſit de reb⁹ uel q̄ habuit nimiā cogitationez de aliq̄ negocio. Febris ,erit efimerauel putrida: ꝛ dolebit ꝑ totuz corp⁹: ꝛ patietꝫ magnū intus ꝛ in epate dolorē hēbit hec infirmitas ꝑ decē dies. Cū fuerit. ☽ .in geminis augēs numero ꝛ luie: ꝛ aſperſerit eā mars. 8°. ul' 7°. erit infirmitas febris ex colera rubea: ꝛ pulſus velox flebotometur: ꝛ dieta ei⁹ ſit frigida. Et ſi fuerit luna ipedita a ſatno ꝛ infortunata cū eo morietꝫ qñ puenerit luna ad oppoſitū loci i q̄ erat qñ incepit infirmari. Si fuerit fortunata euadet p⁹ diurturnā infirmitatē. Si aūt fuerit. ☽ .in geminis erit infirmitas ex humidate. Et ſi fuerit ſaturn⁹ cū ea erit i capite ꝛ nō minuat: ꝛ caue ne ꝟtaſ frigidis ꝛ humidis ſꝫ ꝟtaſ tpatis. Et cū puenerit. ☽ .ad oppoſitū. ☉ .ꝛ fuerit cū fortunis euadet ſi nō morietꝫ. Si aſperſerit eā fortuna ex bono aſpectu viuet: ſꝫ mutabitꝫ i aliā egritudinē ſꝫ qñ dimiſerit iſtā formā q̄ſqꝫ venerit i aliā oppoſitionē loci in q̄ erat: erit infirmitas occulta ꝛ difficilis ad cognoſcēdū donec pueniat. ☽ .ad quartū aſpectū uel oppoſitū: ꝛ ſi fuerit cū fortuna euadet ꝛ ecōuerſo. Si

aũt fuerit mars ☌. ☉ .☌. ☽ .i geminis patiet infirmitatẽ magnã ex calore ☌ lachrimabit ei⁹ vnus ocul⁹ ☌ forsan fiet frenetic⁹:☌ multũ timebit:☌ añ eũ apparebũt diuerse figure: ☌ pulsus ei⁹ vix iuenieť:☌ pulsus capitis dolebit ei. Laue igiť ne minuas eũ:☌ da ei leuẽ dietã: ☌ paruz sit in loco tpato:☌ cũ puenerit ad q̃rtũ aspectũ morieť infirm⁹ si fuerit luna in fortuna. Si aũt fortuna euadet. Laue g̃ ne des ei farmatiã sz vrať leui dieta in balneo.

Lancri

Si fuerit. ☽ .i cancro qñ alicui infirmitas accidit ☌ aspexerit eã saturn⁹ ex. 4°uel. 7°aspectu accidit ei frig⁹ post calorem sicut in exitu balnei ☌ nõ sentit dolorẽ:doletq; ei pect⁹ ☌ hẽbit tussim ☌ paruũ calorẽ. pulsus q̃z nõ iuenieť nisi mediocris: ei dolẽt lũbi:☌ opus ẽ ei medicina ad pect⁹ pũrgandũ ☌ tussim exprimendã. Si vo nõ fuerit cũ luna aliq̃ fortuna:nec aspexerit eaz fortuna donec pueniat ad. 4. aspectũ uel ad oppositũ loci in q̃ incepit ifirmitas morieť ifra. 10. dies. Si aũt aspexerit eã viuet ul' multũ grauabiť. Si aũt aspexerit eam mars ex. 4°uel opposito figt vomitũ ☌ eructationẽ ☌ malã dispositionez stomachi. Dẽt ei frigida: ☌ medicina stomachi restrictiua. Et si nõ aspexerit eã fortuna morieť añ q̃z pueniat ad q̃rtũ aspectũ. Si aũt fuerit vacua curs⁹ ifirmitas ei⁹ erit ex repletiõe ☌ ex nimio potu ex q̃ vene sũt nimis plene. hz volũtatẽ sedẽdi i altũ:☌ discoopit: ☌ loquẽtẽ vult audire: ☌ irascit cito ☌ grauiť se hz i nocte. vtať reb⁹ tpatis:qñ veniet ad oppositus euadet. Si aspexerit. ☽. fortuna. sz si nõ ☌ fuerit in aspectu marꝛ uel. ☉. absq; auxilio fortũaz recadet:☌ cadet i acutã febrẽ ☌ puls⁹ ei⁹ repieť vno mõ. In ꝓncipio eni minutio ẽ necessaria. Si aũt ad. 45. grad⁹ fuerit aspect⁹ fortunaz alleuiať:☌ eo°uel ad. 90. uel ad. 280. ☌ magis affligit eũ ifirmitas i nocte q̃z i die:☌ parũ gescit ☌ clamat ☌ anxiať. Si fuerit fortuna i oppõe euadet:☌ si ifortũa mutať i aliaz egritudinẽ ☌ recadit. Et si debet euadẽ euadet qñ. ☽ .venerit ad locũ i q̃ fuit i initio ifirmitatis. Et si fuerit tũc fortunata euadet ☌ eo°. Si aũt. ♄ .☌ satn⁹ fuerit cũ ea i. 3ª erit morbus ꝯposit⁹ ex hũoribꝰ frigidis ☌ ẽminabiť i die. 4. Si aũt. ☽ .fuerit i cãcro ☌ satn⁹ ☌ mars ☌. ♌ .fuerit cũ ea ifirmitas actiõe uel debilitate. Da ei res ꝯfortatiuas cũ puenerit ad. 4. aspectũ uel oppositũ:☌ si fuerit fortũata euadet ☌ eo°. siliť i oppõe. Sz si fuerit ifortunata tũc determinať. Et si fuerit ei fortuniũ euadet cũ. ☽ .venerit ad locũ i q̃ icepit ifirmitas.

Quum fuerit luna i leõe ☌ aspiciat eã. s. ex. 4°uel oppõ Leonis erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo:☌ malã habebit dispositionẽ stomachi. vnde nocet ☌ sentiet dolorem capitis:☌ erit calor interius fortis:☌ exterius frigiditas ☌ erit nimiũ constipatus:☌ erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit ad q̃rtũ aspectũ:☌ si nõ aspexerit eã morieť uel augmẽtabiť ifirmitas:et

si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. ☽ in leone ⁊ aspexerit eē mars i q̄rto aspectu uel oppositiōe erit infirmitas ex abūdātia sanguis ⁊ collere: ⁊ febris tertiane uel acute. Et si aspexerit eā fortuna euadet p⁹ magnā infirmitatē: ⁊ magnā fatigationē. Et male morieť q̄n puenerit ad oppositionē leonis. si'it in. 4°. aspectu. Luna vo i leone in. 4°. aspectu. ☉. uel mart] existēte. hēbit magnū calorē in pectore: ⁊ extrema ei⁹ frigescent: ⁊ hēbit dolorē capitis. Opus ē ei minutio si pōt q̄n luna ē in illo signo. Sz si in illo signo nō pōt minuere dimittat donec venerit in medietate sui luis. Unge sibi pedes vnctiōe q̄ tollat sibi frigiditatē. Si aūt. ♂. uel. ☉. fuerit cū ea in. 4°. erit infirmitas ex calore cordis: ⁊ q̄n puenerit ad. 4. aspectū si fuerit fortuna euadet: si infortuna morieť: uel recidiuabit ul' mutabiť in aliā infirmitatē. Q̄n vo. ☽. recedit de vno loco de locis q̄ dixim⁹ ⁊ in uenerit iouē i itinere aut. ☿. añq̄z veniat ad. 4. aspectū op⁹ est cōponere balneū: ⁊ i alto loco sedē. Sz si impediat eā saturn⁹ impedit renes ⁊ vesicā Si aūt fuerit mercuri⁹ in. 4°. cū illis sig̃t turbationē sensus ⁊ infirmitatez aie. Cū puenerit. ☽. ad. 4. aspectū si alleuieť infirmitas euadet: si augeť morieť. Si'it in oppōe ⁊ in. 4°. aspectu ⁊ i eodē signo. Uirginis.

Sz. ☽. fuerit i vgine ⁊ saturn⁹ aspexerit ex. 4°. uel oppōe in initio infirmitat]: patieť i stomacho ⁊ i vētre ⁊ i intestinis ⁊ hēbit apostema merc̄. ⁊ erit infirmitas occulta q⁹ vix poterit q̄spiā eā cognoscere nisi sit astronom⁹. Utať reb⁹ frigidis ⁊ tpatis ⁊ op⁹ ē ei ut sanet apostema: ita q⁹ nō apiať ista infirmitas futura ⁊ longa. Si vo fortuna eā aspexerit euadet p⁹ multos dies. Si ifortuna morieť infra. 40 dies. Cū. ☽. fuerit i. 5°. ⁊ aspexerit eā mars ex. 4° uel oppōe erit infirmitas cū magno calore interi⁹ ex abūdautia colere: ut sūt disinterie uel fluxus vētris: ⁊ flux⁹ ē ei fortis: ⁊ q̄nq̄z nō inueniť anxietatē magnā patiť. hēbit etiā malū stomachū. Est ḡ ei necessaria medicina stiptica ꝯfortās: vtať q̄z reb⁹ leuib⁹. Deť q̄z ei medicina leuis. Si aūt aspexerit eā fortuna euadet infra. 3. dies: si ifortuna morieť. Cū fuerit. ☽. cursu vacua sig̃t fluxuz vētris ⁊ diarie ⁊ liēterie: ⁊ ipedimētū vesice uel strāguiria ⁊c̄. Si āt fuerit cū ea. ♂. uel. ☉. uel. ♃. tūc erit infirmitas acutior ⁊ fortior cū ptubatiōe sens⁹ ⁊ vix loqueť. Op⁹ est ei medicina q̄ paulati fluxū vētris restringat. Cū āt puenerit ad. 4. aspectū uel oppositū liberabiť p auriliū fortuna♃: ⁊ g̃uabiť uel morieť p ipedimētū malo♃. Si aūt saturn⁹ ⁊. ☿. ⁊. ♀. ⁊. ♃ fuerint cū ea i initio ifirmitatis erit infirmitas ⁊ durabit donec iterū reuertať ad virginē uel ad. 4. aspectū ei⁹. Libre.

Sz. ☽. fuerit i libra: ⁊ aspexerit eā satn⁹ ex. 4°. uel oppōe erit infirmitas in capite ⁊ in pectore et pulmone. Et est maior infirmitas si fuerit luna decrescens: et dolebit ei⁹ frons et tempora: et rit ex repletione: et sternutabit multuz: habebit q̄z febres leues. Opus

eſt ei medicina tēperata: ⁊ cibo ⁊ poto leui vtaſ. Si autē aſpexerit eam mars ex malo eſpectu morieſ: ⁊ ſi nō: viuet. Et cū puenerit ad q̄rtū aſpectū liberabiſ p aſpectū fortunarū ⁊ p aſpectū malorū grauabiſ uel morieſ. Si aūt aſpexerit eā mars ex. 4° uel oppoſitiōe: erit infirmitas ex ſanguie: ut apoſtēa uel pleureſis ul' piplemoniā: ⁊ habebit magnas febres ⁊ pulſus erūt vehemētes: ⁊ in nocte videt peſſimas viſiōes. Eſt eni ei neceſſaria minutio ſanguis: ⁊ eſt ei opus medicina leuis: ⁊ calor parū vehemens: ⁊ vigilie ⁊ turbatio mentis. ⁊ ſi nō aſpexerit fortuna morieſ in fra. 10. dies. Si autē aſpexerit fortuna euadet cū puenit luna ad oppoſitionē ſui loci. Cū autē fuerit in curſu vacua habebit dolorē in pedibus ⁊ dolorē interius: ⁊ oculos graues: ⁊ balbutiet cū loquiſ. Erit ei medicina neceſſaria ⁊ dieta frigida ⁊ humida: ⁊ minutio ſanguis. Cū autē puenerit ad q̄rtū aſpectū uel oppoſitū liberabiſ p fortunas: ⁊ aggrauabitur p mala. Si aūt mars ⁊ ſol eā aſpexerit ex oppoſitiōe hec infirmitas erit valde magna: ⁊ grauabiſ magis in capite. Et ſi fuerit mercuri⁹ in. 6. lachrymabūt ſibi oculi: ⁊ patieſ dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei neceſſaria. Cū autē puenerit ad iouē uel venerē in dieb⁹ creticis alleuiabiſ ⁊ euadet: alioquin grauabiſ ⁊ morieſ.

Scorpionis.

Si luna fuerit in ſcorpione ⁊ aſpexerit eā ſaturn⁹ ex. 4. uel oppoſitiōe erit infirmitas ex ſanguie putrefacto ⁊ de veneno. Et ſi nō fuerit luna i diminutiōe luminis ⁊ aſpexerit eā infortuna morieſ. Et ſi fuerit creſcēs in ſuo lumine ⁊ gradib⁹ ⁊ fortuna aſpexerit eā viuet. Cū autē luna fuerit in. 7°. ⁊ mars cū ea ⁊ iupiter aſpexerit eā ex. 4. habebit febrē validā. vnde neceſſaria ē ei medicina laxatiua tpata. Et cū puenerit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Cū aūt fuerit luna in curſu vacua erit infirmitas leuis in p̄ncipio ⁊ p nullo habebiſ: ⁊ augmētabiſ ⁊ mutabiſ in aliā egritudinē ut ipedimentū veſice ⁊ iliorū ⁊ hemorroidarū: ⁊ naſcenſ ei puſtule i narib⁹. Cū aūt lūa puenerit ad tertiū aſpectū patieſ febrē calidā: ⁊ cū puenerit ad ſolē ſi nō obuiabiſ ei fortuna morieſ. Si aūt cōtulerit ei fortuna naſceſ ei apoſtema i ipocūdrijs ⁊ liberabiſ. Cū fuerit luna i ſcorpiōe ⁊ mars cū ea aut ſaturn⁹. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate ſalſo: ⁊ facit in die vadat ad ſellā: ⁊ non minuas ei ſanguinē. Circa eū ut decet cū dieb⁹ creticis. Si aſpexerit eā fortuna erit criſis ad bonū ⁊ ecōuerſo. Si aūt in. 4°. uel. 7°. uel. 10°. fuerit fortuna liberabiſ.

Sagictarij.

Cum fuerit luna in ſagictario ⁊ aſpexerit eā ſaturn⁹ ex. 4°. uel. 7°. erit infirmitas ex flegmate: ⁊ hz calorē in toto corpe: ſz pedes erūt ei frigidi. Durabit hec ifirmitas vſq; dū luna iūgaſ ſatur

no nisi aspexerit eam fortuna: qz si aspexerit durabit vsqz qđ veniat ad oppositū loci in quo fuerat. Cū vo luna fuerit in. 8°. z aspexerit eā mars ex. 4°. aspectu uel oppositō: z fuerit aucta lumine z numero erit hec infirmitas occulta: z medicus eā scire nō poterit z dolebit ei caput: z totum corpus: z ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: z nimiū se calefecit: z nimiū introiuit in pectus suū z in caput z alijs multuz voluit z assellat. Opus ē ei medicina cōstipatiua. Utaī syrupi z leuib⁹ preacetosis: z vomet z patiet fluxū nisi fortune aspexerint ipsā in. 4°. uel. 7°. uel. 10°. uel. 11°. z. 24. die euadet. Si infortuna moriet. Cū autē luna fuerit in. 8°. cū ioue z venere erit infirmitas ex reumate: z patiet sitim z dolorem pectoris: z euadet cū venerit ad q̄rtū aspectū erit ei medicina mollificatiua necessaria. Caue ne balneaī.

Capricorni.

Um luna fuerit in capricorno z aspexerit eā saturnus ex 4° uel. 7° z fuerit decrescens gradib⁹ z lumine erit infirmitas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euz calor ē nimis clauſ⁹ z opillatus: z sternutat multū: frons z pect⁹ eius dolent. habet quoqz febres ex sanguine. Utatur rebus temperatis z sirupo tēperato. Et si aspiciet eaz fortuna euadet post longā egritudinē: z si non aspexerit moriet vsqz ad tres dies. Cū autē luna fuerit in nono z aspexerit eā mars ex. 4°. uel. 7°. significat abundantiā colere z malā digestionē stomachi: z disp̄ositionē stomachi. Unde veniet ei vomitus: z fluxus ventris z disinteria: z ardebit ei stomachus: z inflāmabit z habebit magnā febrē: z sudabit multum. Opus est ei medicina frigida: sz pulsus nō inueniet vni⁹ maneriei. Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet vsqz. 15. dies. Cum fuerit sol cū marte z aspexerit eā cū luna augebit calorē z infirmitatē. Erit aūt hec infirmitas ex nimia fatigatiōe z calefactione ad ignē: z accepit euz ex colera citrina: z p auxiliū fortunarū euadet: z p impedimentū malorū moriet. Caueas a balneo z sup ipsū nō fundaī aqua frigida.

Aquarij.

QUm luna fuerit in aquario addens suo lumine z gradibus: z aspexerit eā. s. ex. 4° uel. 7°. infirmitas erit ex nimio labore: z perdet sanguinē: z hec infirmitas qñqz crescet qñqz minuet: z est timendū de eo z qñ luna puenerit ad oppositionē si alleuiabit viuet. Si augmētabit viuet vsqz ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit infirmitas fortis in principio: z dolebit interius z erit infirmitas lōga. habebit quoqz febrē calidā z multā patiet anxietatē. Sz qñ lūa puenerit ad solē si aspiciēt eā fortune euadet: si mala: moriet. Aspice lunaz qñ

egredit a ſub radijs ſi inuenerit fortunā anteq̄ puenerit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus:ſi non:morieť.Cū autē ſaturnus uel mercuri⁹fuerit cū ea in.10.erit ifirmitas de colera nigra. Et ſi luna fuerit addens ſui lumine ꝛ gradib⁹euomet. Et ſi aſpexerit eā fortuna añq̄ pueniat ad oppoſitū loci ſui euadet.

Piſces.

Um luna fuerit in piſce addēs in numero:ꝛ ſaturn⁹aſpexerit eam ex.4°uel.7°erit infirmitas ex frigido:ꝛ patietur in capite ꝛ inventre.Opus ē ei medicina calida.Si aſpexerit eā fortuna euadet:ſz dolebūt ei mēbra cū luna fuerit in.11.addens ſui lumine ꝛnumero ꝛ mars aſpexerit eā ex.4°erit infirmitas ex nimia repletiōe ſanguis ꝛ colere.Et opus eſt ei ut minuať ſangnis:ꝛ minorē dolorē habebit i nocte q̄z in die:q⁹ ſi non aſpexerit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas morieť. Et q̄n puenerit luna ad locū i quo erat:ſi venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: ſi autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ꝛ ſanguie: ꝛ p auxiliū fortunarū ad lunā liberabiť: ꝛ p nocumentum malorū morieť.

Hyppocratis libellus de medicorū aſtrologia finit:a⁹Petro de abbano in latinū traduct⁹. Impreſſus eſt arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Auguſta Imperante inclyto Johanne Mocenico duce Venetorū:Anno ſalutifere incarnationis.1485.

Venetijs

BIBLIOTHÈQUE SAINTE GENEVIÈVE

Esas ff ſanum calidas eſt ſumere ſanum
Hunc caput fronorem de pollice ſunde cinerem
Hunc aſſatum tibi ſint et cahuca cum
Vuare ſolutendus, cunos eſt pede minuendus
Lac ebe caprinum gariophila vel cynamomum
Lactuca fundis ac minutos ebe fontes
Venam non calidas dum ſanu et facies calidas
Hunc calidos vapor cibos hoc utruſe memento
Hinc venam pandas. ſpes puer ſaepe mandas
Hinc ſpecies cibq bis ternis ſpecibus.
His ternis ſumo ſpecibq cu cynamomo
Sunt apte membris calidis res menſe Decembris.

Aequincta Tabulorum Paschalium

Si noscere vis quot sint anni ab incarnatione Domini, scito quot fuerint cycli
Indictionum, septies quinquies anno Tiberij principis quadraginta octo & quindecim
& multiplica fiunt ego addo semper viginti duo, quia Indictiones secundum
Romanum; dominica nativitatis et Indictionum anni æquales volueris &
Si vis scire quota sit Indictio sume annos Domini, et adjice tertia partem & is et quod re
manserit ipsa est Indictio anni ejusdem si vis scire quot sint epactæ sumas partes
anni domini, et eorundem quartam partem adjice, his quoq; quatuor adde, quia
quinq; concurrentes fuerunt anno nativitatis anno nativitatis Domini tres partes &
et remanent epactæ si vis scire concurrentis septem dies, sume annos Domini
et eorundem quartam partem adjice. his quoq; quatuor adde, quia quinq; concurrentes
fuerunt anno nativitatis Domini, tres partes &: et remanent epactæ solis
Si vis scire quota sit annus Indictionalis, sume annos Dni, et unum adjicias. quia
quia eiusdem anno secundo natus est Dns. partes & novemdecim, et quod remanet
ipse est annus cycli Decemnovenalis, Si vis scire quota sit cyclus Lunaris, sume annos
Dni et duc subtrahens simile & novemdecim, et quod remanserit ipse est cyclus
Si Lunaris, Si vis nosse Bissextilem anni partes annos Dni & quatuor, quantum re
manserit tot sunt anni a Bissexto

796
23, L